



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

o



g

A large, stylized handwritten mark, possibly the letter 'g', is written in the lower-left quadrant. Below it is a simple rectangular box with rounded corners.

QA
31
E88
S731
1738



Euclides

E U C L I D I S E L E M E N T O R U M

LIBRI VI. P R I O R E S
P L A N O R U M,
A C

XI. E T XII.

S O L I D O R U M,
Cum Explicationibus, & Demon-
strationibus

CHRISTOPHORI CLAVII,

In usum Auditorum suorum
adornati & editi;

A

JOANNE HENRICO VAN LOM.


Philos. Doctore, ejusdemque Facultatis,
ut & Mathes. Professore Ordinario.

*Qui brevem Narrationem Historicam, de vita,
ac Elementis Euclidis, addidit.*

Adjectis tabulis æneis nitidioribus &
accurationibus.



A M S T E L O D A M I,
apud HENRICUM VIEROOT,
MDCCXXXVIII.



ILLUSTRISSIMIS, NOBILISSIMIS,

GENEROSISSIMIS

VIRIS,

ACADEMIÆ

DUCATUS GELRIÆ, ET COMITATUS
ZUTPHANICÆ,

CURATORIBUS.

D. ADRIANO COMITI DE LYNDEN,
Domino in Nederhemert, Burg-gravio
Neomagensis Imperii; Satrapæ Regionis
Cuikensis; &c. Ad confessum potentissi-
morum ordinum Foederati Belgii dele-
gato. &c. &c. &c.

22 May 24 1413
D. LEONARDO ESSENIO,
Medicinæ Doctore; Civitatis Bommeliensis
Consuli; ad redditus publicos Tetrarchiæ
Neomagensis curandos, ac quondam ad
Collegium Ordinum Generalium septem
unitarum Regionum Delegato. &c. &c. &c.

D. FRANCISCO JOANNI BARONI

DE

HEKEREN,

Domino de Enghuysen; Civitatis Dodeche-
mi Consuli; urbis atque agri Doesbur-
gensis Judici; Ducatus Gelriæ quæstori
supremo; & ad concilium ordinum foe-
deratorum, quod est Hagæ comitum,
Delegato. &c. &c. &c.

D. EVERH. JOANNI BENJAMINI
BARONI DE GOLSTEIN.

Domino in Appel ; Ordinis Teutonici
Magistro ; Civitatis Zutphaniensis consuli ;
cameræ rationum , ducatus Geltriæ , &
comitatus Zutphanix præfidi. &c. &c. &c.

D. ALEXANDRO BARONI DE DEDEM ;
Domino in Vosbergen , & Werfhorst ,
Arnhemix , & oræ Velavicæ judici ;
Præfecturæ Dornspyckensis ex Equestri
Ordine Præfidi ; confessus Præpotentium
Præcerum , qui redditus publicos Tetrarchiæ
Velavicæ curant , Præfidi ; Gymnasii Ve-
lavici Curatori. &c. &c. &c.

D. ANTONIO à WESTERVELT,
Domino in Effenburg ; Civitatis Hardero-
vicenæ Consuli ; ad collegium Ordinum
Generalium , septem unitarum Regionum ,
& Cameram Tributorum Velaviæ quon-
dam Delegato ; Gymnasii Velavici Cura-
tori. &c. &c. &c.

NEC NON

*VIRO AMPLISSIMO, NOBILISSIMO,
CONSULTISSIMO.*

D. SAMUELI ESSENIO,
J. U. Doctori , Curix Ducatus Geltriæ ,
& Comitatus Zutphanix , Senatori extra-
ordinario ; Publicorum Redituum Maes-
landix , & Oosterwyck quæstori ; & Cu-
ratoribus Gelro-Zutphanicæ Academicæ à
secretis &c. &c. &c.

S. P. D.

JOANNES HENRICUS VAN LOM.

DEDICATIO.

History of science
Harrassowitz
4-29-24
9831



Um novam Euclidis Elementorum, cum Christophori Clavii, præclari sane Mathematici, Demonstrationibus adornatam Editionem; privatis nostris Institutionibus destinatam, in lucem produco publicam: Vestro illustri Nomini, VIRI NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI! consecrare eam, ac dicare meum esse officium censui. Justissimæ enim mihi causæ sunt variæ, quibus hoc opusculum

DEDICATIO.

lum vestris illustribus inscribere nominibus , me obstrictum esse sentio. Etenim si mecum reputo , Vos Academiæ nostræ curandæ præpositos esse , eique augendæ & amplificandæ egregiam & maxime laudabilem operam navare ; nemini majori jure , hunc libellum nostra cura , ea qua apparet forma , primum edendum , in Academia vestra paratum , quam Vobis , quibus Academiæ nostræ cura commissa est , offerre ac dicare me potuisse judicavi. Cui enim plus deberem , quam Vobis , qui nobis ad hæc ornanda , publici-

DEDICATIO.

blicique juris facienda, otia dedistis? Accessit, Vos jure optimo à me exigere posse specimen aliquod eorum, quæ cum Auditoribus nostris, super Matheseos principiis tracto: ac mihi Geometricorum exercitiorum, quibus studiosam juventutem imbuerre studeo, Vobis rationem esse reddendam. Et quod incrementa addit, est, quod Vobis etiam Temporis ex occupationibus quotidianis erepti, rationem aliquam persolvere officii mei esse existimavi. Præterea cum ab eo tempore, à quo ad Vestram Academiam accessi,

DEDICATIO.

me maximis beneficiis cum-
mūlastis, & etiamnum favo-
re vestro prosequimini; pri-
mam, quæ sese mihi of-
ferret, occasionem ample-
ctendam esse putavi, ut de-
bitæ meæ observantiæ, re-
verentiæ, & grati animi,
pro acceptis adeo multis be-
nificiis, & gratiis, publi-
cum exstaret monumentum.
Merito Itaque gratam me-
moriam beneficiorum, quæ
in me contulistis, declaro,
hacque inscriptione pie ag-
nosco, quodd benignitatis Ve-
stræ, erga me, quibus mul-
ta debeo, documenta ma-
xima sint ac singularia.
Non

DEDICATIO.

Non dicam opusculum Vestris Illustribus Nominibus ornatum, ac comptum, ex ipsa inscriptione firmum sibi conciliare præsidium. Accipite ergo **GENEROSISSIMI & ILLUSTRISSIMI, Patriæ & Academiae PATRES!** hoc quaecunque munusculum, vobis lubentissime dicatum & consecratum. Quod animo humili, obsequioso & devoto offero: Accipite hoc Vos animo sereno, placido & benigno. Clementer accipite; credite nihil aliud me egisse, quam quod officii mei rationem postulare censui. Vestro
† 5 † vero

DEDICATIO.

vero AMPLISSIMI AC
GENEROSISSIMI VI-
RI ! me, meaque studia, fa-
vori commendo. Ego vero
me intra musei mei parietes
recipiam , Deumque im-
mortalem , supplicibus exo-
rabo precibus , ut Vobis ,
quos non tantum Generis
splendor , & muneris dig-
nitas , sed & meritorum in
Rempublicam , magnitudo
illustres fecit ; tribuere tem-
pus quam longissime , Vos-
que cum illustribus vestris
familiis salvos , & omni fe-
licitatis genere cumulatos ,
incolumes servare velit ; ut
gravibus hisce temporibus
pru-

DEDICATIO.

prudentissimis consiliis vestris
& curis Decus Reipublicæ,
Ecclesiæ, & Academiæ hu-
jus tueri & augeri possitis,
tandemque læti ac lubentes,
certa beatioris vitæ in cœlis
spe solutas corporis viculo
animas tradere Deo. Valete
& Favete. Dabam Har-
dervici A. D. 12. Julii.
MDCCXXXVIII.

PRÆ.

PRÆFATIO.

LECTORI BENEVOLO

S.



Isto tibi , *benevole*
Lector , novam E-
ditionem Elemen-
torum Geometrico-
rum , ab Euclide
Geometra quondam
adornatam ; verum Christophori
Clavii Expositionibus , & De-
monstrationibus munitam. Ut
scias tamen velim , me non vo-
luntarie , ac sponte mea , ad
hæc Elementa publici juris faci-
enda , sed necessitate quadam
coactum , pervenisse. Quare pau-
cis te in limine morari debeo ,
ut

P R Æ F A T I O.

ut referam *primo* rationes , quæ me ad hæc Elementa edenda impulerunt , & urserunt : *dein* quid in hoc opere proferendo præstiti.

A quo Tempore mihi in hac Academia , publice Philosophiam ac Mathesin docere , demandatum est : in id omni ope , industria & alacri studio incumbere officium meum esse putavi ; ut quovis modo possem , Studio sæ Juventuti , vel Philosophiam , vel Mathesin discere cupienti , facilem simul ac utilem navare operam , ejusque commodis pro virili servire. Verum cum inter Viros Eruditos hodie convenit ; Studium Geometricum , basin & fundamentum esse ponendum Philosophiæ , vel saltem partis ejus principalis , Scientiæ nempe Rerum Naturalium , id primum mihi curæ cordique esse censui ;

ut

PRÆFATIO.

ut Juventutem Studiosam puris & sinceris Geometriæ principiis, quibus dein ad altiora, tam Veterum, quam Recentiorum Dogmata intelligenda pervenire possunt, erudirem. Interim memor dicti præclari sane Mathematici, Davidis Gregorii in Dedicacione, ubi dicit, *memini vero quam sæpe reclamationes Viris in re Mathematica, novitatis, compendii, & forte sui nimium amantibus; cum interim juventutem ad ipsos fontes remittendam, Veterumque libros diligentius esse versandos, terendosque, vehementer urgeres.* Ideo ad hunc Scopum assequendum, Euclidea Elementa, probe intellecta imprimis nos ducere rebâr; utpote tam Scriptores Antiqui, quam Recentiores super hæc Elementa, sua condunt Edificia, cum Geometrica, cum Rerum Naturalium; propterea

P R Æ F A T I O .

reaque ea intra privatos parietes , cum Auditoribus nostris tractanda esse necessarium duxi. Sed cum non perinde erat , cujusnam Commentatoris vel Editoris sequerer ductum , in exponendis coram Auditoribus nostris Elementis istis , cum seligendum esse se existimavi , qui se præ cæteris Demonstrationum perspicuitate , & demonstrandi rigore ac evidentia commendabat. Inter cæteros Christophori Clavii Demonstrationes , ac demonstrandi Methodum , mecum pensitans , ambo mihi arrisere , & placuere valde. Tum ob elegantem , ac sane perspicuum modum , cum facilitate singulari conjunctum , quo in adstruendis & probandis utitur propositionibus. Tum ob robur & efficacitatem , quæ singulis inest demonstrationibus , ad persuadendum

PRÆFATIO.

dum de veritate rei propositæ , ad quas nihil excipi potest , cum per omnes casus possibiles , rem contemplandam veram & firmam esse ostendit , & ad convictionem evincit. Quibus porro accessit , Eum Euclidis Scopo præ multis aliis etiã optime satisfacere , remque ab Euclide propositam , secundum ejus mentem , acu tangere. Eo nomine laudatur à Reyhero in *Dissert. de Euclide* pag. 40. 41. Quod Clavius optime commentatus est in *Euclidem* ; ac uti ait , in *ejus commentariis* , quicquid fere ad penitiorum Elementorum cognitionem requiritur , invenitur. Suum etiam adjicit calculum Ricciolus in *Tomo primo Almagesti novi* de Clavio scribens , quod in *Geometria* adeo excelluit , ut illum plurimi Mathematici velut Oraculum consuluerint ; propter eximiam

in

P R Æ F A T I O.

*in scriptis suis perspicuitatem , cum
solida doctrina conjunctam , dum ipsa
Sole clariora sunt. Adstipulatur his
Janus Nicius Erythreus in pinacotheca
sua notans , quod ex omnibus Clavii
lucubrationibus , quibus in lucem prola-
tis , nominis sui memoriam , omnium
seculorum posteritati commendavit , est
commentarius , quo Euclidem illustra-
vit , qui talis est , ut in Arce poni
possit ; quasi Minerva illa Phedie ;
in qua nihil est nisi absolutum &
perfectum. Et ut alia silentio præ-
teream testimonia , Vossii tantum
adducam , de Scientiis Mathem. pag.
69. Ubi de Clavio affirmat ,
quod Eruditus omne punctum ferre vi-
sus sit , cum variis monumentis no-
minis sui decus ad posteros propagavit.
Quare non dubitabam , ad ipsius
commentarii ductum in Euclidis
Elementa , Geometrica principia
Auditoribus meis tradere : cum*

† †

per-

P R Æ F A T I O.

persuasum mihi habebam , in demonstrandi ordine , me nec commodiorem nec clariorem , in ipsa re probanda , nec firmiorem nec evidentiorum Autorem sequi posse. Verum brevi tempore percipiebam Clavianorum Elementorum Euclidis penuriam esse , cum Studiosa juvenus ubique exemplaria sollicitè quærentes , vix ac ne vix quidem unius , alteriusque exempli compotes fieri possent. Accedebat etiam , quod si hic vel illic exemplum unum in angulo lateret , illud nimio pretio solvendum erat. Unde factum est , ut quidam me audientes , aut audituri , quotidie quererentur , quod Autoris , cujus vestigia legebam , participes fieri non possent. Porro Editiones Clavianæ , sexcentis & pluribus erroribus scætant , seu vitiis Typographi-

P R Æ F A T I O.

graphicis innumeris laborant, qui Tyronibus in Demonstrationibus perlegendis, ac imitandis omnino moram injicere debent; si non aliquando ad propositionis intelligentiam insequendam, profus impedimento sint. Ulterius Figuræ, quæ ad propositiones illustrandas adjectæ sunt, quæ omnino claræ & distinctæ, ad faciliorem intelligentiam desiderantur; sunt confusæ & vitiosæ admodum, immo, quandoque exiguæ nimis; uti sunt eæ solidorum, quæ sane ob linearum multitudinem, & varias superficies in quibus jacent, præprijis accuratæ & justæ magnitudinis existere debent. Desunt aliquando lineæ, quæ ad constructionem requiruntur, desunt per sepe literæ, quæ in verbis demonstrationum citantur, & non

P R Æ F A T I O.

raro perverso loco sunt positæ ; quare necesse est ut Tyrones sæpe confundant , ac ineuntes constructionem moram iis injiciant , quod profecto molestum , & in nonnullis fastidium movet , præcipue iis qui prima vice Autoris demonstrationes imitantur. Præterea citationes , quæ in margine , juxta demonstrationum verba , positæ reperiuntur , suis etiam non carent vitiis , in iis autem indicantur ea , quæ in præcedentibus concessa vel demonstrata , jam Elementa existunt ac principia , eorum quæ in ista demonstratione adstruuntur , quorum nostra scire interest ; quapropter eos , qui non satis familiares habent Euclideas propositiones , sæpe ob præposteram citationem ; privant fundamento vero , super quod tamen condita est

PRÆFATIO.

est probatio. Denique licet Clavii Commentarius in Elementa Euclidis sit omni laude dignus, tamen Tyronibus prolixus nimium est, si nempe oculos nostros convertamus vel in Definitionum expositiones, vel in ea, quæ singulis fere adjunxit demonstrationibus propositionum. Ea quamvis in se bona & laudanda sunt, Incipientes tamen, qui Euclidea Elementa scire cupiunt, iis carere possunt; cum haud raro tales, multiplicitate materia, quam in iis adducit, obruuntur, non distinguentes ea quæ Euclidis, ab iis quæ Clavius de se addidit, vel ex aliis mutuo desumpsit; hinc mira in Tyronibus confusio, quæ cane pejor & angue deterior in Mathesi evitanda, ac omni conatu cavenda. Quæ omnia etsi cum animo meo sæpiuscule vol-

† † ;

ve-

P R Æ F A T I O .

vebam ac revolvebam , tamen
refugiebam initio novam adorna-
re Editionem Clavianam ; verum
cum quotidie de penuria Exem-
plarium Auditorum meorum quæ-
relæ ad meas perveniebant Au-
res , in angustiam redigebam , vel
Clavium ducem in Geometria
exponenda relinquere , ejusque
loco alium seligere , quod repug-
nanter facerem ; vel efficere ut
recuderentur Elementa Euclidea
à Clavio confecta. Verum cum
utrumque ponderarem , magis è
re auditorum meorum fore judi-
cabam , Clavium porro ducem præ-
euntem , in contemplationibus
nostris Geometricis , sequi. Id-
circo in usum tantum Auditorum
meorum , ac eorum gratia no-
vam hanc Editionem , in qua
vitiis supra memoratis obviam ire ,
& quantum in me est , evitare
flu-

P R Æ F A T I O.

studui ; ex Clavii commentariis collectam , parare decrevi. En rationes *benevole Lector* , quæ me impulere ad hanc Editionem publici juris faciendam. Super est ut nunc etiam brevibus enarrem , quid in hac Editione præstiti , vel saltem præstare conatus fui. Et quidem *primo* è libris tredecim ab Euclide conscriptis , in quos omnes etiam commentatus est Clavius , *sex priores , ac undecimum & duodecimum librum* solummodo edi curavi ; quia cum Planorum Elementis , Solidorum conjungenda esse , tanquam cognitu summe necessaria , sic firma mihi stabat sententia. In qua tantum præclaros in Geometria Viros præeuntes secutus fui , nempe Tacquetos , Dechalesios , Moreos , Ozanamos , Keilios , aliosque. Non tamen prætermisi reliquos , quia

P R Æ F A T I O.

eos inutiles judicabam. Verum cum Tyronibus, qui institutionibus nostris privatis se committunt., hæc Elementa solummodo paravi, illi intellectis Planorum & Solidorum Elementis, reliquis in libris, si ipsis ita visum sit, dein cum fructu se exercere possunt. Illorum permagni interest, scire Elementa Planorum, ac Solidorum, quæ sex prioribus, & duobus reliquis, undecimo ac duodecimo libro continentur; utpote ea fundamenta sunt, quibus nostra Rerum naturalium Doctrina nititur. *Secundo* explicationes, quas Clavius super Definitionibus, Axiomatibusque Euclideis dedit, quales definitionibus ac axiomatis addidit, quasque prolixas nimium judicavi, ac quæ vel praxin aliquam, vel aliud quid ad Euclidis verba, & verborum sensum in-

P R Æ F A T I O.

intelligendum non directe ducens, continebant, pro captu meo contraxi. Ita tamen, ut secundum Clavii sententiam, sensum verborum Euclidis, satis clare declarent; nimiam interim evitavi breviter, ne dum brevis esse volo, obscurus fio. *Tertio* Scholia, Praxes, aliaque, quæ Clavius Propositionibus Euclideis, suisque demonstrationibus subjunxit, omisi pleraque omnia; exceptis tamen iis Scholiis, Lemmatibusque, quibus in suis demonstrationibus utitur Clavius: dum iis carere non possumus, quia ad ea, tanquam ad principia & fundamenta probationum, in iis provocat. Ob eandem rationem, quia è multis Corollariis petit argumenta demonstrationis suæ, plurima servavi Corollaria, quæ Clavius è probationibus suis elicit.

† † 5

P R Æ F A T I O.

cuit. *Quarto* Definitiones, Postulata, Axiomata, & Propositiones, quæ in Clavii Commentario in Euclidem occurrunt, omnes typis mandavi. Verum eas omnes contulimus cum definitionibus, axiomatibus, postulatis & Propositionibus, quæ in Gregorii Editione Græco-latina expressæ extant; quas vero in Gregoriana reperire mihi non licuit, quasque Clavius vel de suo adiecit, vel ex aliis mutuo desumpsit, eas omnes duabus ejusmodi [] uncinulis includi curavimus. Ut scilicet illi, qui Euclidem purum desiderant, unico obtutu videre possint, ea, quæ Euclidis sunt, eaque distinguere ab iis, quæ à Clavio sunt adita. *Quinto* quantum in me fuit, errores quos detexi in Editione Clavii, tum in ipso textu, tum in

P R Æ F A T I O .

in litteris , quæ respondent iis ,
quæ in Schematibus sunt expressæ ,
quæ lineas necessarias figurarum
annexarum declarant , corrigere
sedulo studui : uti & citationes
omnes in margine positas , male
allatas , restituere omni ope ni-
sus fui ; forte hic vel illic men-
dum aliquod remansit ; verum
quis omnes potest cavere errores ?
cum ne Argus quidem sufficeret.
Id saltem effeci , ut nunc mul-
to correctior , quam priores
omnes Clavii Editiones , lucem
adspiciat. *Sexto* Figuras , ad pro-
positionum intelligentiam facilem
reddendam , accommodatas , se-
paratim æri incidi curavi ; in iis
elaborandis , id præprimis stu-
dii , ut clare & distincte ante
oculos ponerent , omnes lineas
ad constructionem , ac ad ejus
compositionem necessarias ; ne ve-

P R Æ F A T I O .

ro lineæ inter se confunderentur majusculas depinxi ; ac quæ ad solidorum ducunt notitiam , quæ in prioribus Editionibus , præcipue quæ in forma octava , ut a-junt , sunt , confusæ ac vitiosæ admodum erant ; distinctiores multo elaboravi , ut Tyrones sibi magis vivide constructionem figurarum repræsentare possint. Interea sedulo cavi , ut litteræ in figuris expressæ responderent iis , quæ in Demonstrationibus occurrunt. *Septimo* his Elementis præmisimus , Historicam narrationem brevem de Euclidis vita , ac Elementis , de qua tamen non multum polliceri audemus , quoniam extra forum meum est , accuratam ac omnibus numeris absolutam tradere historiam , quare à Lectore comiter expetimus , ut si forte ea non arrideat , vel
errores

P R Æ F A T I O .


errores quosdam in ea detegat, in meliorem partem interpretari velit, cum nimis sero in ea incidi cogitata, ut de vita Euclidis quædam narrare in animum induxerim. In reliquis Clavium sumus secuti, cum cuilibet propositioni duos numeros affiximus, quorum alter in margine depictus significat ordinem, quem Campanus ex traditione Arabum est secutus in Euclidis Propositionibus. Alter vero in ipsa Propositionum serie descriptus refert dispositionem propositionum ex traditione Theonis, seu potius ipsius Euclidis, qui etiam observatur in codicibus Græcis. Id vero eo consilio factum est, quoniam cum à quibusdam Geometris propositiones Euclidis juxta ordinem Campani, ab aliis vero juxta Theonis seriem citentur, ideo

P R Æ F A T I O.


ideo necessarium esse duximus, ut utriusque interpretis numerus apponeretur. Denique ne cursus demonstrationum interrumperetur, citavimus principia & propositiones Euclidis in margine, præfixa cuilibet citationi semper literula aliqua alphabeti, cui similis literula responderet in demonstratione, ut facilius cognoscatur, ad quem locum quælibet citatio sit referenda. Citationes vero ipsæ hoc modo intelligendæ sunt; I. *Def.* significat prima definitio; I. *Pet.* prima petitio, vel primum postulatum, I. *Prim.* prima propositio primi libri, 23. *Undec.* significat propositio vigesima tertia undecimi libri: & sic de reliquis; ex quibus reliquæ citationes facile intelliguntur. Vale, Lector benevole, & conatibus nostris fave: simul peto, ut si quædam supersint errata, benigne excuses. Scribebam **Har.** mense julio CIOIOCCXXVIII.
BREVIS

Errata typographica quæ inter relegendum
mihi occurrere, hoc modo corrigat Be-
nevolus Lector.

Pag.	Lin.	Pro	Lege
20.	6.	Onnis	Omnis
31.	ultima.	fitalterius	fit alterius
33.	19.	utrumqu.	utrumque
38.	13.	que BA	quæ BA.
39.	2.	om nia	omnia
59.	18.	rectis	rectis.
61.	23.	externus DCF,	externus DCE,
93.	17.	ipfi CF,	ipfi CE,
96.	17.	rectaugulo	rectangulo
105.	24. in marg.	10. def.	10. def. primi
107.	22. in marg.	10. def.	10. def. primi
109.	12. in marg.	15. def.	15. def. primi
	28. in marg.	15. def.	15. def. primi
124.	5.	recta quædem	recta quædam
154.	20.	describendns	describendus
156.	9.	Quare quadratum	Quare quadratum
165.	35.	THEOR.	PROBL.
171.	5.	habituto	habitus
173.	2. à fine	æquemultiplicia	æque multiplicia
174.	4.	æquemultiplicia	æque multiplicia
	7.	æquemultiplicia	æque multiplicia
189.	28.	nna	una
208.	2. a fine	primo	prima
220.	23.	permutando	permutando
227.	5. a fine	constituantur	constituatur
237.	4. a fine	ad CA,	ad DA,
267.	17.	cnm sexta	cum sexta
274.	7.	imagininemur	imaginemur
277.	22.	angulii	anguli
380.	27.	circulus	circulus



BREVIS NARRATIO
 HISTORICA
 DE
 EUCLIDIS
 VITA,
 AC
 ELEMENTIS.

S. I.  Um novam hanc Elementorum *Euclidis*, ex *Christophori Clavii Bambergensis*, insignis sane Geometræ, in *Euclidis Elementa*, commentariis, collectam Editionem, auditoribus, qui privatis nostris institutionibus in Geometriæ scientia erudiri cupiunt, pararem; haud ab instituto alienum esse putavi, breviter de Autore nostro, ac *Elementis*, quæ de rebus Geometricis composuit, quædam recensere. Scilicet ut aliquam saltem habere cognitionem Autoris, ac Operis, quem tractemus, illi possint, qui nos ea *Elementa* exponentes au-

M. BREVIS NARRATIO HISTORICA •

audient. Tum ut eorum, quæ de Euclide narrantur; ac quæ de his Elementis à Viris Doctissimis foventur sententiæ, non sint penitus rudes. Tum ut aliquantum intelligant, quæ de iis tenenda, vel rejicienda videntur. Antequam vero ad ipsam de *Euclide* narrationem me accingam, cum in sequentibus nobis usui futura sint, & verbo referre de Geometriæ natalibus, secundum quorundam sententiam; & perbrevis eorum clarorum Mathematicorum, qui ante *Euclidem* suis inventis præ cæteris excellere, mentionem facere; haud incongruum fore duximus.

In Geometriæ Originem, unde Mortales primo de ejusmodi studii genere cogitandi ansam cepere; & Autorem à quo primum inventa est nobilis hæc scientia; & quo demum tempore elucere inchoavit præclarum hoc studium; si inquiramus: Multa nobis in iis occurrent, quæ ut certo affirmantur, non satis manifesta & evidentiæ videntur. Non enim latet, quosdam asserere, eam Doctrinam ab Ægyptiis, necessitate quadam coactis, ab initio fuisse inventam. Opinatur scilicet eos ob annuas Nili inundationes, quibus agrorum limites operirentur limo, ac sic confunderentur; arte quadam ac scientia, qua rursus agri dividerentur, opus habuisse. Verum hanc rite pensantes opinionem, speciem magis veri habere, quam ut certum aliquid de Originis causa probeat, cuilibet attendenti apparebit. Defunt enim nobis Veterum testimonia sufficientia, quibus

bus de ortus ratione firmo suo stat talo hæc sententia. Si JOSEPHO *antiquitatum lib. I. cap. 9.* fidem habeamus, studium hoc Geometricum à *Chaldeis, Assyriisque* fuisse excultum, ac ab *Abrahama*, jussu Dei in Palæstinam, ac inde in Ægyptum profecto, in illud Regnum tum primum fuisse translatum; ibidem testatur. Ægyptii vero ipsi, certi cujusdam autoris forte inscii, Deo suo, *Thesub* dicto, inventionis gloriam tribuunt, uti refert PLATO in *Phadro operum pag. m. 268. col. I. in princ.* ubi ita scribit de *Thesub* loquens; *Hunc primum omnium numerum, & numeri computationem invenisse, Geometriamque, & Astronomiam, &c.* Verum dubia licet ea sint, quæ de Origine apud Ægyptios quærenda, narrant Autores; id tamen satis certo constat, Ægyptios hoc Doctrinæ genus coluisse. Etenim *Thaletem Milesum*, qui fere sexcentis ante natum Christum annis, secundo ab Urbe condita seculo, in Græcia floruit; in Ægyptum iter facientem, indeque in Græcum Solum reversum, traduxisse Geometriæ Scientiam, ex LAERTIO discimus. Qui simul nobis autor est, *Euphorbum Phrygem* præcedenti seculo Contemplationes Geometricas de lineis jam composuisse; monente DECHALES in *Tractatu Proœmiali de progressu Mathes. cap. 2.* *Thaletem* proxime secutus est *Mamertinus*, qui præclarus celebratur Geometra. Quo eodem tempore, *Amesibisum* hujus scientiæ præprimis gnarum, vixisse statuunt. Hos eodem seculo excepit excellens ille Geometriæ

IV BREVIS NARRATIO HISTORICA

triæ Stator *Pythagoras Samius* ; qui à multis, Geometriæ in Græciam advectæ autor habetur : quocum secundum effluxit seculum.

Tertium, quod sequitur ab Urbe condita seculum, plures produxit in hoc studiorum genere præstantes viros ; inter quos primo numerantur *Anaxagoras Clazomenius*, qui *Pythagora* successit ; dein *Oenopides Chius* ; hujusque discipulus *Zenodorus* ; & qui *Zenodorum* proxime secutus est, è mercatore Geometra, *Hippocrates Chius* : Hic imprimis celebratur, quod primus Elementorum Geometricorum, quæ temporis injuria periere, Scriptor exstiterit. Hos excepere *Theodorus Cyrenæus*, *Timæus Locrus*, Mathematicum Scriptor.

Quartum, quod post hos Autores, illuxit seculum, Geometriæ studiosorum & inventorum valde fuit fertile. In eo claruere *Democritus Milesius*, hujusque æqualis *Protagoras* ; Hos secutus *Plato Atheniensis*, divinus cognominatus, strenuus Matheseos cultor ; de quo referunt, Eum singulis diebus Geometricum Problema, discipulis suis exposuisse. Quem deinceps insecuti, *Amiclas Heracleotes*, *Leodamas Thasius*, & *Neoclides* ; *Platonis* aut auditores, aut familiares ; *Leon* porro illis successit, qui secundus dicitur, à quo Elementa Geometrica, auctiora, quam ea *Hippocratis*, quæ simul ac priora, temporis injuriam passa, non exstant ; scriptis exposita fuere. Postea exstiterere *Endoxus Gnidius*, vel ut alii scribunt, *Cnidius*, *Platonis* in Ægyptum comes, qui quintum Elementum Euclidis

dis de Proportionibus invenisse dicitur; ac Theætetus Atheniensis, cui de quinque solidis corporibus scriptum tribuitur, verum ejus non exstat lucubratio; insecuti sunt dein Bryso, & Antiphon.

In quinto ab Urbe condita seculo flottere, Theudius Magnes, tertius qui numeratur Elementorum Geometricorum scriptor: Hermotimus Colophonius, Cyzicinus Atheniensis; Aristæus Senior; Philippus Metæus; Platonis magistri discipulus: Menæchmus; Eudæxi discipulus; Geminus; Perseus Cisticus; Aristæus; ac tandem Geometriæ illud sydus eluxit. EUCLIDES; qui licet his Geometris posterior fuerit; ac ex iisdem nonnulli Elementa Geometrica Scriptis reliquerint, tamen omnium antiquissimus habetur à VOSSIO de Scientiis Mathematicis cap. 15. §. 1. quorum labores in Geometria habemus; ac omnium Græcorum primus, qui omnia collegit, collectaque digessit. Hunc Autorum catalogum partim me texere docuere, CLAUDIUS FRANCISCUS MILLIET DECHALES in tractatu Proœm. de progressu Matheseos, præmisso tom. 1. Mundi Mathematici; qui eum se à PROCLI libro 2. Commentariorum in Euclidem hausisse dicit: partim TACQUET in Historico narratione de ortu & progressu Matheseos.

§. II. Ex his vero omnibus Geometris, licet cuncti clari celebrentur, propter Doctrinæ Geometricæ peritiam; quam tum suis inventis ditaverunt, tum sua notitiâ & cultu auctiorem, ac firmiorem reddiderunt; EUCLIDES

EUCLEIDEM tamen solum elegimus, de quo pauca hinc paginis referremus. In vitam hujus Geometrae itaque inquirentes, Solum ejus natale, quod tulit hunc Atlantem Geometricum, sese investigandum sponte nobis sistit. Sed super hoc Autorum sententias rogantes, quod capita, tot fere sententiae reperimus; adeo dissentiunt inter se Autores de statuenda Patria *Eucledis* nostri. Quidam ejus Patriam, **GELAM**, civitatem *Siciliae*, fuisse putant; ac ea de re *Eucledes Geometra*, *Gelous* apud illos audit: inter quos est Scriptor Bibliothecae Veteris Siculae, anno 1700. a Messanenfi quodam editae, referente **FABRICIO** *Biblioth. Graec. Lib. III. Cap. XIV. §. I.* Eam opinionem, qua *Eucledem* e *Gela* oriundum censent, forte e *Laertio* collegere; quia **LAERTIUS**. *Lib. II. segm. 106.* de *Euclide Megarenfi* scribit, quod secundum quosdam *Gelous* sit habitus. Verum haec sententia suo videtur privari fundamento, si in sequentibus §. 9. palam constiterit, cum, de quo scribit *Laertius*, *Eucledem*, diversum esse a nostro *Geometra*; quare ex eo principio *Geometra Eucledis* Terram parentem, *Gelam* fuisse, asserere non audeam. **HARDUINUS** ad *Plinium* Autorem nostrum **PERGA**, civitate *Pamphiliae* oriundum censet; at monet **FABRICIUS** loco citato, *Apollonium* Conicorum Scriptorem, in animo tum habuisse *Harduinum*, cum id de *Eucledis Geometra* patriis scripsit sedibus. Nam inter Scriptores tam Veteres quam Recentiores id satis manifesto constat; *Apollonium*, *Pergam* sedem

sedem natalem habuisse ; Verum desunt nobis testimonia , in quibus *Euclidem Pergæ* natum , educatumque fuisse , asseritur. Alia porro , sed incerti Auctoris , de *Euclidis Geometra* patriæ Solo est cogitatio ; videtur tamen ea esse Historici cujusdam Arabis , ex quo illam deprompsit GREGORIUS ABULPHARAJUS *in histor. compend. Dynastiarum arabice edita , & latine versa à Pocokio.* In qua Auctor ille hanc fovet opinionem , quod *Euclides Geometra* è civitate TYRO ortum duxerit , ac propterea eum *Tyrium* facit. Monente KONIGIO *in Bibliotheca Veteri & Nova.* Sed præterquam quod hujus sententiæ Auctor sit incognitus , præterea etiam Veterum desunt judicia , quibus hæc corroboranda foret. Longe vero vulgarior , quæ etiam plurimos nacta est , inter Viros Doctos , Patronos , est existimatio ; *Euclidem Geometram* , MEGARÆ , quæ *Græcia* oppidum est , juxta Isthmum Corinthiacum , natum fuisse : ideo *Megarenses* Eum vocare solent. Hanc opinionem CAMPANUS habuisse videtur , uti ex inscriptione Elementorum à se editorum haud obscure colligere est ; cum ea inscribit *Euclidis Megarensis Mathematici clarissimi Elementorum Geometricorum libri xv.* Cui calculum suum adjecit FRANCISCUS FLUSSAS CANDALLA , inscribens commentarium suum in *Euclidem ; Euclidis Megarensis Mathematici clarissimi Elementa Geometrica.* Idem sensere GESNERUS *in Bibliotheca.* Uti & ABDIAS TREW. eiden

VIII. BREVIS NARRATIO HISTORICA

dem huic sententiæ favet, quod sequentia
versicula satis declarant.

*Fundamenta, quibus consurgit tota Mathesis,
Cyclum cum numero, tu Megaræ, doces.*

In eandem accipiunt partem, RICCIOLUS in *Chronici parte secunda*, præmissi *Tomo primo Almagesti novi*, ad vocabulum *Euclides*; ac multi alii. Fortasse horum multum labefactabitur cogitatio, si in posterum §. 8. & 9. constiterit, *Euclidem Megarenses*, qui sæpe confunditur cum *Geometra* nostro, omnino distinguendum esse ab *Euclide* Elementorum Scriptore. Dissentiunt ab his pariter multi Viri Eruditi, existimantes *Euclidem* nostrum *Alexandrinum* fuisse; cum ALEXANDRIÆ, *Aegypti* prænobilis urbis; quæ hodie Turcis *Scanderia*, Italis vero *Alessandria* appellatur, in illa planitie, quæ Mareotem Lacum, & mare mediterraneum interjacet: ab *Alexandro Magno*, per *Dinocratem* Architectum Macedonem, conditæ; præclarum hunc *Geometram* vel lucem adspexisse primo; vel, quæ magis manifesta, monumentis Veterum fulcita, in ea ipsum floruisse civitate asserunt. Nam *Alexandria* Eum fuisse genitum difficulter asserere auderem, cum disertum nullum de natalitio isto *Euclidis* oppido, Veteris alicujus Scriptoris testimonium habemus; observante FABRICIO in *Biblioth. Græc. lib. III. cap. XIV. §. I. ac* GREGORIO in *præfat. in Euclidem*. Potius subscriberem sententiæ, affirmanti, minime certo

certo constare, quo Genere aut Patria oriundus sit *Euclides Geometra*: à cujus partibus stant GREGORIUS *loc. cit.* & CLAVIUS *in proleg. in Euclidem.* Quippe penes Autores Veteres, expressis nihil reperitur verbis, ubi locorum ortus est *Euclides Geometra*. Si vero conjecturis, & quidem plausibilibus, hic ullus sit locus, forte *Alexandria*, *Euclidis* nostri incunabula haberi possunt; si saltem, ubi imprimis floruerit, ibidem etiam primo lucem adspexisse statuatur. Nam quamvis Scriptorum Veteres taceant, de natali urbe nostri *Geometræ*, tamen manifesto satis, ubi inclaruit nostrum *Geometriæ* sidus, in suis monumentis declarant. Etenim PROCLUS *in secundo comment. in Euclid.* nobis testis est, *Euclidem Geometram* in *Ægypto* vixisse; referente VOSSIO *de scientiis Mathematic. cap. 15. §. 1.* Ac præterea PAPPUS ALEXANDRINUS, qui circa annum Domini 390. vel 400. floruit, teste RICCILO *Chron. pars. 2. ad vocabulum Pappus*; autor est, *Euclidem Geometram Alexandria* Scholam celebrem habuisse, ac discipulis ibidem operam dedisse. *vid. ejus collect. Mathem. lib. 7. pag. m. 240.* idem referunt VOSSIUS *loc. cit.* quod *Alexandria* nempe *Mathesin* docuerit *Euclides Geometra*. Consentiente GRONOVIO *in notis ad Gellii lib. 1. cap. 20.* Immo GREGORIUS *loc. cit.* scribit. *Primum Eum fuisse qui ista in urbe Mathesin felicibus auspiciis docuit.* Quin & hæc Schola *Mathematica Alexandria* primo, *Euclidis* ductu, condita, optime de re *Geometrica* merita, quam plu-

* BREVIS NARRATIO HISTORICA

rimos produxit discipulos. De qua sequentia notat VOSSIUS *loc. cit.* Valde autem illud commendat Scholam ab Euclide erectam Alexandria, quod non solum multos reliquerit discipulos; sed ab ejus tempore usque ad tempora Saracenicæ, vix ullum invenire sit nobilem Mathematicum; quin vel Patria fuerit Alexandrinus, vel saltem Alexandria dederit operam Mathesi. Ex quibus haud collectu difficile est, Euclidem Geometram multum ac diu Alexandriae versatum fuisse; istoque in oppido fixam tenuisse sedem; ac forte ibidem prognatum esse. Quapropter eo nomine Alexandrinum eum merito dici posse conjicio.

§. III. Ætatem ejus quod attinet, de ea iterum varias in partes abeunt Viri Docti. Etenim GEORG. REISKIUS in *Margarita sua Philosophica lib. vi. cap. 1.* de tempore quando floruit Euclides noster miram alit opinionem; dum asserit, *Euclidem Geometram Hippocrate* esse antiquiorem; cum ejus patrem fuisse scribit. At vero exigui momenti hæc videtur sententia, quæ auctoritate nulla Veteris alicujus Scriptoris nititur. VALERIUS MAXIMUS vero *lib. 8. cap. 12.* longe ab eo diffensit, qui *Euclidis Geometra* ætatem incidisse in *Platonis* tempora statuit; eumque *Platonis* cœvum facit: scribit enim *loc. cit.* conductores aræ sacræ à *Platone* ad *Euclidem Geometram* fuisse missos. Quibus verbis manifesto declarat, quod existimaverit, cum *Plato* inter vivos superesset, *Euclidem Geometram* vixisse. Hujus Autoris vestigia

stigia sequuntur illi, qui *Euclidem* ad *Platonis* tempora referunt. Sed notant Viri Docti ad hunc locum *Valerij Maximi*, Eum ibidem commisisse errorem; uti §. 8. adducemus. Quapropter, cum præter *Valerium*, alium nullum habemus Scriptorem præeuntem, dubia omnino, ac penitus rejicienda est sententia ea, qua *Euclides Geometra* ætatis ejusdem cum *Platone* censetur. In diversam iterum abit partem GREG. ABULPHARAJUS in *Hist. comp. Dynast. Euclidem Geometram*, *Platone* multo juniorem statuens, cum natu minorem *Apollonio*, qui longe post Tempora *Platonis* claruit, eum fuisse scribit. Verum neque hæc de vitæ tempore *Euclidis* omnibus numeris perfecta est opinio; Contradiciunt enim unanimi consensu Veterum monumenta, in quibus *Apollonius Archimede Syracusano*, qui *Euclide Geometra* natu minor est, posterior ætate ponitur. Quibus addi meretur *Apollonium* sua scripta, super *Euclidea Elementa* tanquam firma principia, & fundamenta ædificasse; quæque idcirco tempore priora esse debuerint. Sed missis iis omnibus, quæ à Recentioribus Scriptoribus, de tempore, quo floruisse putant *Euclidem Geometram*, narrantur; ad Veteriores confugiendum esse censemus, illosque audiendos esse, quid de ætate *Euclidis* loquantur; ut verum, vel saltem veritati proximum, vitæ tempus Autoris nostri ex illis intelligamus. Quare meo judicio hæud contemnenda sunt *Procli*, & Antiquorum Græcorum; & quibus *Proclus* sua hausit, testimonio.

III BREVIS NARRATIO HISTORICA.

stimonia. Illi autem scribunt, *Euclidam Geometram, Hippocrate, Leonie, Theodisio, Hermotimo, Socrate, Platone, Eudoxo, Platonis discipulo, Menachmo, Eudoxi discipulo, natu minorem esse; verum Eratosthene, & Archimede, quia is Euclidis mentionem facit, natu majorem. Etenim PROCLUS in lib. 2. comment. in Euclid. commemoratis aliquot, Platone antiquioribus, æqualibus, ac discipulis, subjicit Euclidem, qui Elementa conscripsit, non multo ætate posteriorem illis fuisse; immo addit dein, Euclidem natu minorem esse Platone, minimum nonaginta annis. Porro ex eodem autore Proclo specialius discimus, Euclidem nostrum in Ægypto, sub Ptolemao Lagi, post Alexandri Magni mortem, primo Ægypti Rege, floruisse. Quam sententiam amplectuntur GREGORIUS in præfat. in Euclid. ac CLAVIUS in Proleg. Euclidem. ut & COMMANDINUS in præfat. in Euclid. RAMUS in Schola Mathematica & multi alii. Immo si RAMO loc. cit. lib. 1. pag. 22. & 23. & FABRICIO in Bibl. Græc. lib. III. cap. XIV. §. 1. credimus, noster Geometra huic Ptolemao fuit notus: addunt præterea è Proclo eum à Ptolemao Rege interrogatum fuisse; num quid esset via ad Geometriam magis compendiaris, quam sit ista *συνταξις*? (Ita à Proclo fere semper vocatur) ad quam quæstionem ipsi à Rege propositam, eum respondisse refert Proclus: *μη, ειναι βασιλικήν ἀπείκον επί γεωμετρίας*: id est, non esse Regiam viam ad Geometriam. Conferatur SAMUEL TENULIUS in notis suis ad jamblichii*

com-

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. xii

comment. in Nicomachi Arithmetica. Ubi etiam sub *Ptolemaeo Lagi* filio in *Ægypto Euclidem* fuisse professum affirmat. Hanc autem de ætate *Euclidis* è *Procli* scriptis sententiam collectam perpendentes, ei plus ponderis & firmitatis inesse, quam cæteris antea recensitis, qui ad sequentia attendit, facile concedet. Nam nobiscum recolentes tempus, quo vixit *Proclus Lycius*, cognominatus *Diodochus*, id est successor, quod circa annum Christi quingentesimum incidit; teste *Vossio de sciens. Math. cap. 33. b. §. 26.* & *BLANCANO in Chronol. Mathem.* optime hac de re ex scriptis Græcorum antiquis, quæ successu temporis periere, erudiri potuit. Accedit quod ea, quæ de ætate *Euclidis* refert *Proclus*, ex *Theophrasti* & *Eudemi* scriptis Historiarum Geometricarum, quæ dein perditæ sunt, mutuo desumpsit: testante *COMMANDINO loc. cit.* *RAMO loc. cit.* & *TACQUET de ortu & Progressu Mathes. pag. 21.* Quod vero hi Autores Historiarum Geometricarum composuerint libros, *LAERTIUS* in vita *Theophrasti Eriisii* narrat; Eum quatuor libros Historiarum Geometricarum scripto reliquisse; pariter *Eudemi* Historiæ Geometricæ laudantur à *SIMPLICIO ad lib. 1. Phys. Aristotelis.* Conferatur *JONSIUS de Scriptoribus Histor. Philos. lib. 1. cap. xv.* Ex horum scriptis de vero vitæ tempore *Euclidis* certo informari potuit *PROCLUS*; cum hi Viri eodem tempore ac *Euclides* floruerint; *Euclidis* coætaneos eos fuisse *MENAGIUS ad Diog. Laert. lib. 5. segm. 42.* observat; ut pote

217 BREVIS NARRATIO HISTORICA

pote *Theophrastum* & *Eudemum Aristotelis* discipulos fuisse asserit, GRONOVIVS vero in *not. ad Auli Gellii lib. 13. cap. 5. Aristotelis* sodales fuisse notat. Porro VOSSIUS *loc. supra cit. cap. 15. §. 1.* scribit *Theophrastum* eodem ac *Euclides* tempore vixisse. Quibus justè ad lancem æquissimam ponderatis, in errores nos non incidere existimamus, si *Alexandrinum Mathematicum* nostrum, sub *Ptolemao Lagi* filio celebrem fuisse, cum *Prolo* statuamus. *Ptolemaus* autem, mortuo *Alexandro Magno*, primus Ægypti Rex, translato in *Philadelphum* filium regno, obiit anno primo Olympiadis cxxiv. ante Christum natum anno 282. notante PETAVIO *Ration. Temp. part. 1. lib. iii. cap. xv.* Vel secundum *Fabricii* computum *loc. cit.* post quadraginta annorum imperium; animam egit anno 277. ante natum Salvatorem, Olympiade cxxiii. Quocirca plus quam trecentis ante æram Christianam annis, Ægypto imperare coepit *Ptolemaus* primus, uti rectè censet GREGORIUS. in *præfat. laud.* seu uti CLAVIUS in *proleg.* scribit, ante nativitatem Christi anno 319. imperare incepit *Ptolemaus Lagi*. Itaque *Euclides Geometra* inter annum 319. & 282. ante nativitatem Christi inclaruissè habendus est; eoque temporis intervallo, Alexandriæ famosam suam Scholam Mathematicam erexisse, ac publicè Geometriam discipulos docuisse; cum autore TACQUET *loc. supra cit.* vitam posuit *Euclides* noster anno 284. ante Christum; ideo circa annum 300. ante Christum natum imprimis floruit.

§. IV.

§. IV. Cum vero iis temporibus imprimis celebris erat *Platonis* Schola; Platonicorum usus est institutionibus, in quorum doctrinā ita versatus est, ut summam facile sibi comparaverit laudem. Testatur enim **CLAVIUS** *in proleg. in Euclid.* Ipsum summa laude in Academicorum disciplina fuisse versatum. Ac cum in *Academia Platonis*, præceptoris instituto, *Matheseos* studium tunc maxime vigeat; *Euclides*, postquam Platonicorum dogmatibus satis instructus fuerat, totum animum ad disciplinas Mathematicas transtulit; in quibus sic eruditus est, quotidianā fere *Platonis* discipulorum consuetudine, ut progressus admirabiles, ac sempiterna ævi memoria dignissimos, in iis fecerit. Vid. **COMMANDINUS** *in Euclid. Elem. proleg.* Nihilominus ea, quibus imbutus erat, principia, Academicorum institutionibus sibi comparata; postea servavit. Etenim Platonicorum Doctrinam sectatus est. Quoniam enim Sectæ Platonice Patroni, cuncta corpora mundana, præcipue ad quinque corpora regularia, Pyramidem, sive Tetraëdron, Cubum sive Hexaëdron, Octaëdron, Dodecaëdron, & Icosaëdron, reducebant: quæque propterea corpora Platonica sæpe audiunt. Cum omnia ex quatuor Elementis constare credebant, Tetraëdron Igni, propter ejus cum acumine ignis similitudinem; Octaëdron Aëri, qui sicut aër igni, ita octaëdron Pyramidi levitate formaque proximum est; Icosaëdron Aquæ ob mobilitatem, qua

XVI BREVIS NARRATIO HISTORICA

hæc figura huic Elemento similis est; **H**exædron Terræ, ob stabilitatem ejus assignarunt; & **D**odecaëdron denique Coelo compararunt, quod, sicut coelum duodecim signis Zodiaci cingitur, ita **D**odecaëdron duodecim habet basès; item sicut Coelum suo ambitu reliqua in se comprehendit Elementa, ita **D**odecaëdron inter quinque ista corpora regularia, quæ in eandem includi possunt Sphæram omnium est maximum, & quod reliqua omnium aptissime circumscribit. Videatur **SAMUEL REYHERUS** in *Dissert. de Euclide cap. 3. §. 4.* & **MARSILIUS FICINUS** in *Compendio in Platonis Timæum cap. 49.* Hinc etiam **Euclides** noster *Geometra*, totam suam Elementarem institutionem, ad hæc quinque corpora regularia reduxit. Et tenim in suis Elementis, quinque hæc corpora Platonica, sub Geometrici examinis incudem, vocare studuit: & hunc sibi proposuisse, primarium Scopum, in Elementis suis condendis videtur. Scilicet ut omni nisi examinaret quinque ista corpora Platonica, ac ut eorum rigidam daret apodeixin; propterea duodecim priores adornavit libros. Qua de re ita loquitur **KEPLERUS**, omnes omnino Propositiones, omnium librorum; exceptis iis, quæ ad numerum perfectum ducunt; ad mundanarum figurarum constitutionem referuntur: cum Elementorum institutionis finem statuerit, * κοσμιῶν σχημάτων habitudinem & compositionem. confer. **GREGORIUS** in *Prefat. in Euclid.* Ex quibus haud obscure quilibet facile derivare potest,

Eucli-

BREVIS NARRATIO HISTORICA

mentionem faciunt *Euclidis* : qui eo nomine celebratur, quod Philosophus fuerit Socraticus ; & Auditor ipsius *Socratis* describitur. Eum ajunt, *Megarum*, Græciæ oppido, ortum fuisse ; ibidemque habitasse, & Scholam habuisse publicam, ac idcirco, *Euclidem Megarensium* appellari. Etenim de eo, recitato prius Atheniensium decreto, ita scribit **GELLIUS** *noct. attic. lib. 6. cap. 10.* Tum *Euclides*, qui indidem *megaris* erat, quique ante id decretum, & esse *Athenis*, & *Audire Socratem* consueverat ; postquam id decretum sanxerunt, sub noctem, quum advesperasceret, tunica longa muliebri indutus, & pallio versicolore amictus, & caput rica velatus, è domo sua *Megarum* ad *Socratem* commeabat ; ut vel noctis aliquo tempore consiliorum, sermonumque ejus fieret particeps. Præterea **DIOG. LAERT.** qui ejus vitam describit, *lib. II. segm. 106.* similiter asserit *Euclidem* hunc *Socraticum* *Megarensium* esse, eo quod *Megarum* natus ac versatus sit ; Sectamque condidit, ab ipso Autore, *Megaricam* dictam. Porro **STRABO** *Geogr. lib. 9. pag. 602.* Eundem *Megarum* oriundum statuit, quum de eo scribit, *habuit aliquando*, urbs scilicet *Megarensium*, *Scholam Philosophorum*, qui *Megarici* dicebantur, *successores Euclidis Socratici*, *Patria Megarensis*. Denique, ut alios omittam, **CICERO** *Academ. Quest. lib. 2. cap. 42.* testatur illum *Euclidem*, qui *Socratis* discipulus fuit, *Megarum* Patriam habuisse, ait enim ; *Post Euclides, Socratis discipulus, Megarens &c.* Quæ itaque testimonia istorum Scriptorum consona, *Patriam*

triam *Euclidis Socratici* Megaras fuisse abunde satis comprobant. Licet alii sedem ejus natalem in *Sicilia* quærant; ac ejus origines ex urbe Gela repetant, quum Eum Geloum faciunt. vid. DIOG. LAERT. *loc. cit.*

§. VI. In hujus vero *Euclidis Socratici* Ætatem, quando inclaruit, inquirendum jam nobis venit; ad quam determinandam multum nos juvant GELLII verba, paragrapho præcedenti 5ta. adducta: in quibus inter cætera ait, Eum *Athenas* ire, & *Socratem* audire fuisse solitum. Quibus addi merentur ea, quæ scribit DIOG. LAERT. *in Vita Euclidis lib. II. segm. 106.* Nam, inquit, post *Socratis Mortem*, venisse *Platonem*, ac reliquos *Philosophos*, metu *Atrocitatis Tyrannorum* compulso, ad hunc *Euclidem Megarenses*; à quo hospitio humanissime fuere excepti; notante STANLEJO *in Histor. Philos. in Vita Euclid.* Ex quibus allatis verbis attendenti manifesto apparere posse puto; *Euclidem Socraticum*, post mortem *Socratis* Præceptoris sui, vixisse; ac *Platonis* tempore *Socratis* discipuli nomine celebratum fuisse; cum vero eodem Præceptore *Socrate* usi sunt; *Platoni* notum fuisse. Unde *Socraticus* noster *Euclides Platonis* coætaneus ponitur. *Socrates* autem teste DIOG. LAERT. *lib. II. seg. 44.* mortuus est anno primo Olympiadis xcv. postquam septuaginta annos exegisset. Ac *Plato* annos natus duo de triginta adiit *Euclidem Megarenses*, autore FABRICIO *Biblioth. Græc. lib. III. cap. I. §. I.* Verum
 * * *
 Eu-

xx BREVIS NARRATIO HISTORICA.

Euclides Megarensis, ante decretum, de quo loquitur GELLIUS loco §. 5. cit. quo caverant Athenienses, qui *Megar*is civis esset, si intulisse *Athenas* pedem deprehensus esset, ut ea res ei homini capitalis esset; ante hoc decretum *Euclides Megarensis Athenis* esse, & *Socratem* audire confueverat. Quapropter suspicor clarum ac celebrem tum præ cæteris fuisse *Socraticum Euclidem*; cum *Plato* ad Eum *Megaras* venit; ac ni fallor Scholam suam jam *Megaræ* erexisse, cum una cum *Platone* reliqui Philosophi ad Eum confugiunt. Hinc videtur sequi *Euclidem Megarensis* quidem dicendum esse *Platonis* coætaneum, quod *Platonis* tempore adhuc in vivis esset; Verum cum *Platone* seniore fuisse; Quocirca imprimis circa annum 400. ante Christum natum, *Euclidem Socraticum* floruisse ponendum est.

§. VII. Cognitis jam Patria, & Ætate hujus *Euclidis Megarensis*; porro ejus Doctrinas, quibus excelluit, & mores, quibus à natura donatus fuit, investigare utile nobis futurum esse existimamus. Super his rebus DIOG. LAERTIUM rogantibus, in suis scriptis respondet, *lib. ii. segm. 106.* Eum litigiosis disputationibus cum primis addictum fuisse; ac ea propter in *Socratis* reprehensionem incurrisse: qui LAERTIO teste *lib. ii. segm. 30.* O, inquit, *Euclide, sophistis quidem uti poteris, hominibus non poteris.* Ideo ab ejus contentiosa indole Secta ejus *Eristica* dicebatur; quapropter LAERT. *lib. ii. segm.*

24. in ejus Scholam ita invehit, quod ait, non σχολήν *Scholam*, sed μόλην *Merum fel* eam esse. Quo videntur respicere ea, quibus *Timon* illum una cum cæteris *Socraticis* mordet, quæ LAERT. lib. II. *segm.* 107. refert.

*Non ego horum nugatorum curam gero, nec
alterius*

*Cujusquam; non Phadonis, quisquis ille sit,
nec litigiosi*

*Euclidis, qui Megarensibus contentionis rabiem
invenit.*

In argumentationibus non assumptionibus, sed conclusionibus utebatur. Disputationes ex similibus institutas penitus tollebat. Unum esse bonum ajebat, cujus diversa sunt tantum nomina, *prudencia* scilicet, *Dei*, *mentis*, & cætera. Conferatur STANLEJUS. in *Histor. Philos. in vita Euclidis*. Quæ è *Laërtio* allata, hujus *Euclidis* disciplinas, quibus maxime se exercuit; ac quas publice tradidit, satis manifesto declarant; quum ex iis tantum mihi colligere posse videor; Eum imprimis *Dialecticam* professum fuisse; ac discipulos suos in disputandi arte exercuisse; totumque suum studium *Dialecticæ* peritiæ impendisse; ac ejus rei imprimis gnarum fuisse. Quapropter, ni fallor, apud SUIDAM, in *Lexico ad vocabulum Euclides*, titulo *Philosophi Megarensis* tantum notatur; neque apud ullum Autorem reperio eum *Geometriæ* studium vel primis labiis gustasse

gustasse, vel ejus scientia imbutum fuisse. Immo SUIDAM Eum solummodo *Philosophi* nomine appellasse, non absque ratione factum esse conjicio; quia nempe apud Veteres Scriptores Græcos, è quibus *Suidas* sua collegit, tantummodo *Philosophi* nomine occurrit. Absit itaque ut Eum *Geometra* nomine ornaremus, quum plus arti sophisticæ, quæ à quolibet *Geometra* quam longissime remota esse debet, quam severo rerum examini tribuisse visus sit. Porro *Laërtii* verba hujus *Euclidis Philosophi* indolem & mores hæud obscure cognoscere faciunt; vehementem scilicet Eum ac litigiosum fuisse; insuper disputandi eum per cupidum adeo fuisse, ut *Megarensibus* contentionis rabiem invexerit.

§. VIII. Quod si ea, quæ de utroque *Euclide* reperire potui, hucusque enarrata, introspeciamus, illi, qui *Euclidem Geometram*, *Megarum* ortum fuisse sentiunt; ac propterea *Megarenses* vocant; *Geometram* nostrum, cum *Philosopho* illo *Megarico*, seu *Socratico* confundere mihi videntur. In his vero me parum, aut omnino nihil à recta via aberrare, si fontem ac originem, unde istam suam sententiam deduxere, sciscitemur; illa me persuadere videntur. Nam cum *Euclidem Geometram Platonis* tempore floruisse statuunt, & *Euclides* ille qui ad *Platonis* tempora refertur; ac propterea ab illis *Platonis* æqualis habetur, fuit *Philosophus Socraticus*, *Megarum* natus, ac educatus, disci-

discipulosque ibidem instituens; sicuti §. 5. è Veterum monumentis apparuit; ac proin-
 cujus Patria erat urbs illa *Megara*, vel *Megara* dicta; inde ni fallor, quia haud rite à
 se invicem ambos distinguunt *Euclides*, in
 eam opinionem, affirmandi *Euclidem Geome-*
tram Megareum esse, adducti sunt. Funda-
 mentum itaque hujus conjecturæ in eo præ-
 cipue situm est; quod *Euclidis Geometra* æ-
 tatem in *Platonis* tempora incidisse opinan-
 tur. Verum observantibus VOSSIO de
Scient. Math. cap. 15. §. 1. CLAVIO in
Proleg. in Euclid. & DECHALES in tract.
Prooem. de ortu & progressu Mathes. pag. 8.
 ad hunc errorem circa *Ætatem Euclidis* no-
 stri committendum, omnibus prævit VA-
 LERIUS MAXIMUS lib. 8. cap. 12. scri-
 bens. *Platonis quoque eruditissimum pectus hac*
cogitatio attigit; qui conductores Sacra ara de
modo & forma ejus secum sermonem confer-
re conatos, ad EUCLIDEM GEOMETRAM
ire jussit. Ex quibus itaque collegere, *Eucli-*
dem Geometram iisdem Temporibus cum
Platone inclaruisse. Sed notant Viri docti
 ad hunc Locum, mendum esse in iis *Valerii*
 verbis: quippe observat PERIZONIUS quod
Mitallerius, emendavit EUDOXUM: quo-
 niam à PLUTARCHO appellatur *Eudoxus*
Gnidius ad quem *Plato* eos oblegavit. Idem
 laudatur in nobis ad GELLII lib. 6. cap. 10.
 dicitur enim ibidem; *Meminit quidem Vale-*
rius Maximus loc. cit. Platonem quosdam ad
Euclidem Geometram misisse, sed mendum ibidem
latet; & recte Mitallerius in Editione sua re-

stituit EUDOXUM Geometram. Ita legendum ostendit Plutarchus de Deo Socratis, qui in Geometrica questione Eudoxi Cnidii Platonis discipuli meminit. Idem sentit MENAGIUS ad DIOG. LAERT. lib. II. segm. 106. scribens, illa lectio *Mitalleri* temporum rationi optime congruit. Vixit enim *Eudoxus Cnidius* nobilis ille Geometra iisdem temporibus, quibus *Plato*, cujus etiam auditor fuit; sicuti ex catalogo Mathematicorum, à *Proclo* ornato §. I. colligere est. Quare *Valerius de vero nomine Geometra parum sollicitus fuerit; & Celeberrimi Geometrae nomen haud satis circumspecte arripuerit.* Monente TORRENIO ad hunc locum. Observat porro VOSSIUS loc. cit. Delios ad *Euclidem Geometram* missos, nequidem de *Socratico* verum esse; sed quod *Plato* rejecerit illud Problema ad discipulos suos. Denique PETRUS RAMUS in *Schola Mathem. lib. I. pag. m. 22. 23.* existimat, quod hac in re major fides sit habenda *Eratostheni*, qui *Euclidem Geometricam* proxime secutus est; quam *Valerio*: ERATOSTHENES autem in Epistola quadam ad Regem *Ptolemaeum*, inter cætera hæc scribit verba. *Aliquando vero post ajunt Delios grassante morbo, secundum Oraculum, duplicata quandam Aram jussos, incidisse in eandem anxietatem, tumque implorando Platonicos in Academia Geometras oravisse, ut questionem dissolverent. &c.* Quapropter hinc etiam liquido attendenti cuilibet constare potest, omnino errasse in nominis descriptione *Valerium*. Nam nec quidquam duplicati Cubi ad
Eu-

Euclidem Geometram ab Autoribus refertur ; nec *Euclides* in Elementis quidquam nominatim de duplicando Cubo proposuit. Cum itaque hæc omnia æqua lance ponderentur , nullas inficias ire potest ; quin ille locus *Valerii* vitio laboret ; nomenque *Euclidis Geometra* ibidem delendum sit. Verum destructo VALERII citato loco , corruere eorum sententiam , qui *Euclidis Geometra* Ætatem ad *Platonis* tempora referunt , meo iudicio videtur : cum præter *Valerium* è Veteribus testem nullum alium pro hac opinione habent. Sed quia ex eadem conjectura manifesto satis orta est ; ea cogitatio de Patria *Euclidis Geometra* , qua *Megarum* fuisse statuitur ; cum binos hos inter se confundunt *Euclides* ; idcirco *Euclidem Geometram* , *Megarenses* dicere non audeam.

§. IX. Non autem inter se confundendos esse binos hos *Euclides* , sed à se invicem omnino distinguendos esse , multa sunt quæ id suadent. In utroque enim *Euclide* tot characteres differentes licet reperire , qui abunde alterum ab altero diversum fuisse , sine ullo dubio palam ostendunt. Etenim tam *Geometra Euclidis* , quam *Philosophi Socratici* Patriam , in qua quilibet floruit , Domicilium habuit , ac Publice Scientias docuit ; si nobis ob oculos ponamus ; ea quæ §. 2. 5. & 8. adduximus , ut utriusque eandem fuisse putaremus , non permittunt. Quum *Euclides* , qui Geometriam exercuit , ac publice eam professus fuit , *Alexandria*

CVI BREVIS NARRATIO HISTORICA

Scholam suam habuit, ibidemque vitam degit. Alter vero *Euclides*, qui *Socratis* Auditor fuit, ac Philosophiam publice docuit, *Megara* discipulos instituit, & erudit, patriosque eo in oppido habuit Lares. Præterea magis eos à se invicem distinguere facit utriusque *Ætas* diversa. Quippe *Socraticus* ille *Philosophus*, Tempore *Socratis* jam erat notus. §. 6. ejusque Auditor fuit, ac *Megara* eo tempore, Philosophiæ partem eam, quæ *Dialectica* vocatur, instituit. *Geometra* autem *Euclides* sub *Ptolemao Lagi* filio demum clarus fuit, §. 3. eoque tempore *Geometriam* docuit. A morte vero *Socratis* usque ad *Ptolemaum* primum elapsi sunt anni xcv. monente STANLEJO in *vi-
ta Euclidis*. Quare ad minimum xc. anni effluxere, inter *Euclidem Socraticum*, & *Euclidem Geometram*; uti censet VOSSIUS *de Scient. Mathem. loc. cit.* Multo itaque junior fuit *Euclides Geometra*, quam *Megarensis Euclides*. Confer. CLAVIUS in *Proleg. in Euclid.* GREGORIUS in *prefat.* COMMANDINUS in *Euclid. Elem. Proleg.* & multi alii. Porro inter illos discrimen licet observare, si Scholas, in quibus quilibet eruditus fuit, contemplemur. Prodiit enim *Megarensis Euclides* è *Socratis* Schola, *Mathematicus* vero *Euclides* è *Platonica*. Augetur illud discrimen inter ambos illos *Euclides*, si diversa studiorum genera, in quibus se primo exercere; si diversas doctrinarum species, quas dein publice professi sunt, cogitemus. Fuit enim *Euclides Socraticus Parme-
nidis*

vidis librorum valde studiosus, Autore LA-
 ERTIO in ejus vita, ac in disputandi arte
 imprimis versatus est; *Alexandrinus* autem
Euclides, *Platonis* ac *Platoniorum* de Rerum
 Naturalium scientia, sententias & rationes
 investigavit, easque omni nisu studuit, iis-
 que percipiendis & examinandis totus in-
 cubuit; dein Geometriam adit, eamque
 maxima cum laude excoluit. Docuit *Mega-
 rensis Euclides* artem Dialecticam, in eaque
 scientia suos praecipue erudit discipulos;
 Informavit *Alexandrinus Euclides* Quantorum
 contemplationes, & in iis speculari &
 rimandis Auditores suos occupatos tenuit.
 Nec parum exaggerabunt differentiam inter
 ambos hos homines statuendam, monumen-
 ta, quibus famam suam longam effecere.
 Celebratur *Euclides Megarensis*, quod Dialo-
 gos sex composuerit, ac scriptis reliquerit,
 qui recensentur à DIOG. LAERT. in ejus
 vita, ac sunt sequentes, *Lamprias*, *Aeschines*,
Phoenix, vel ut apud *Suidam*, *Phoenices*,
Crito, *Alcibiades*, *Erosicus*. Laudatur
Alexandrinus Euclides, quod scripta ad rem
 Mathematicam omnia spectantia composue-
 rit, litterisque mandaverit. Distinguuntur
 ulterius à se invicem bini hi Autores, quate-
 nus *Megarensis* Philosophi tantum nomine
 occurrit, *Alexandrinus* autem, Geometra
 ubique audit. Tandem mores quibus uter-
 que donatus erat, facile inter ambos nota-
 bilem efficient distinctionem. Sicuti enim
 natu major *Euclides* vehemens ac litigiosus
 fuit, sic minor natu, *Geometra* nempe nos-
 ter

XXVIII BREVIS NARRATIO HISTORICA

ster suavissimi ingenii Vir fuit, ab omni contentione abhorrens. Quod si itaque ea, quæ in utroque observavimus *Euclide*, inter se comparemus, asserere neminem audere suspicor, ambos illos, qui *Euclidis* nomine apud prædictos Autores veniunt, pro uno eodemque habendos esse; contra distinctas omnino fuisse personas, neququam inter se confundendas; affirmare omnes optimo jure teneri. Consentiant GREGORIUS *in præfat.* SAVILIUS. *in præfæt. in Euclid.* CLAVIUS *in proleg.* COMMANDINUS *in proleg.* & VOSSIUS *loc. cit.* multique alii.

S. X. Præter jam dictos binos *Euclides*, *Philosophum* nempe, & *Geometram*, alii apud Scriptores leguntur, qui nomine *Euclidis* celebrantur: quos ob nominis convenientiam hic brevibus recensere à proposito nostro non alienum foret. Quorum primus est *Euclides Archon* qui Athenis fuit anno 2do Olympiadis LXXXVII. Secundus fuit itidem *Euclides Archon*, sub quo triginta Tyranni expulsi, ille vixit anno 2do Olympiadis xciv. Tertius *Euclides Atheniensis*, sed forte non diversus à prioribus. Quartus fuit *Euclides Vates*, *Xenophonti* amicus. Quintus *Euclides Lapidida*, cujus mentio in *Platonis* Testamento existat. Sextus fuit *Euclides* Frater *Cleomedis*, Lacedæmoniorum Regis. Septimus vocatur *Euclides Pacatianus*, cujus antidotum refertur à *Galeno* in antidotis. Octavus est *Euclides Platonicus*. Nonus fuit *Euclides Maximi Byz.* filius. Decimus appellatur

tur *Euclides Parasitus*, *Smicrini* filius, cognomento *εὐτελον*. Undecimus fuit *Euclides Laco*. Duodecimus fuit *Euclides Rhetor*, cujus meminit STRABO *Geogr. lib. 14. pag. 969*. Confer. FABRICIUS in *Bibliotheca Grac. lib. 3. cap. 14. §. 1. in notis*. & STANLEJUS in *Vita Euclidis Megarensis*

§. XII. Sed missis reliquis omnibus, de *Euclide Geometra* tantum scribere nobis animus est: cujus scripta, quibus sui nobis commendaverit memoriam, recensere ordinis & instituti ratio postulare videtur. Ea vero GREGORIUS in *prefat. in Euclid.* partim è *Pappo Alexandrino, lib. 7. collect. Mathem.* Partim è *Proclo lib. 2. Comment. in Euclid.* collegit: eaque porro recensentur à DECHALES in *tractatu de Ortu & progressu Mathes.* CLAVIO in *Proleg. in Euclid.* FABRICIO in *Biblioth. Grac. lib. 3. cap. 14.* VOSSIO de *Scientiis Mathem.* multis aliis: ac sequentia enumerantur. Inter *Euclidis Geometra* scripta, quæ partim perire, partim supersunt; primo numerantur *Libri tres Porismatum*; Verum hi magno rei Geometricæ, præsertim loci resoluti, damno perire. Quædam tamen eorum apud *Pappum in lib. 7. Collect. Mathem.* supersunt; reliqua autem hodie non exstant. Secundo recensentur libri duo *Locorum ad superficiem*, ad *Analysim* Geometricam pertinentes; hi etiam libri temporum injuria perire, præterquam quod *Pappus Alexandrinus* horum quatuor lemmata notavit. Tertio conscripsit *Librum Falla*

III: BREVIS NARRATIO HISTORICA

Fallaciarum, neque hic hodie reperitur; in eo vero rationes falsa deprehendendi, & paralogismos arguendi ostendit; quod scriptum, non sine notabili rei Logicæ ac Mathematicæ jactura, perditum est. *Quarto* composuit quatuor libros *Conicorum*, quos *Apollonius Pergæus* explevit, eisque alios quatuor libros adjecit, qui hodie sub *Apollonii* nomine leguntur. *Quinto* refert **DECHALES** *librum de sphaera* ab *Euclide* ornatum, qui cum cæteris periit. Præter hos libros perditos alii sunt, qui feliciori fato ab interitu servati sunt: inter eos tamen varii reperiuntur, de quibus valde dubitatur an quidem sint *Euclidis*. *Sexto* *Euclidi* tribuitur liber unicus *Datorum*, quæ ad analysin Geometricam sunt comparata, & ejus quasi *Elementa* Veteribus Geometris familiaria. Inter alios hunc *Datorum* librum succincte demonstratum in lucem emisit *Isaacus Barrow*; Ac olim à *Claudio Hardy* cum *Marini Philosophi* Commentario Græcè emissus, ac Latine versus est, additis obscurioribus locis Scholiis necessariis. vid. **VOSSIUS** *de Scient. Math. in addendis pag. m. 433.* Idque felicius præstitit *Hardy*, quam antea *Zambertus*, qui itidem hunc *Datorum* librum Latine vertit. *Septimo* Ei adscribuntur *Tractatus* duo *Musici*, nempe *Introductio Harmonicæ* & *Sectio Canonis*: dubitat autem **GREGORIUS** an uterque ab *Euclide* sit scriptus; qui hodie eo nomine *Euclidis* ab aliis adjudicantur; nam **MEIBOMIUS** eos tractatus *musicos Euclidis* tribuit; cui assentitur **FABRICIUS** *loc. cit.*

cis. MEIBOMIUS omnium optime in eos
 Commentatus est; eosque Volumini suo *Ve-*
terum Musicorum inseruit. *Octavo* inter ejus
 Scripta occurrit Liber unicus *Phaenomenorum*;
 in quo solo Coelestia, sive Astronomiae
 principia attingit. Hunc VOSSIUS *loc. cit.*
 a Bartholomeo Zamberto cum reliquis quibus-
 dam Opusculis Latine versum fuisse, refert.
 Graece & Latine sine Demonstrationibus in-
 ter caetera *Euclidis Scripta Phaenomena* edidit
 Conradus Dasypodius. Nono scripto reliquit
Euclides Opticam, & Catoptricam; verum
 GREGORIUS & SAVILIUS multa se sua-
 dere dicunt, ad suspicandum opus illud,
 quod hodie *Optica & Catoptrica Euclidis* voca-
 tur, spurium esse; vel temporis lapsu pro-
 fus corruptum. Interpretatus est *Opticam &*
Catoptricam Joannes Pena; tum Hetrusco idio-
 mate, ex interpretatione *Ignatii Dantis* lu-
 cem vidit hic libellus; sed Autore *Blancano*;
Ignatii expositio mutila est & manca. De-
 cimo additur Scriptis *Euclidis* editis liber *de*
Divisionibus, qui latine tantum exstat: Mul-
 ti censent librum *Euclidis de Divisionibus* eun-
 dem esse libellum Arabica Lingua scriptum
 de superficierum divisionibus, *Machometo*
Bagdedino vulgo adscriptum; qui cura &
 studio *Joannis Des Londinensis, & Fredrici*
Commandini latine versus lucem vidit. *Savi-*
lius autem & *Gregorius* illum libellum non
Euclidis esse opinantur; constat tamen *Eucli-*
dem de Divisionibus librum scripsisse. Undecimo
 his adjungit *Gregorius*, Fragmentum, quod
 in *Zamberti* editione latina *Euclidi* addicitur;

XXXI . BREVIS NARRATIO HISTORICA

in quo agitur de *Levi & Ponderoso*; sed pro spūrio id habet SAVILIUS in *praefat. in Euclid.* Duodecimō Scripsit *Euclides* absolutum opus *Elementorum*, cum Sole & Luna duratarum; quod plusquam 2000. annos magnam æstimationem obtinuit. De hujus editionibus & commentariis in sequentibus in specie §. 32. agere constituimus. Super his *Euclidis* Scriptis omnino legi merentur quæ de iis notarunt GREGORIUS in *praefat.* & FABRICIUS in *Biblioth. Græc. lib. III. cap. 14. §. XI-XVI. pag. 377-381.*

§. XII. Ex his vero omnibus Scriptis enumeratis, quæ *Euclidis* nomine veniunt, *Elementorum* librum elegimus; de quo pauca differemus, cætera silentio prætereuntes. Quippe sunt *Elementa Euclidis*, quæ præ reliquis præcipue in omnium versantur manibus; quæque à cunctis Geometriæ studiosis nocte dieque tractentur. Sunt *Elementa tantum Planorum, & Solidorum*, quæ in hac editione occurrunt; de iis itaque permagni nostra interest scire, quid Autores sentiunt. *Euclidem Geometram Elementorum* opus construxisse, inter omnes, tam Antiquiores, quam Recentiores convenit Autores. Et quamvis ante Eum à diversis *Elementa sint composita Geometrica*, ac scriptis consignata; sicuti ex *Procli* & aliorum testimonio constat; cum multi ante Eum inclaruere Viri, de rebus Geometricis optime meriti, non solum in *Ægypto*, sed etiam in *Græcia*, qui sua super *Mathematica* disci-

disciplina cogitata & inventa litteris notarunt: tamen VOSSIO teste *de Scient. Math. cap. 14. Euclidis Elementa* sunt opus vetustissimum quod in Geometria habemus; cum reliquorum præclarorum Geometrarum opera, temporis injuria periere. Præterea opus, quod *Elementa* inscripsit, omnium Græcorum absolutissimum est corpus principiorum Geometriæ; non obstantibus aliis Geometriæ Elementis, à diversis compositis. Quippe in Græcis primus ille fuit, qui omnia fundamenta, ad Geometriæ Scientiam ducuntia, in *Elementari* suo corpore collegit; ac collecta digessit. Hac de causa depingebatur *Euclides* digitis demetiens; unde SIDONIUS APOLLINARIS *lib. 9. Epist. 9.* ait, *per Gymnasia pingi Euclidem, propter mensuram spatia, digitis laxatis.* In his autem *Elementaribus* institutionibus, adornandis, non omnium Problematum, & Theorematum unicus Inventor & Autor statuendus est *Euclides*; verum aliorum Autorum tum inventis, tum scriptis, in suis Elementis componendis, usus est; quorum ea, quæ invenire, vel in ordinem redegit; vel quæ non satis valide demonstrata erant, firmissimis munivit demonstrationibus. Quapropter *Elementa Euclidea*, quo ad maximam partem, originem suam traxere, ex Scriptis Geometrarum, vel ante *Euclidis* tempora, vel iisdem temporibus inclarescentium; quæ consuluit. Ita ut hoc corpus *Elementorum* sit compositum, partim ex Problematibus, & Theorematibus ab aliis excogitatis; quæ ex

* * *

iis

iis selegit, utpote ad propositum suum assequendum ducentia; ac quæ in convenientem ordinem redegit; vel si firmæ defessent probationes, evidentibus Demonstrationibus confirmavit; partim ex Propositionibus à se inventis, probationibus invictis, iis additis. Quæ tamen omnia in concinnum istum ordinem adduxit, quo hodie *Elementa Euclidea* sunt ornata. Etenim PROCLUS *lib. 2. Comment. in Euclid.* nobis autor est, *Euclidem* multa in suis Elementis ab aliis inventa collegisse, multa *Eudoxi* ordinasse, multa *Theæteto* perfecisse; ea præterea quæ laxius à prioribus demonstrata erant, firmissimis Apodeixibus, quæ nec coargui, nec convinci possunt, munivisse. Ea propter à *Proclo* aliisque Veteribus Scriptoribus καὶ ἔξοχῃ dictus est σοιζεωτής, Elementorum Constructor, & Demonstrator scilicet, ac Geometra: conferantur RICCIOLUS *Chron. pars. 2.* GREGORIUS *in præfat.* COMMANDINUS. *proleg. in Euclid.* CLAVIUS *Proleg. in Euclid.* DÉCHALES, *loc. cit.* VOSSIUS *loc. cit.*

§. XIII. Quod vero *Euclidis Elementa* multum debeant aliorum cogitatis, ac inventa pristinorum Geometrarum contineant, è quibus sunt conflata; extra omnem dubitationis aleam ponunt Propositiones & Demonstrationes, quæ in ipsis Elementis occurrunt: quarum Inventores passim apud Veteres nominantur, quibus etiam Inventionis gloria tribuitur. Etenim celebratur
 THA-

THALES MILESIUS, qui primus nomine Sapiientis est appellatus, Eum invenisse Ifo-
 scelium Triangulorum angulos ad basin esse
 æquales : quæ est PROPOSITIO 5. ELE-
 MENTI. I. Eandem propositionem univer-
 salioreni reddidit GEMINUS Geometra.
 Laudatur itidem OENOPIDES CHIUS ,
 ob inventum illud præclare , perpendicula-
 rem nempe ad datam lineam ex puncto ex-
 tra eam dato ducere ; illaque est PROPO-
 SITIO. 12. ELEMENTI. I. Memoratur ,
 æqualitatem angulorum ad verticem opposi-
 torum THALETEM MILESIUM detexisse ;
 quam PROPOSITIONEM *Euclides* 15. ELE-
 MENTI. I. fecit. Laus debetur EUPHOR-
 BO PHRYGI , quod modum , cujuslibet
 Trianguli ex tribus lineis componendi , in-
 venerit ; eaque est in ordine Euclideo 22.
 PROPOSITIO ELEMENTI. I. Quæ hanc
 proxime sequitur 27. PROPOSITIO citati
 Elementi , inventis OENOPIDIS CHII
 debetur ; cum Geometra ille demonstravit
 ad datum punctum lineæ propositæ , angulo
 dato , æqualem angulum rectilineum consti-
 tuere. *De thales* autem existimat , Eum non
 invenisse ipsam Propositionem , sed Demon-
 strationem aliquam reperisse. Inter THA-
 LETIS MILESII inventa Geometrica , nu-
 meratur porro æqualitas omnimoda Trian-
 gulorum , unum latus , & duos angulos ad
 invicem æquales habentium ; quæ est apud
Euclidem PROPOSITIO. 26. ELEMENTI.
 I. Præterea , nullus est , qui vel primis , ut
 ajunt , labiis , Geometricum gustavit studium ,
 * * * 2 vel

vel parum se in eo exercuit, quin PYTHAGORÆ in Geometria merita, propter inventa ejus utilissima, quæ inter *Euclidis Elementa* reperiuntur, extolli admodum animadverterit. Ille enim Autor est, Trianguli cujuscunque rectilinei tres angulos simul sumtos duobus rectis æquales esse; quæ est 32. PROPOSITIO. ELEMENTI. I. Eidem huic præclaro Geometræ acceptas referimus PROPOSITIONES. 44, 47. ejusque conversam 48. ELEMENTI. I. Quarum 47. PROPOSITIO speciali notatur denominatione, satis indicante, PYTHAGORAM primum Autorem habere; cum *Hecatombes Pythagorici* nomen gerit, sub eoque titulo passim apud Scriptores celebratur. Hujus vero denominationis originem petunt ab oblatione Boum, à *Pythagora* Musis facta, in gratiarum actionem, pro ejus Demonstrationis inventione. Hæc est illa adeo celebris Propositio, quæ ob ingentem suam utilitatem, Inventoris sui famam immortalem reddidit. Præter has recitatas Propositiones in Elemento primo *Euclidis* occurrentes, aliæ etiam sunt, quæ in sequentibus *Euclidis* Elementis reperiuntur. Nam THALETEM MILESIUM, angulum in semicirculo esse rectum, invenisse referunt; eaque est apud *Euclidem* PROPOSITIO 31. ELEMENTI. III. Porro inter ejusdem THALETIS inventa variæ Propositiones Elementi Quarti enumerantur. Etenim tribui Ei solent à multis Scriptoribus PROPOSITIONES. 2, 3, 4. & 5. ELEMENTI. IV.

Qui

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. XXXVII

Quibus addunt, Eum reperisse modum, Triangulum Æquilaterum in Circulo inscribendi; cujus inventi lætitia elatus, Bovem Musis immolasse dicitur. Porro sunt qui statuunt, QUINTUM EUCLIDIS ELEMENTUM ab EUDOXO CNIDIO esse compositum: quia EUDOXO à veteribus, de Proportionibus à se inventis, multa adscribuntur. Certum enim est è testimoniis antiquorum, EUDOXUM de Proportionibus scripsisse. Si itaque omnia, quæ in ELEMENTO V. EUCLIDIS occurrunt, non sunt EUDOXI, saltem pleraque ab ipso profecta esse, *Proclus* clare satis testatur. Quare *Euclides* ea, quæ de Proportionibus habet, ex EUDOXI scriptis hausisse, si non omnia, saltem plurima, censendus est; cum *Proclus* ait, *Euclidem* multa *Eudoxi* in suis Elementis in ordinem rede-gisse. Memoratur etiam THEÆTETUS, ob Demonstrationem PROPOSITIONIS. 10. ELEMENTI. X. à se primo datam. Denique quæ de SOLIDIS, tribus ultimis ELEMENTIS, nempe XI, XII, XIII. demonstravit *Euclides*, in iis THEÆTETUM, ARISTÆUM, aliosque secutum esse *Euclidem*, Autores referunt. Verum inde non derogatur, ejus laudi, quod aliorum placita consuluerit; cum inconcussis fundamentis Autorum inventa, ordine nunquam corrigendo, superstruxerit. Videantur PROCLI *Comment. in Euclid.* DECHALES in *Traçt. de ortu & Progressu Mathes. pag. 7. 8.* & TACQUET

XXXVIII BREVIS NARRATIO HISTORICA

QUET in *Historica* narrat de ortu & progressu *Mathes.* aliique plures.

§. XIV. Hoc vero Elementorum corpus, secundum multorum Doctorum sententiam, *Euclides* divisit in *Tredecim* libros; licet vulgo à nonnullis *quindecim* enumerentur Elementorum libri: immo in quibusdam exemplaribus *Sedecim Euclidis* nomen ferunt. Verum observat VOSSIUS de *Scient. Math. cap. xv. §. 3.* etiamsi multi putent Elementa hæc constare libris xv. rem tamen non ita apertam esse de duobus postremis. Ansam dubitandi de XIV. & XV. Elementis, an quidem *Euclidis* sint, præbet *Theonis* in *Euclidem* Commentarius. Etenim *Theon Alexandrinus*, *Euclidis* Elementorum valde studiosus, qui ea suis exposuit Discipulis, claruit *Theodosio Magno* imperante, anno Christi 395. mortuo, uti refert VOSSIUS *loc. cit. cap. 16. §. 9.* Ille vero *Theon* in *tredecim Euclidis* priores libros, tantum commentatus est; uti *Campani* secundum *Theonis* expositionem, Editio Elementorum *Euclidis* testatur. Qua itaque expositione in hæc Elementa manifesto indicasse videtur, Eum *tredecim* tantum agnovisse libros Elementorum ab *Euclide* conscriptos. Præterea *Marinus Philosophus*, *Procli Diadochi* discipulus, circa annum Christi 500. florens, in *Protheoria ad Data Euclidis*, *Tredecim* Elementorum libros *Euclidi* solummodo tribuit. Tot etiam libri reperiuntur, in Elementorum *Euclidis* versione Arabica *Nasfridini Tufini*

fini Persæ, quæ luculentis typis Arabicis lucem vidit Romæ anno 1594. ex Typographia Medicea. Sicuti multa alia sunt exemplaria, uti *Rhodiis*, *Richardis*, aliorumque, in quibus ultimi duo nempe XIV. & XV. non reperiuntur libri. Accedit quod ultima propositio Elementi XIII. veluti colophonem operi imponit. Conferatur FABRICIUS in *Biblioth. Græc. lib. III. cap. 14.* Sed porro observandum venit, Librum decimum quartum propriam habere præfationem, quam nec primum Euclidis Elementum habet; non vano argumento inquit GREGORIUS in *præfat. in Elem. Euclid. duos ultimos libros alterius esse quam Euclidis.* Consentiente VOSSIO de *Scienc. Math. cap. xv. §. 3.* & DECHALES in *Tract. de ortu & progres. Math. pag. 8. 9.* Ex quibus abunde videtur constare, Tredecim Elementorum libros, ab Euclide tantum fuisse compositos; binos reliquos scilicet XIV. & XV. alium agnoscere Autorem. Hi vero posteriores bini libri, à quamplurimis, Commentarii HYPsiclis ALEXANDRINI habentur. Vixit *Hypsiclis* circa Tempora *Ptolemæi Lathyri* (nempe toto seculo, vel paulo ulterius, ante natum Christum.) *Isidori* summi Mathematici discipulus. VOSSIUS *loc. cit. cap. 54. §. 7.* Ipsa præfatio quæ Elemento XIV. præmittitur, est prooemium *Hypsiclis Alexandrini* ad *Protarchum*: ex quo haud difficulter colligere est, illud neutiquam convenire *Euclidis*, at bene *Hypsicli Alexandrino*, de quo in isto loquitur Prooemio. Ut cæ-

XL BREVIS NARRATIO HISTORICA

tera taceam, quot verba, tot argumeta, Euclidem non esse ejus Autorem arguentia, reperiuntur. Etenim mentionem injicit scriptorum *Apollonii*; de comparatione Dodecaëdri, & Icosaëdri, eidem sphaeræ inscriptorum: id neutiquam de *Euclide*, qui ante *Apollonium* scriptis inclaruit, prædicari potest; sed quidem de *Hypsicle* qui multo post vixit. Conferatur FABRICIUS *loc. cit.* Sicut etiam GEORGIUS VALLA, & BARTHOLOMÆUS ZAMBERTUS VENETUS, qui sub *Hypsiclis Alexandrini* nomine, posteriores duos Elementorum libros, latine verterunt. Eisdem ob *Hypsicle Alexandrino* compositos esse censent, SAVILIUS, GREGORIUS, CLAVIUS, DECHALES; locis jam jam citatis; & innumeri alii. Decimus Sextus Liber, qui in nonnullis codicibus, non tamen in omnibus, prioribus annectitur, nunquam *Euclidi* fuit adscriptus; licet in ordine Elementorum in Clavii Editione Euclidis Elementis annumeretur; sed ille est adjectus à FRANCISCO FLUSSATE CANDALLA; uti in fronte hujus libri à quolibet legere est. Ac ob materię convenientiam Elementis adjungitur, sicuti duo præcedentes libri, de simili argumento, cum Elemento decimo tertio Euclidis tractantes, propterea à nonnullis cum Euclidis Elementis XIII. connectuntur, iisque adjunguntur.

§. XV. Tredecim hi Elementorum libri, respectu Doctrinarum, quas *Euclides* de
Quan-

Quantitatibus in iis pertractavit, cum CLAVIO & GREGORIO commode in quatuor disparti possunt partes: licet bipartita divisio, in *Superficiarum & Solidorum* contemplationem, sufficiens esset; quia PROCLUS nobis Auctor est, nullam peculiarem suis in Elementis, de Punctis & Lineis tractationem instituisse *Euclidem*. Verum Solidorum *Euclidis* speculationes, de corporibus regularibus Sphaerae includendis, rite intelligi nequeunt, nisi praecesserit notitia Linearum Commensurabilium, & Incommensurabilium; cum diametri ad latus proportio non semper rationalis est. Harum vero Linearum intelligentia, Numerorum scientiam praeviam ultro efflagitat; ac cum corpora illa solida, basibus planis, lateribus, & angulis planis continentur; cumque omne Solidum praesupponit Planum, ex quo Originem ducit, oportebat Doctrinam Planorum primo loco tradere: inde nata est Divisio horum Elementorum in partes quatuor. *In prima parte, Plana* contemplatur; quorum Doctrinam Sex prioribus absolvit libris: & quidem ita, ut Quatuor primis Elementis Plana absolute speculetur; sequente vero Elemento Quinto Magnitudinum Proportiones in genere tractat; easque Figuris nonnullis Planis in Sexto Elemento applicat. *Secunda pars, Numerorum* affectiones exponit, quorum notitiam tribus sequentibus libris, Scilicet Septimo, Octavo, & Nono comprehendit. *Tertia in parte, Symmetriam*, sive de Lineis commensurabilibus, & incommensurabilibus

XLI BREVIS NARRATIO HISTORICA

Scientiam docet, hancque unico, Decimo nempe libro complexus est. *Quarta* denique *in parte*, *Stereometriam*, seu solidorum doctrinam examini subjicit, eorumque contemplationem tribus ultimis libris, Undecimo, Duodecimo, & Decimo tertio, proponit ac demonstrat. Quibus peractis cum ultima propositione Libri Decimi tertii Elementa sua claudit.

§. XVI. Continent hi libri in se principia & fundamenta ad Geometriæ intelligentiam scitu necessaria; sicuti singulorum librorum contenta quemlibet attentum facile docere possunt.

Enim *primo in libro*, Triangulorum; omnium figurarum planarum simplicissimarum & primarum ortus, affectionesque primum *Euclides* considerat; tum juxta angulos, tum juxta latera ipsa inter se comparans; quibus subjungit anguli & lineæ bisectionem; addens perpendicularis constructionem; angulos rectos, obtusos, acutos, deinceps-positos, adverticem, externos, internos. Dein linearum æquidistantium proprietates investigans, ad ipsa descendit parallelogramma ex iis nata; eorum ortus, & symptomata, quæ illis insunt, declarat. Porro Triangula cum parallelogrammis comparat, ac quonam pacto parallelogrammum æquale fiat Triangulo assignat. Tandem in Triangulo Rectangulo quadrati, quod à laterè rectum angulum subtendente, describitur, cum quadratis, quæ à reliquis lateribus fiunt, proportionem investigat. In

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. XLIII

In *secundo libro*, parallelogrammi rectanguli, gnomonisque definitionem tradit; lineæque divisæ, quanta sint quadrata ostendit; illaque cum parallelogrammis segmentorum confert; dein quadratorum, quæ à lateribus triangulorum obtusangulorum, & acutangulorum describuntur, proportionem cum quadratis, quæ fiunt à subtendentibus angulum obtusum & acutum, expendit. Denique ostendit qua ratione construatur quadratum rectilineo dato æquale. Hujus libri propositiones, præter linearem, qualem in plerisque codicibus habent, demonstrationem, etiam decem priores in numeris demonstrari possunt; quod jam olim præstitit *Barleamus Monachus*, ac post linearum demonstrationem in commentario suo numeralem subjungit *Clavius*. Nonnulli per Algebram speciosam easdem resolvunt, uti *Sturmius* in *Archimede Germanico*, aliique.

Tertius liber, agit de iis, quæ circulis accidunt, ac de rectis lineis in circulo vel ad circulum ductis; itemque angulos tam ad circulorum centra, quam ad peripherias constitutos rimatur; ultimo æqualitatem angulorum æqualibus arcibus chordisque insistentium demonstrat.

Quartus qui subjungitur *liber* quasi tertii praxis est, figurarum planarum, Trianguli, Quadrati, Pentagoni, Hexagoni, Quindecagoni inscriptiones in circulo, & circumscriptioes docens.

Quintus qui sequitur *liber* Magnitudinum Proportiones generales tradit; modosque argu-

XLIV BREVIS NARRATIO HISTORICA

argumentandi quosdam , in proportionibus apud Geometras frequentissime usitatos : alternam seu permutatam rationem , inversam , compositionem , divisionem , conversionem , ex æqualitate ordinatam ac perturbatam ; firmos ac validos esse ostendit.

In sexto libro , proportionibus figurarum planarum commonstrat , ostendens Phænomena Triangulorum proportionalium , æqualium , similibusque ; sectionem lineæ in tot , quot , volueris , partes ; inventionem tertiæ , quartæ , ac mediæ proportionalis ; rationes figurarum reciprocarum , & parallelogrammorum ad se invicem , nec non polygonorum , parallelogrammorum applicationes ad rectas lineas , quæ vel deficiunt parallelogrammis similibus , vel excedunt : porro quomodo recta linea terminata extrema ac media ratione secetur ; ultimo proportionibus circumferentiarum , angulorum , ac sectorum in circulis æqualibus inquirat.

Septimus liber , numerorum indicat proprietates , in eo agitur de numeris primis & compositis ; & quo pacto numerorum non primorum maxima communis mensura invenitur ; de numerorum parte , & partibus ; de numeris multiplicibus , de proportionalibus , & quæcunque in libro quinto de magnitudinibus generatim , eadem fere & de numeris particulatim hic demonstrantur.

Octavus liber , numeros deinceps proportionales , numeros planos , quadratos , cubos , & solidos ; similes planos , atque similes solidos indicat.

Nonus

Nomus, numeros similes planos, cubos, solidos, numeros deinceps proportionales, sive ab unitate, sive simpliciter; numeros primos, numeros pares, impares, pariter pares, pariter impares, numeros perfectos declarat.

De hisce tribus numerorum libris, qui Arithmeti corum vocantur, dissentiunt inter se Viri Docti. Quidam putant *Euclidem* in iis plus præstitisse, quam ejus præstare fuit intentio; ac ex iis profluxisse quidquid hætenus de numeris scitur, aut deinceps sciri potest; quam sententiam amplectitur TACQUET *in præfat. Arithmetica sua*. Quidam vero contendunt, *Euclidem* tantum de Arithmetica iis in libris tractasse, quantum rei Geometricæ inservit; ut planius ac plenius commensurabilium & incommensurabilium demonstrationes fieri possent: inter quos CLAVIUS, RHODIUS, FRANCISCUS FLUSSAS CANDALLA; scribit enim CLAVIUS *ad Def. 1. Elem. 10. Absolvit Euclides in antecedentibus tribus libris ea, quæ ad numeros spectant, quantum satis visum est ad res Geometricas intelligendas*; idem sentit FLUSSAS *in præfat. in lib. 7.*

Decimus liber, magnitudines commensurabiles & incommensurabiles, itemque rationales & irrationales explorat.

In Undecimo, tandem ad Stereometriam devolvimus, in qua pertractanda, eodem quo in planis processerat, usus est modo; à simplicissimis, Geometrarum more incipiens, lineis scilicet, quatenus ad corpora
foli.

XLVI BREVIS NARRATIO HISTORICA

solida referuntur; quando in uno plano positus, iisque ad planum vel rectis, seu perpendicularibus, vel parallelis; item de planis sese mutuo secantibus; quomodo à puncto in sublimi dato ad planum perpendicularares ducuntur; denique differuntur tum de planis, tum de solidis angulis, de parallelepipedis, & prismatibus æqualibus nonnulla.

Duodecimus, ac solidorum secundus liber, doctrinam de corporibus fusius persequitur, in eo prismata & pyramides, cylindri & conii invicem comparantur, simulque edocet inscriptionem polygoni in circulo, & Polyedri in sphaera; sphaerasque triplicatam suarum diametrorum habere rationem.

Decimus Tertius, corporum regularium quinque, seu Platoniorum dictorum, constitutionem, contemplatur, ea corpora quidem Platonica appellantur, à Pythagora vero jam defecta sunt, uti patet ex veteri Epigrammate in *Synopsi Geometrica* MICH. PSELLI allegato,

Σχήματα πέντε Πλάτωνος, ἀ Πυθαγόρας σοφὸς
εὔρει.

Πυθαγόρας σοφὸς εὔρει, Πλάτων δ' ἀριδιὰν ἰδι-
δαξεν.

Εὐκλείδης ἐπὶ τοῖσι κλίσι περιβαλλὸς ἔτευξεν.

hoc est,

*Figura quinque (sunt) Platonis, quos Sapiens
Pythagoras invenit.*

*Pythagoras sapiens eas invenit, Plato vero
manifeste docuit.*

Eu-

Euclides super his gloriam splendidam struxit.

Conferatur GREGORIUS *loc. cit.* Ad horum corporum evidentiorum intelligentiam præmittuntur quædam de lineis extrema ac media ratione factis, subsequuntur relationes Pentagonorum, Hexagonorum, Decagonorum, triangulorum regularium circulis inscriptorum: tandem Pyramidem, Octaëdrum, Hexaëdrum, Icosaëdrum, ac Dodecaëdrum construere assignet, horumque corporum latera proponit, eaque inter se componit.

Decimus Quartus, & decimus quintus libri, qui licet in nonnullis exemplaribus *Euclidis* nomine veniunt, HYPICLIS ALEXANDRINI esse videntur; simile tamen fere tractant argumentum. In *quarto decimo* enim comparantur Dodecaëdrum, & Icosaëdrum in eadem sphaera descripta. In *quinto decimo* quinque corpora indicata inscribuntur, ac eorum latera & anguli inveniuntur.

Decimus sextus, liber à CANDALLA adornatus, quique aliquando præcedentibus annectitur, varias solidorum regularium, sibi mutuo inscriptorum, & laterum eorundem comparationes explicat. Conferantur COMMANDINI in *Elementa Euclidis Prolegomena*, circa finem; & GEORGE MATHIAS BOSE in *Scediajmate literario de contentis Elementorum Euclidis*.

§. XVII. Hanc per Elementa distributam, materiam conveniente *Ordine* ac *Methodo* dispo-

XLVIII. BREVIS NARRATIO HISTORICA

disposuit *Euclides*; in quo indagando, eum, quo *Euclides* ipse usus est, cum primum, ad hanc doctrinam specularandam sese accingeret, puto distinguendum esse ab illo, quem jam in illis Elementis tenemus. Quando, enim mecum reputo *Euclidem* sibi Scopum & Finem constituisse, corporum mundanorum constitutionem speculationi suæ subjicere; inde haud obscure colligere mihi videor, primo intendisse eum, ac sibi ad contemplandum proposuisse *Elementum desimum tertium*; nempe quinque corpora regularia Platonica in eandem includere sphaeram, quæque eorum invicem sit proportio, demonstrare. Ad quod autem præstandum, necesse ei fuit extremas illas de corporibus regularibus propositiones in simpliciores, causas & principia earum propositionum continentes, semper resolvere; atque hac methodo pedetentim ad prima tandem devolvere principia. Cum vero Methodus Analytica est, quæ rem in sua principia sive Elementa, & conclusionem quamcunque in propositiones, quæ continent causas & principia conclusionis reducit; inde manifesto cuilibet apparere suspicor, *Euclidem* omnium primo *Methodo Analytica* processisse in suis Elementis adornandis. Nos autem qui iis utimur Elementis, quando eorum auxilio ducimur, ad Propositiones in iis propositas demonstrandas & intelligendas, à principiis ejus incipientes, & gradatim ad ultimas usque ascendentes; cumque sic ex principiis, ad id, quod ex iis fit, progredimur;

mur; *Methodum* sequimur *Syntheticam*. Quod vero ipsam spectat dispositionem eorum, quæ per hæc distribuit Elementa, sciendum omnino est; sanas omnes Scientias certa quædam & definita habere principia, ex quibus ea, quæ sequuntur demonstrant. Quare rite distinguendum est inter id, quod principiorum fungitur officio, & id, quod à principiis iis fluit; & quidem eo magis, quod principia Scientiarum debent esse per se clara, & evidentia magis quam quæ ex iis derivantur. Cum per sese sibi fidem faciunt, nulla principiorum reddenda est ratio. Quæ vero Principia consequuntur omnino rationibus confirmanda; quippe illa deinceps per principia prius intellecta cognoscimus. Hæc enim qui inter se confundit, & principia cum iis, quæ ab his fluunt, commiscet, is totam perturbat cognitionem; ea conjungens quæ nullo modo inter se conveniunt. Hac de re probe edoctus *Euclides* in suis Elementis componendis, seorsum & principia, & quæ ea sequuntur pertractavit; talia statuens principia, quæ ob evidentiam suam per sese fidem mereant, nulla eorum adhibita demonstratione. Eaque præmisit vel generalia ad omnia Elementa spectantia, vel singulis libris propria; quæ in fronte suorum librorum collocavit. E quibus præviis dein rationes petit eorum quæ principia consequuntur; cum Propositionum demonstrationes ex iis hauriens, probatam præcedentem, sequentis demonstrandæ principium statuit;

* * * *

tali-

talique ordine Elementarem suam disposuit Institutionem.

§. XVIII. Ipsa autem *principia* quod attinet, quæ *Euclides* posuit fundamenta, quibus Geometriæ Doctrinam superstrueret, in tria divisit genera; *Definitiones*, *Petitiones seu postulata*, & *Axiomata* seu *communes notiones*. In *Definitionibus* vocabula artis exponit, seu quem sensum fundet hoc vel illud vocabulum, in iis declarat; ac Geometrarum more vocis explicatione semel indicata, eadem semper significatione per totum Elementare corpus utitur: ne dein eorum ambiguitate aut obscuritate circumventi, in falsas incidamus conclusiones. Tales vocum Expositiones singulis Elementorum libris, ad ejus intelligentiam pernecessariarum, ac ad unumquemque librum proprie respicientium, præmisit. *Postulata*, quæ & alias *Petitiones* dicuntur, sunt, quibus aliquid admitti petimus, quod perfacile fieri potest: eaque sunt adeo clara & perspicua in his Elementis, ut nulla indigeant confirmatione, sed auditoris duntaxat assensum exposcunt; ne ulla sit in Demonstratione hæsitatio, aut difficultas. Tria suis in Elementis posuit *Postulata Euclides*, quibus id tantum intendisse videtur, ut ipsi concederetur usus *Regulæ & Circini*, ne dein de schemate eorum opere factò, quasi non sit Mathematicum, his moveretur. Inde factum est, quod nulla *operatio Mathematica* creditur, nisi quæ per hæc instrumenta, nullo alio adhibito adminicu-

niculo mechanico, instituatur; quæ vero figurarum delineatio aliis indiget instrumentis, *operatio Mechanica* dicitur. *Axiomata* vero quæ & *communes notiones* sæpe audiunt, sunt propositiones seu enunciationes potius per se manifestæ, cognituque perfaciles, quæ sine ulla demonstratione à quolibet concedi, & communi consensu assumi debent. Verum postulata inter & axiomata hoc intercedit discrimen, quale inter Problema & Theorema: ac sicuti in Problemate operatio fit, ita in Postulato; sicut in Theoremate aliquid contemplationi subjicitur, ita in axiome. Hæc bina ultima principiorum genera universaliter toti præmittit Elementorum Systhemati, non autem peculiariter cuilibet eorum libro; confer. *CLAVII Prolegomena in Euclidis Elementa.*

§. XIX. Hisce Principiis præmissis ad ipsam rem sese accingit, ac aliquid tum ad faciendum, tum ad contemplandum adducit; idque *Propositiones* vocat: quas in duas distinguit species, alteram *Problema*, *Theorema* alteram nominat. *Problema* apud Mathematicos est Propositio, qua aliquid facere & operari jubemur; vel ad similitudinem Problematis Dialectici, in qua utraque contradictionis pars vera aut falsa esse potest. Sic quæsitum illud apud Mathematicos, quo aliquid jubent construere, & *cujus* contrarium etiam effici potest, *Problema* appellatur. Vel secundum *Commandanos*, *Problema* illud est, in quo quippiam, cum

cum primum non sit, proponitur invenien-
 dum, ac construendum. Uti supra rectam
 lineam finitam Triangulum æquilaterum con-
 stituere, Problema est. In omni Problemate
 duo notanda veniunt; *Datum*, & *Quæsitum*:
 sic in assignato Problemate, datum est,
 recta linea finita; quæsitum, trianguli æ-
 quilateri super datam lineam constitutio.
 Problematum tres species Veteres ponunt
 Mathematici, *Planum*, *Solidum*, & *Lineare*.
Planum dicitur, quod per rectas lineas &
 circuli circumferentiam solvi potest. *Solidum*
 est, ad cujus resolutionem Sectiones Co-
 nicæ requiruntur. *Lineare* denique, quod
 præter jam dictas lineas alias etiam ad sui
 constructionem desiderat. Ex his vero tri-
 bus Problematum speciebus, prima tantum
 in Elementis Euclideis reperitur, omissis
 duabus reliquis. Problemata Euclidis dupli-
 cia sunt, vel *determinata* vel *indeterminata*.
Determinata sunt, propositiones quæ cum re-
 strictione fieri possunt, uti est 22. *Elementi*
 I. Ex tribus rectis lineis, quæ sunt tribus
 datis rectis lineis æquales, triangulum con-
 stituere; ubi additur hæc restrictio; oportet
 autem duas reliqua esse majores omni-
 fariam sumtas. *Indeterminata* sunt propositio-
 nes, quæ universaliter fieri possunt. *Theo-
 rema* est Propositio ad contemplandum pro-
 posita, quæ passionem aliquam, proprietate-
 temve unius, vel plurium simul quantita-
 tum edit; sicuti Propositio hæc, quod in
 omni Triangulo rectilineo tres anguli simul
 sumti sunt æquales duobus rectis, non jubet
 aut

aut docet triangulum vel aliquid construere; sed solummodo Trianguli cujuslibet constituti, passionem hanc contemplari proponit; quod anguli illi sint duabus rectis æquales: unde à contemplando talis Propositionio Theorema dicitur. Ideo Theorema, definiente *Commandino*, est in quo quippiam in constituta jam figura ita esse, vel non esse demonstratur. In Theoremate duo etiam notanda veniunt, *antecedens & consequens*; *Antecedens* dicitur id, quod conditiones proponit; & iis admittis, id, quod inde evenit, *Consequens* dicitur. Uti in 5. *prop. Elem.* I. Antecedens est, anguli ad basim triangulorum Isosceliorum constituti; Consequens, sunt inter se æquales. Hæc Theorematis bina membra sæpissime nomine *darorum & quaesitorum* occurrunt; quod prius dari seu concedi antecedens debeat, quam in sequentis veritatem inquiri possit. Inserunt aliquando Geometræ Theoremata vel Problemata minus principalia, ut alia brevius demonstrari possint, eaque *Lemmata* vocant; quæ dici possunt demonstrationes seu constructiones illius, quod ad demonstrationem, alicujus Theorematis vel Problematis principalis assumitur, ut demonstratio expeditior fiat ac brevior. Interdum subjungunt *Corollaria* vel *consectaria*, quæ sunt propositiones, immediate ex præcedenti demonstratione lucem accipientes, quæque peculiari demonstratione non egent. vid. CLAVIUS *Prolegomena in Euclidem*, & REYHERUS *in dissert. de Euclide. cap. 4.*

S. XX. Propofitis Quatorum proprietatibus, earum *Demonstrationes*, quibus certo constat, rem in Propositione indicatam principiis pofitis convenientem effe, subjungunt cum *Euclide* Mathematici. Verum ut *Demonstrationum* adornatio facilior evadat, quædam demonstrationi ipfi, ex quibus plurimum lucis sæpe foenerantur ea, quæ demonstrationi inferviunt, Geometræ præmittunt. Etenim in Theorematis, recitatis iis in propositione propofitis, enumeratisque datis ac quæfitis rerum indicatarum, priusquam propofita demonftranda fufcipiunt, *preparationem* quandam inftituunt, qua propofitionis propofitæ Schema illustratur. In Problematibus vero, iisdem, ac in Theorematis, prius recensitis, eorum *conftitutionem* efficiunt; ac, ut demonftratio legitime fieri poffit, quandoque etiam *preparationem* addunt. Quibus omnibus rite peractis, eorum, quæ proponuntur, ipfam demonftrationem incipiunt Geometræ. In Demonftrationibus fuis inftituendis duplici Methodo procedunt Geometræ, vel *directe* demonftrant ea, quorum in propofitionibus fit mentio, vel *indirecte*. *Directa Demonftratio* quæ & *Oftenfiva* appellatur, ea est, in qua aliquid probatur & fcientifice cognofcitur, à principiis, tanquam caufa ad effectum procedendo; eaque in fcholis vocatur *demonftratio à priori*, quia caufa effectu prior est. Ejusmodi probatio vera est, & proprie dicta demonftratio, quæ per fe directe

recte ad scientiam ducit. *Indirecta*, sive ad *incommodum*, vel *impossibile* ducens, est, quando contrarium propositionis demonstrandæ assumimus, idque cum ipsa propositione conjungimus; ut fiat syllogismus conclusionem inferens, quæ cum principio quodam pugnat, adeoque contrarium propositionis falsum esse evincit; eaque est à *posteriori*, quia effectum, id est Hypothesin adversarii primo loco ponit, eamque examinat. Hæc binæ demonstrationum species si juxta æquam lancem ponderentur, plus roboris directæ demonstrationi inesse quemlibet facile concedere suspicor, modo pensitet ex principiis evidentibus apta idearum connectione, ostensivam petitam esse probationem. Verum ubique talis demonstratio ostensiva haberi nequit, in quo casu ad incommodum ducentibus argumentis utendum est; ubi vero directæ institui possunt Demonstrationes, illæ multum præferendæ sunt; ac indirectis abstinendum est. Ambo hæc Demonstrationum Genera suis in Elementis adhibuit *Euclides*; cum hoc tamen discrimine quod longe pluribus usus fuerit ostensivis; ubi autem commode directas habere non potuit apodeixes, indirectas seu ad absurdum ducentes dedit demonstrationes. Quod nullo modo *Euclidi* vitio vertendum est, cum eo loco tantum ad impossibile ducentes inseruerit; ubi commode directam demonstrationem tradere non potuit; videatur

REYHERUS in *dissert. de Euclid. cap. 4.*

§. XXI. *Laudatur* valde à Viris Doctis ordo, ac veritatum, ad Geometriæ intelligentiam inde hauriendam, *selectus*, quem in Propositionibus suis disponendis tenuit *Euclides*. Etenim PROCLUS in *commentario suo in Euclidem lib. 2. cap. 5.* ordinem ac delectum eorum, quæ Euclides per Elementa distribuit Theorematum atque problematum, extollit, cum illum quempiam admirari debere ait; *non enim* (addit) *ea assumpsit omnia, quæ poterat dicere, sed ea duntaxat, quæ Elementari tradere potuit ordine: adhuc autem omnis Generis syllogismorum modos, alios quidem à causis fidem suscipientes, alios vero à certis notis profectos, omnes autem invincibiles, & certos ad scientiamque accommodatos, adduxit.* Quod si COMMANDINUM in *proleg. in Euclidis Elem.* audiamus: Nonne, dicit insignis ille Mathematicus, *quilibet summopere admiretur Euclidem propter ordinem in hac Elementari institutione; cum admirabili omnium dispositione, antecedentium & consequentium ordine, ac coherencia, ut nihil prorsus addi, aut detrahi posse videatur, ea inter se vinculo indissolubili connexit.* Pariter celebris ille Astronomus TYCHO in *Oratione de disciplinis Mathematicis*, de Euclidis Elementis differens, *Dispositionem Elementorum Euclidis debita sua laude describit; Euclides enim, ait, Elementa continuo ordine, & magna solertia ita tradidit, ut à quovis mediocri ingenii acumine prædito non difficulter percipi possent.* Quibus addi merentur quæ BLANCANUS

in sphaera mundi & quidem in apparatu ad Mathematicas scientias pag. m. 207. scribit. Inter Mathematica monumenta primam est Euclidis opus Elementorum, non tantum antiquitate & dignitate, verum etiam Doctrina arsne: est enim totius Matheseos basis & fundamentum. Laudabilis porro iste est ordo à doctrinae compendio, quod neque propositionum multitudine luxuriat, neque earum paucitate sui studiosis obscuritatem creat. Cum ex iis Elementis Geometricam scientiam liquido nobis comparare possumus: qua de re GREGORIUS loc. citato Quærit; Nullane igitur est Methodus compendiosior ad Geometriam addiscendam, quam hacce per Euclidis Elementa quam adeo reformidant plerique? Huic certe quaestioni respondeat ipse Euclides. Ille à Ptolemao Aegypti Rege interrogatus, an via esset aliqua ad Geometriam, magis compendiaria sua σοιχειωσει, respondisse fertur autore PROCLO in lib. 2. Μη ειναι βασιλικην ἀτραπὸν ἐπὶ γεωμετρίας. Verum quantumvis elegans & præclarus iste est ordo, attamen taxatur à nonnullis; scribit enim de eo CLAUDIUS VERDER. in Auctorum Censione; Euclidem esse indigestum & incompositum, cum enim ab universalioribus processus fieri debebat, ne vitiosa sit repetitio, pessime à Geometria auspicatus est initium; quam post Arithmeticam tractare oportuit. Eandem de Euclidis Elementis fovet sententiam famosus Euclidis oppugnator PETRUS RAMUS, in Schola sua Mathematica, & cum RAMO, LAZARUS SCHONERUS, qui Euclidis ordinem & selectum valde carpunt, sed

LVIII BRÉVIS NARRATIO HISTORICA

monente VOSSIO de *Scientiis Mathematicis* cap. 16. §. 24. *Hi modum non tenere in Euclide culpando.* His vero reponimus quæ GREGORIUS in *Prefat. sua Euclidi præmissa* hac de re scribit; *Hanc esse optimam vera Methodi Legem existimavit vir accuratissimus, ut nihil sumatur pro vero nisi demonstratum; nihil demonstretur nisi ex antecedentibus. Quo fit (inquit SAVILIUS) ut ordo, quem isti Methodista requirunt ab Euclide, quo nunquam vidit hic sol μεθοδικωτερον, servari non potuerit, nisi si quis est adeo ineptus, ut nesciat cuius imaginaria venustatis rationem habendam putet, neglecta sanitate. Quisvis eorum, qui Geometriæ Elementa alia Methodo tradenda suscepit, inter Euclideanum opus alteriusque cuiusvis præter proprium iudex constituitur; illico patebit discrimen.*

§. XXII. Verum quantumvis apta veritatum dispositione illa cohærent Elementa, quæ vulgo *Euclidis* nomine veniunt; dubitant nonnulli an quidem ea Euclidi sit ad scribenda Gloria, cum illa Elementa, quæ hodie in omnium versantur manibus, *Euclidem* Autorem habere negant. Sed ea à THEONE ALEXANDRINO, qui Senioris THEODOSII temporibus floruit, profecta esse affirmant. Saltem PETRUS RAMUS in diversam à longe plurimis Viris Doctis hac in parte abit sententiam; Propositiones in Elementis Euclideanis occurrentes, non *Euclidi* sed *Theoni* adscribens; quasi nullæ forent partes *Euclidis* in iis Elementis, quæ tamen vulgo *Euclidi* tribuuntur. Verum hæc
Rami

Romæ opinio Veterum Mathematicorum Testimonio repugnat; cum omnis Antiquitas eas *Euclidis*, & non cujusdam *Theonis Alexandrini*, esse propositiones agnovit. Quæ de re HENRICUS SAVILIUS in prælectionibus in *Euclidem* Scribit, quod eadem hæc quæ nunc habemus, eodem ordine, iisdem verbis, agnoscent sub *Euclidis* nomine *Proclus* & *Boëtius* *Theone* posteriores, & *Anterior Theone Alexander Aphrodisens*, & omnis antiquitas. Quare nullum superesse dubium potest, quin *Euclides* Propositionum quæ in *Elementis* obviæ sunt, Autor sit habendus, licet *Proclus* nullum referat *Euclidis* inventum; uti RAMUS scribit.

§. XXIII. Alii vero, qui parum liberaliores sunt, Propositiones ab *Euclide* factas compositasque esse asserunt, sed Demonstrationes *Euclidi* abjudicant; hac forsân de causâ in errorem abducti, quod in nonnullis codicibus græcis, soli traduntur propositionum tituli cum figuris, sine ulla demonstratione, referente DECHALES de *Progressu Matheseos*. pag. 9. col. 1. His respondet HENRICUS SAVILIUS, dicens; homines stulti & perridiculi; quasi ullus unquam artifex suas eas voluerit conclusiones, nullis adjectis probationibus. Hoc neque Philosophorum quisquam, nec Medicorum, ne dum Mathematicorum, fecit unquam. Quanto minus de Mathematicorum Principe id suspicandum. Immo testis est JOANNES DE BUTEON in suis annotationibus in *Euclidem*, quod apud antiquos nun-

LX BREVIS NARRATIO HISTORICA

nunquam sine demonstratione Theoremata proferebantur ; ut quæ nullam, si nudæ fuerint, habeant utilitatem ac dignitatem. vid. COMMANDINUS *in proleg.* conferatur GREGORIUS *in præfat.* & VÖSSIUS *de Scientiis Mathematicis. cap. 15. §. 9.* Cum his etiam se conjungit PETRUS RAMUS, qui non contentus Propositiones omnes *Euclidis* subtrahere, & *Theoni* vindicare, verum etiam Eum Demonstrationibus omnibus defraudare, easque in *Theonem* conferre omni studio nititur. Ita ut secundum RAMUM, *Euclides* in Elementis nihil præstiterit, sed omnia *Theon.* Quam suam sententiã, variis rationibus probabilem reddere studuit, in suo *Matheseos proœmio.* Et quidem primo, quod *Proclus* commemorat, Demonstrationes ab *Euclide* esse inventas, verum non refert inter *Euclidis* laudes ullam propositionem vel demonstrationem ab *Euclide* esse inventam. Secundo, THEON ipse suas editiones in Elementa nominatim laudavit, in primo commentario. in *Ptolemæi magnam constructionem*, quo sibi vindicare videtur *Theon* ipsa Elementa. Tertio, quia *Euclidis* demonstrationes, quæ in *Procli* commentariis leguntur minime cum iis conveniant, quas in Elementis habemus. Quarto, quia *Euclidis* Elementorum codicibus quibusdam, hæc adduntur verba in inscriptionibus, ex τῶν Θεωνος συνοουσιων, id est ex *Theonis colloquiis sive congressibus* ; sicuti codex græcus *Euclidis Elementorum*, qui prodiit *Basilæa apud Joan. Hervagium Anno. M. D. XXXIII.* inscribitur *Ευκλειδῆ Στοιχειων βιβλ. ιε. εκ των Θεωνος*

Θεωρος συνουσιον. Quæ sane verba multis occasionem de Euclideis demonstrationibus disputandi dedere; multisque ansam præbuere credendi, Demonstrationes Propositionibus *Euclidis* annexas ad *Theonem* pertinere. Licet vero *Proclus* non disertis verbis exprefert, quasnam *Euclides* invenerit Propositiones, & Demonstrationes, tamen manifeste fatis mentem suam declarat, multum invenisse *Euclidem*, quando de eo scribit, quod multa ab *Eudoxo* collecta in ordinem redegerit, ac à *Theateto* inchoata perfecit, quæ mollius ab aliis demonstrata erant, ad firmissimas & certissimas apodeixes revocaverit. Quæ omnia profecto sine multarum propositionum & demonstrationum inventis præstari nequeunt. Secundam quod attinet rationem; verum est *Theonem* in *Commentario in Almagestum*, provocare ad Elementa à se edita; quod vero *sectores*, inquit, in circulis aequalibus sint proportionales angulis ad centrum constitutis, ostensum est à nobis in editione *Elementorum*, *endoxi*, ad finem sexti libri. Ex quibus verbis, & novam *Elementorum* editionem adornasse *Theonem* constat, & nonnulla ab ipso adjecta; non autem quod ille autor fuerit, demonstrationum omnium in *Elementis* obviarum. vid. GREGORIUS in *Prefat. Euclidis Element. præmissa*. Tertiam perpendentes rationem, discrimen demonstrationum indicantem, non tanti ponderis ea esse videtur, ut propter eam *Euclidem* ex *Elementis* exterminaremus. Etenim idem discrimen in aliis *Euclidis* scriptis reperitur, de quibus
 non

LXII BREVIS NARRATIO HISTORICA

non controversitur, an sint Euclidis, cum omnium consensu communi Euclidis scripta esse judicantur. Sic Data *Euclidis* non eodem prorsus habentur modo, quo apud PAPPUM in *septimo Mathematicarum collectionum libro*. Nec Optica, Catoptrica, quæ Romæ in Vaticana Bibliotheca servantur, teste COMMANDINO in *proleg. in Euclid.* Quid itaque foret causæ, cur Elementorum Demonstrationes Euclidi abjudicaremus, cum cætera Scripta eodem discrimine laborantia, ei adjudicaremus? Sane si dicendum, quod res est; est nodum in scirpo querere. Nec majoris momenti est quarta denique & ultima ratio, cum hæc verba *α τῶν Θεωρημάτων* in multis codicibus græcis non existant; immo Autor est SAVILIUS quod hujus tituli in neutro codicum MSS. ullum reperit vestigium. Quare quæ *Joannes Boreon* de his verbis observat, veritati maxime consentanea esse videntur; cum verosimile esse putat verba illa *α τῶν Θεωρημάτων* ita intelligenda esse, ut dicamus, *Theoremata* conscripsisse quidem commentarios in Elementa, sed illos temporum calamitate periisse; quemadmodum quæ in Eundem *Pappus Alexandrinus* scripserat, conservato tamen titulo, qui postea *Euclidi* ipsi negligenter adjectus est. confer. COMMANDINUS in *Proleg. in Elem. Euclid.*

§. XXIV. Denique multi alii, & Propositiones, & Demonstrationes Elementorum, pro ut nunc ab omnibus teruntur, *Euclidi* attribuant,

buunt, quæque aut vera est, aut saltem veritati proxima sententia. Graves enim & ponderosæ sunt rationes, quæ pro hac sententia pugnant. Etenim PAPPUS ALEXANDRINUS, qui fere eodem ac *Theon Alexandrinus* tempore floruit, nobis autor est in *septimo libro Collect. Mathem. pag. m. 240. Euclidem* Elementa tradidisse. Ipse porro PAPPUS sæpe comparat demonstrationem ab *Euclide* traditam, cum aliorum demonstrationibus: quod sane fieri non potuisset, nisi *Euclides* & propositiones & Demonstrationes scriptis reliquisset. Accedunt, quæ PROCLUS, qui longe post *Theonem Alexandrinum* vixit, in *comm. in Euclid.* de Demonstrationibus Euclideis scripsit; cum enim in commentariis in propositionem decimam retulisset *Apolloniæ Pergæ* demonstrationem, hæc subjungit verba, *longe melior est σοφιστηρικὴ, (ita enim Euclidem appellat) Demonstratio, & simplicior, magisque ex principiis.* Ex quibus verbis manifesto colligimus, *Euclidis* Elementa post obitum *Theonis Alexandrini* scriptis divulgata fuisse. Porro DECHALES in *Tract. de progressu Mathes. pag. 12.* expressis verbis scribit, quod *Proclus* & *Boëtius*, *Theone* posteriores nonnullas Demonstrationes referunt, prout in ipso *Euclide* jacent; ac VOSSIUS de *Scientiis Mathematicis, cap. xv. §. 9.* cum retulisset, quosdam censere *Theonem* & conclusionum, & demonstrationum Autorem esse, hæc addit verba: *Qua sententia eo refellitur, quod Proclus, & Boëtius; immo & Alexander A-*
phro

LXIV BREVIS NARRATIO HISTORICA

phrodiseus, qui *Theone* antiquior fuit; multa *Euclidi* tributa iisdem verbis, atque eodem ordine, sub *Euclidis* nomine citent. Ulterius SAVILIUS, uti narrat GREGORIUS in *præfat.* nobis testis est, quod eadem quæ nunc habemus Elementa, sub *Euclidis* nomine, eodem ordine iisdem verbis ab universa Antiquitate, non solum *Theone* posterioribus, verum etiam anterioribus, fuere agnita. Sic enim *Alexander Aphrodiseus* qui circa initium Tertii seculi claruit, eadem quæ nunc habemus Elementa Euclidea, iisdem verbis *Euclidi* tribuit: uti & *Proclus* & *Boëtius* aliique qui post *Theonem* inclaruere. Quapropter veritati magis convenire videtur ea sententia, quæ statuit, quod Elementa *Euclidis* quæ possidemus, ac quæ hodie in manibus versantur, ab *Euclide* sunt adornata, quam ea, quæ à *Theone Alexandrino* ea petenda esse censet.

§. XXV. Sed cum vulgaris sit opinio, quæ etiam multos, in viris eruditis, nacta est Patronos; non uti *Ramus* inepte censuit; *Euclidem* nec Propositiones nec Demonstrationes scriptas tradidisse: verum *Euclidem* suorum Elementorum tam conclusiones, quam validissimas apodeixes scripto reliquisse; inque *Euclidem*, *Theonem Alexandrinum* commentaria sive demonstrationes scripsisse; quæstio est, quid *Theon* in suis commentariis, quæ vulgo ipsius nomine circumferuntur præstiterit, ac quænam ejus sint partes istis in Elementis? At vero difficilis determinatu

natu illa est, quænam sunt in his Elementis Theonis partes; cum tot diversæ, hæc super re, Virorum Eruditorum sunt sententiæ. Si DECHALES audiamus in *Tract. de Progressu Mathes. pag. 12.* ille multum tribuit Theoni, cum inquit, *liber Elementorum Euclidis multum debet Theoni, à quo est in ordinem digestus, & etiam auctus.* Quocum fere consentit incertus quidam Scholiastes, qui uti narrat HENRICUS SAVILIUS in uno codice MSS. ad oram marginis, ad decimum tertium librum, scripsit; collectionem Elementorum *Euclidis*, ordinationem & dispositionem *Theonis* esse. vid. GREGORIUS in *in Præfat. citata* Cui etiam sententiæ suam adjicere calculum videtur VOSSIUS de *Scientiis Mathem. pag. 59.* ita scribens; *vera autem de hoc opinio est, quod Theon novam Euclidis editionem adornavit; in qua Euclidea & melius digesserit, & aliquot locis auxerit.* Neque etiam ab eadem abludere videtur COM-MANDINUS in *Proleg. in Euclid. Elem.* cum ait, *Nos autem medium secuti, credimus libros de Elementis suis ornatos, Demonstrationibus ab Euclide nobis fuisse relictos.* Ac postquam id paucis probasset, hæc adjungit verba; *Ut autem hoc vere asserimus, ita illud merito concedemus, Theonem excellentis ingenii virum, Euclidis Demonstrationes fufus, planiusque explicatas, in lucem protulisse.* Tandem inferius paululum hæc subsequuntur verba, *Sunt igitur illa quidem Demonstrationes Euclidis, sed eo modo conscripta, quo olim Theon Euclidem secutus suis discipulis explicavit.* Sed isti opinioni,

* * * * *

ni,

ni, qua asseritur *Theonem* Elementa Euclidea adornasse & disposuisse, immo fusius explicasse, videtur obstare *Procli* & Antiquorum omnium autoritas. Quia iisdem verbis, ac eodem ordine, pro ut in *Euclide* exstant, tam qui ante *Theonem*, quam qui post eundem claruere, Euclidea citant. Obstat etiam mirabilis & concinna propositionum series, ex quibus unam loco si eximas, tota corruat compages, & structura necesse est. Potior videtur sententia, quod Elementa græca Euclidea, quæ vulgo commentaria *Theonis* nuncupantur, quæque nunc ab omnibus teruntur, nihil aliud sint, quam nova Editio *Euclidis*, à *Theone* adornata, nonnullis in locis ab ipso aucta. Nam *THEON* in *commentariis in Almagestum*, de Editione quadam à se edita loquitur; ubi simul mentionem injicit demonstrationis, de sectoribus in circulis æqualibus, quod sint proportionales angulis ad centrum constitutis, à se factæ. Quæ etiam in omnibus Græcis Exemplaribus annectitur ultimæ propositioni libri sexti. Idem iudicium ferendum putat de multis in libro decimo lemmatis *Savilius*, & fortasse propositionibus nonnullis. vid. *GREGORIUS* in *prefat.* Forte inquit hic insignis Geometra, & Definitiones quædam & Axiomata, libro Primo præposita, *Theonem*, vel alium præter *Euclidem* agnoscunt autorem, ex. gr. Axioma XI. Nam licet *Euclides* hoc pronunciatum adhibeat, in *Demonstratione* prop. 29. Elem. I. illud tamen pro Axiomate non habuit, sed pro conversa prop. 17. utpote qua ex illa manifeste consequatur.

sur. Fortasse & altera Demonstrationes, quæ passim occurrunt, sunt etiam Theonis: &c. Ex quibus omnibus concludit Savilius, Theonis fuisse partes, in Euclide paucis quidem in locis interpolando, explicando, augendo; ultra hoc nullas.

§. XXVI. Hæc vero Euclidis Elementa à multis retro seculis magni semper æstimata fuere, cum propter claritatem probationum, quæ in iis valde elucet, tum propter demonstrationum robur per tota Elementa dispersum; quibus accedit quod sit absolutum Elementorum opus. Etenim de iis testatur GREGORIUS *in præfat. sæpe citata; corpus illud Elementorum ea claritate, & evidentia; eo judicio, ac firmitudine; esse compactum; ut singula in iis propositiones jam à bis-mille annis, ab omnibus habeantur pro evidentibus, & pro talibus passim ab omnibus citentur.* Quam Probationum evidentiam nonnulli suspicantes, firmissimis demonstrationibus, quæ auctore *Procto*, nec coargui nec convinci possunt, omnia istis in Elementis occurrentia, munita esse, apud animum pensitantes Veteres quidam; ansam inde affirmandi, *Euclidem errare non posse*, nacti sunt. Quæ licet de mortali nimis superbe dicta, aliquantum conniveri possunt, si de Mathematicis *Euclidis* demonstrationibus tantum intelligantur. Præclarum est enim Testimonium PETERI RAMI, cæteroquin severi *Euclidis* castigatoris, de Euclideis Probationibus: dicens, *nullus paradoxismus, nulla ψευδογῶσι*

LXVIII BREVIS NARRATIO HISTORICA

in totis *Elementis*, nobis quanquam severe inquirantibus, animadverti potuit: quam laudem esse singularem profiteor; quamquam nulli adhuc, neque Grammatico, neque Rhetori, neque Logico concedere potui, ut in *Grammatica*, *Rhetorica*, *Logica* nihil falsi docuisset. Hæc itidem Demonstrationum, invicta firmitas, & conclusionum absoluta perfectio, forte etiam in causa fuit; cur nonnulli in *Euclidis* vocabulo *Mysterium* quasi aliquod latitare opinati sunt; cum vocabuli *Euclidis* Etymon ex græca lingua derivandum censent; putantes illud ex Græco εὖ, quod *bene* denotat, & κλειω *claudio*, esse compositum; idemque denotaret *Euclidis* vocabulum, quasi quis diceret *bene claudens*, seu *bene concludens*. Licet vero *Euclidis* Demonstrationes firmissimas esse agnoscamus; non tamen existimarem eam ob rationem Antiquitatem eum nomine eo insignivisse, cum multi ante & post eum extiterint *Euclides*, in quas illa Etymologica derivatio non quadrat. Est sane eligans Elogium, quod de his *Elementis* verba faciens, recitat CARDANUS *de mira subtilitate lib. 13.* dum scribit, *Quorum inconcussa dogmatum firmitas, perfectioque absoluta adeo, ut nullum opus jure huic aliud comparare audeas. Quibus fit ut adeo veritatis lux in eo refulgeat, ut soli hi in arduis questionibus videantur posse à vero falsum discernere, qui Euclidem habent familiarem.* Audiri etiam meretur CLAVIUS, in *prolegomenis*, asserens; *Euclidis Elementa semper magni aestimata, neque ullus ante eum per eis existit, licet non pauci ante Eum Elementa*
con-

conscriptere teste Proclo. Quin & teste VERULAMIO de *Augmento scientiarum lib. 3.* Euclidis absolutum adeo est opus Elementorum, ut Euclideanis laboribus in Geometricis nihil additum sit à sequentibus, quod intervallo tot seculorum dignum sit. Quare RAMUS in libro tertio *Schola Mathematica* notat. Duo fere millia Annorum existimatur toto terrarum orbe ab omni reprehensione liber & sacro sanctus fuisse Euclides, & si quid post homines natos solida scientia comprehensum & animadversum est, id Euclidi acceptum refertur. Ut autem aliorum de Euclidis Elementis Testimonia silentio præteream, unicum adhuc adducere haud incongruum esse opinor; illudque sumam à GREGORIO ABULPHARAO, quod in *Historia compend. Dynastarum.* super Elementis Euclidis dicit. Sic enim ibidem loquitur Scriptor ille Arabs; Quod Euclidis liber qui vocatur στοιχεια celebris admodum est, & utilis; ac quod non est Græcis hoc in genere liber alius generalis, neque secutus est eum aliquis, qui non vestigia ejus sectatus est; idemque quod ille dixerit; nec inter homines, qui præstantiam ipsius confessus sit, vel multiplicis ejus Doctrina testimonium perhibuerit.

§. XXVII. Opus hocce Euclideanum sua inscriptione etiam videtur ornatum fuisse: ex *Commentaridini* mente Proclus in fronte ejus Legisse censetur, ευκλειδου στοιχειωσις; seu Euclidis Elementariorum institutio. VOSSIUS vero de *Scientiis Mathematicis cap. 15. §. 2.* inscriptum illum librum fuisse putat, στοιχειων βιβλια, Elementorum

LXX BREVIS NARRATIO HISTORICA

torum libros, vel *σοιχισμῶν*, *Elementorum Doctrinam*; omisso Geometriæ vocabulo, cum tamen Geometrica significare vellet *σοιχισμῶν*. Alii vero codices inscribuntur. *Ευκλείδης σοιχισμῶν βιβλ. ιε*, *ἐκ τῶν Θεωνοῦ συνουσιῶν*. Quæ tamen verba ex *Theonis Colloquiis*, deinde sunt adjecta, non à *Theone* ipso uti existimat **COMMANDINUS** in *præfat.* sæpe citata, verum à quodam *Theonis familiari*, *Viro plane erudito*, qui nobis *Euclidem*, eo quo nunc habetur modo legendum concessit. Neque etiam hæc verba in *Vetustissimis* reperiuntur *Manuscriptis*; uti ante ex **SAVILIO** notavimus. Mirabuntur forsân multi *Euclidis* *Inscriptionem* *Legentes*, Eum tantum opus suum appellasse *σοιχισμῶν*, *Elementa*: non vero Geometriæ *Elementa*, quemadmodum hoc *Elementare corpus* postea à *Latinis* ita est inscriptum; cum illud vocabulum de multis dici possit, uti de *litterarum principiis*, de *rebus naturalibus*, ac de multis aliis. Quare primo inspicientem, ac *σοιχισμῶν* in titulo legentem, penitus dubium relinqueret, de quam materia istis in *Elementis* tractetur. Verum non absque ratione, *Euclides* tantum *σοιχισμῶν* librum suum inscripsisse censendus est, omisso Geometriæ vocabulo. Nam præterquam quod ex primis verbis hujus operis, in quibus à puncto initium facit; quam de re isto in libro tractetur, cuilibet legenti statim innotescit; eo præterea tempore, quo *Euclides* hæc conscripsit, Geometriæ studium, erat maxime *Elementale & fundamentale*; cum fere *juventus omnis Græca* pri-

primos suos conatus in Geometriæ studio exercendo instituerit ; ac una cum primis cognitionis principiis hanc Doctrinam conjunxerit ; nemini Elementa Legenti incognitum esse potuit ; cum frequens & percipiente tunc temporis erat Geometriæ exercitium ; quoniam de subjecto in suis Elementis ageret *Euclides* ; ac quodnam Thema in iis proponeret. Si non aliæ accesserint rationes , quæ *Euclidem* Virum acutissimi ingenii permoverint , suum opus tantum Elementum nuncupare. Si ante dicta pensitemus ; hæc *σοφιστικὰ* sunt multorum de re Geometrica optime meritorum Scriptorum principia & fundamenta. Ea sunt fontes & scaturigines ex quibus tot effluxere Geometriæ rivuli. Ea sunt fundamenta firma , quibus tot Geometriæ Veteres suum Mathematicum ædificium superstruxere ; ac adhuc hodie Recentiores super iis condunt. Ea sunt tot Elementa quotquot præclara habemus opera Geometrica. Forte etiam in genere dixit suum opus *σοφιστικὰ* ; non ad Geometriam tantum , sed ad alias quascunque intellectum perficientes & ornantes Scientias sese extendentia. Forte plura sub isto Elementorum vocabulo intellexit. *Commandinus* vero per excellentiam quandam hanc inscriptionem de Geometria intelligendam esse putat : idemque esset ac Oratorem dicentes *Demosthenem* ; Poëtam *Homerum* vel *Virgilium* intelligimus ; sic etiam Elementa dicentes , Geometrica intelligenda esse , existimat.

§. XXVIII. Sunt interim quidam ; qui Geometriæ nomen Euclideis Elementis concedere nimis religiosi sunt , existimantes Geometriæ scientiam esse universaliorem quam his docetur Elementis ; ac propterea hæc Elementa dici Geometriæ Elementa , potius servandum esse vocabulum Elementum , quam ea Geometriæ Elementa inscribere. Alii vero putant , jure optimo hæc Elementa , Geometriæ Elementa appellari. Cum Elementa *Proclo* autore dicuntur ea , quorum contemplatio ad aliorum pertinet scientiam , & ex quibus apparet solutio eorum , quæ in ipsis dubitare contingit : vel uti ait *Menechmus* : Elementum dicitur , in quod cum sit magis simplex compositum resolvitur ; conferantur **COMMANDINI** *Prolegomena*. Jam vero hæc nostra Euclidealia sunt Geometriæ Elementa , in eorum enim contemplatione solutionem acquirimus illorum , quæ in aliis dubitare contingit ; ex iis namque profluxit , quodcunque excellens Geometriæ inventum , quod Autoris famam quam maxime longam effecit , iisque tanquam certis innititur principiis. Ex iis hauritur , & intelligitur , quidquid ad solidam Geometriæ noticiam requiritur : sine horum scientia , frustra tentant Mathematicorum tam Veterum quam Recentiorum stupenda aggredi opera ; quæ ex his Elementis lucem foenerantur. Utuntur itidem Matheseos Scriptores Veteres in suis Demonstrationibus his *Euclideis* Elementis tanquam

quam principiis, ita ut eorum de rebus Geometricis Theoremata & Problemata in hæc nostra resolvantur Elementa; ac ex his reliquæ Matheseos partes fluant. Videantur CLAVII *Prolegomena*. Verum quidem est, *Euclidem* suo in opere Geometrico non disertis verbis pertractasse omnia ad rem Geometricam pertinentia, sed uti ait CLAVIUS *loc. cit.* quæ visa sunt necessaria, atque utilia ad communem utilitatem; vel uti loqui amat COMMANDINUS, quæ Elementali tradere potuit ordine. Id autem non tollit, quo minus tamen hæc Elementa, Geometriæ nomen gerant; cum quidquid in Geometria docetur, ex his facile derivari possit Elementis. Nullum enim hucusque est in Geometria inventum; quin natales suos Euclideis debet Elementis, in iis sua habet principia & fundamenta, sine quibus nec intelligi nec demonstrari possunt.

§. XXIX. Ejusmodi Elementorum *Euclidis* conspectus, protinus nobis necessitatem quandam, ad ea Elementa cognoscenda, insinuat. Si enim perpendamus Elementa hæc ad universam Geometriam esse necessaria; quis iis, qui Geometrica imbui scientia studet, carere possit? Si teste COMMANDINO principalissima, simplicissimaque, ac primis principiis maxime affinia Theoremata Geometriæ iis in Elementis contineantur: Quis cognitionis Geometricæ avidus, non omnium primo hæc Elementa consulere teneatur? Eâ antè omnia eum tractare oportet,

portet, qui in Geometricis Scientiis se erudiri velit; in iis se exercere, is debet, qui altiora cupit; ac Veterum & recentiorum Mathematicorum scripta intelligere percipit. Vel uti ait CLAVIUS in *proleg. citatis*, *fecit is qui legere vult, Elementa literarum discit prius, & illis assidue repetitis utitur in vocabulis omnibus exprimendis: sic qui alias disciplinas Mathematicas sibi reddere desiderat familiares, Elementa hæc Geometrica plene ac perfecte prius calleat necesse est.* Frustra enim tentant Mathematicorum opera aggredi, qui hisce principiis non satis sunt muniti. Scriptores enim illi *Euclidis* demonstrationibus, tanquam fundamentis utuntur; ac testatur CLAVIUS sibi longa diuturna que *Experientia* compertum esse, *eam esse necessitatem Elementorum Euclidis, ut frustra quisquam se speret sine illorum presidio, Aristarchi, Archimedis, Apollonii, Theodosii, Autolyçi, Menelai, Ptolemæi, Pappi, Sereni, Aliorum Celebrium Mathematicorum Demonstrationes intelligere vid.* COMMANDINUS in *Prolegom.* Immo cum hæc *Elementa Universæ Geometriæ* tradunt principia, sine quibus nec sciri nec percipi rite possunt abstrusiora istius scientiæ Theoremata ac Problemata; quis non mecum fateri tenetur *Elementa hæc Geometriæ studiosis scitu perquam necessaria esse?*

· S. XXX. Quanti olim necessitatis & utilitatis *Euclidis* *Elementa*, ut rite studiose juventus iis imbueretur, habita sunt, satis declarant *Professiones Euclidæ*, quæ antea
in

in Academiis & Gymnasiis fuere. Etenim creati fuere Professores; quibus Euclidean exponere Elementa, demandatum erat. Sic enim refert DECHALES in *tract. de Progres. Mathes.* cap. 2. pag. 14. quod Joannes Scheubelius in Academia Tubingensi Euclidis Professor fuerit ordinarius; ac testatur CONRADUS DASYPODIUS in *prefat. in lib. 1. Euclidis*; primum illum librum in omnibus fere Gymnasiis prælectum fuisse; inque Schola Argentinenſi, iis, qui sunt in prima curia propositum. Porro etiam notat SAMUEL REYHERUS in *dissert. de Euclide*, cap. 2. Lipsiæ olim moris fuisse, ut summos in Philosophica facultate honores ambientes, speciminis Mathematici loco *propositionem* 47. *Elem.* 1. demonstrarent, & propterea hanc propositionem dictam magistralem fuisse, illosque qui rite dictum Theorema demonstrare potuerunt, Magisterii titulo dignos fuisse habitos. Ac ni fallor in Academiis Patriæ nostræ, si non in omnibus, saltem in quam plurimis, constitutum est, ut, qui ad lauream Doctoralem Philosophiæ adspirant, Propositionem unam, vel duas, ex Elementis Euclidis, quibus suorum in Mathesi profectuum specimina dant, deſumtas demonstrarent.

§. XXXI. Maximis laudibus *Euclidis* in Geometria peritiam ornant tam Antiqui quam Neoterici Matheseos Scriptores. Ne autem omnia commemorem, pauca quædam hic tantum adducam; & quidem è Veteribus
PAPPI

LXXVI BREVIS NARRATIO HISTORICA

PAPPI ALEXANDRINI testimonium , tanquam sufficiens , referam. Scribit enim clarus hic Geometra in *lib. 7. Collectionum Mathem.* Quod Euclides operam dans discipulis Alexandria , longo tempore adeo excellentem in Mathematicis habitum sit affectus , ut nunquam fuerit decipus. Ex Recentioribus CLAVIUS in *Proleg. in Euclid.* audiendus est ; qui inquit , noster Geometra acutissimus , cum in *Doctrina Academicorum* , esset summa cum laude versatus , animum totum ad Mathematicas disciplinas transtulit , in quibus ita excelluit , ut concordiam omnium iudicio principem inter Mathematicos sibi locum jure optimo vindicavit. Vocatur idcirco à SAVILIO insignis Geometra , ac à DECHALES summus Geometra. COMMANDINUS vero in *Euclidem* , in *proleg.* dicit , quod *Mathesin* ita praclaro animi impetu est aggressus , ut progressus admirabiles , ac sempiterna aevi memoria dignissimos in ea fecerit ; constantique omnium Doctorum testimonio Geometrarum princeps habitus sit ; immo majorem semper consecutus est laudem , quam omnes illi qui ante eum vixerent.

§. XXXII. Quanti etiam semper , per totum terrarum orbem , aestimata fuere , & hodie ubique aestimentur *Euclidis nostri Elementa* ; quæ super Geometrica Doctrina conscripsit ; abunde testantur , tum *Commentaria* à multis Viris eruditis in *Elementa Euclidem* adornata ; tum *Editiones* illæ multiplices , quibus innumeris in locis eadem lucem adspexere. Ea vero quæ colligere potui , hic com-

commemorare non inutile fore duxi. Ad id autem efficiendum imprimis usus fui laboribus FABRICII *in Biblioth. Græc. lib. III. cap. XIV.* & M. GEORGII MATHIÆ BOSE *in Schediasmate literario, de variis Elementorum Euclidis Editionibus*, in quo partim de se, partim è WOLFIO recenset Editiones à FABRICIO omiffas. In hoc catalogo & Commentariorum, & Editionum adornando, hunc tenui ordinem, ut pro annorum numero, quo prodire, se mutuo sequantur.

Inter omnes, qui Euclidis Elementa commentariis suis illustrare conati fuere, Antiquissimus esse videtur THEON ALEXANDRINUS.

(Secundo loco commemorandus est PROCLUS DIADOCHUS, cujus commentarium latinitate donavit FRANCISCUS BAROCIUS.)

BOËTHIUS *Euclidem* translatum in Romanam Linguam dedit, quæ inter Boëthii opera hodie exstant, ac inscribitur *Euclidis Megarensis Geometria ab Anit. Mant. Severin. Boëthio translata. Operum pag. m. 1179.* ubi tantum propositiones sine demonstrationibus exstant.

Verum *Euclidem* Latini prius ex Arabico translatum habuere, quam ex Græco fonte. Nam JOANNES CAMPANUS qui vixit circa salutis annum MI. uti Autor est *Raphaël Volaterranus*; vel anno Domini CIOXXX. uti censet *Trishemius*, ex Arabico in Latinum vertit. Illa autem versio reprehenditur

LXXVIII BREVIS NARRATIO HISTORICA

à CLAVIO *in præfat. in Euclid.* Quod Campanus in omnibus secutus sit, traditionem Arabum, qui magna ex parte Euclidis ordinem, & Methodum perverterunt, verbaque Propositionum ejusdem locis non paucis immutarunt; ut verus, germanusque Authoris sensus, perdifficile possit intelligi. Vid. VOSSIUS *de Scienc. Mathem.* pag. 61. 62.

Pariter ATHELARDUS, sive ADELARDUS, Anglus, Monachus Bathoniensis *Euclidis* Geometriam ex Arabico transtulit Latine Anno CIOCCXXX.

Vetustissimum Elementorum Typis exscriptorum exemplum esse videtur, quod prodit græce & latine sub titulo. *Euclidis opus Elementorum in XV. libros divisum, cum Commentariis Campani, & Præfatione Erhardi Radholt, Augustani, ad Johannem Mocenicum, Urbis Veneta Principem*; editum Venetiis, per dictum RADHOLTUM anno 1482. Cujus Editionis meminit CORNELIUS à BEUGHEM *in incunabilis Typographia.*

Prodiere libri XIII. latine, ex versione, & cum Commentario LUCÆ PACIOLÆ DE BURGO. Venet. 1489. fol.

Euclidis Elementa Latine, cum commentariis Campani; per LEONARDUM de Basilea, & GULIELMUM de Papia, socios; 20. Cal. Jun. edita sunt Vicent. 1491. fol.

ZAMBERTUS vertit libros. XIII. sub titulo Elementorum *Euclidis* ex traditione Pappi Philosophi, quæ verso prodierat. Venet. 1505. fol.

AM.

AMBROSIUS LACHER DE MERS,
PURGK Constanci diocesis Arcium libera-
 lium Magister, sacreque Mathematicæ stu-
 dii nostri Ordinarius in Achademia Franck-
 fordiana. *Euclidem* edidit anno 1506. 4.
 plagulis novem; *Campanum* sequitur. Non
 tamen nisi quatuor priores libros comparare
 in hoc volumine voluit Autor.

Textus de sphaera *Johannis de Sacrobosco*,
 & Geometria *Euclidis Megarensis*. Præmitti-
 tur *Jacobi Fabri stapulen*. Præfatio ad splen-
 didum virum *Carolus Borram* Thesaurarium
 Regium; tribus ultimis paginis habes libros
 quatuor Geometriæ *Euclidis à Boëtio* in Lati-
 num translatos. In fine exstat. Impressum
 Parisi in officina *Henrici Stephani* è regione
 schole decretorum sita. Anno Christi Syde-
 rum conditoris 1507. fol.

LUCAS PACIOLUS, Elementorum li-
 bros XV. interprete *Campano*, edidit, Ve-
 net. 1509. in fol. impressi sunt apud *Paganum*
Paganinum, ac dedicati *Cardinali Volaterrano*.

Latine prodire *Euclidis* Elementorum libri
 XV. interprete **CAMPANO**; & libri XIII.
 interprete **BARTHOLOMÆO ZAMBER-**
TO Veneto, Parisiis 1516. apud *H. Stephe-*
num avum, fol. una cum aliis *Euclidis* scrip-
 tis Basilæ. 1537. & 1546. fol.

ORONTIUS FINÆUS latine commenta-
 tus est in VI. priores *Euclidis* libros, qui
 prodiit Parisiis. 1530.

Euclidis Elementa vulgata sunt Græcè hoc
 titulo, *ευκλείδου στοιχείων βιβλία ή εκ των Θεω-*

LXXX BREVIS NARRATIO HISTORICA

105 *συνοψίων*. Basilæ 1533. apud *Joannem Heruagium*, fol. edente SIMONE GRYNÆO, è duobus cod. cibus MSS. Quorum alterum Venetiis *Lazarus Baysius*, alterum Parisiis *Johannis Ruellius* suppeditaverat. Ad-diti etiam in illa editione, itidem Græce, è codice Oxoniensi *Joh. Claymundi* sunt, sed admodum inemendate, Commentariorum li-bri quatuor, Autore *Proclo* Philosopho.

Euclidis Elementorum libri Græcè tum Florentiæ, tum Romæ, excusi sunt. 1545. 8.

JOHAN SCHEUBEL. Professor Eucli-dis Tubingæ, latine edidit VI. priores li-bros in quorum figuris nullæ literæ. Basi-leæ 1550. fol.

Libri VI. priores latine prodire cum Demonstrationibus ORONTII FINÆI Pari-siis apud Simon. Colineum. 1551. 4.

Libri XV. Græce & Latine excusi sunt cum præfatione *Stephani Graclis*. Parisiis 1557. 1573. & 1598. 8.

JACOBUS PELETARIUS libros VI. Priores latine edidit cum suis demonstratio-nibus fol. Anno 1557.

FRANCISCUS BAROCCIUS, *Procli* li-bros quatuor commentariorum in Euclidem, cum scholiis & figuris latine tantum edidit. Patavii. 1560.

WILHELM HOLTZMAM (*Guil. Xylan-landri*) libri sex priores Germanicè edidit Basel apud. J. *Operinum* 1562. fol.

Hanc sex priorum librorum, versionem Xylandri, JOHAN PETERSZ. DOU in Bel-

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. LXXXI

Belgicam Linguam transtulit. 1606. quæ
verſio iterum in Germanicam Linguam trans-
lata eſt à SEBASTIANO CURTIO.

Libri XIII. Græcè & Latinè ex Editione
CONRADI DASYPODII Argent. 1564. 8.
additis, ad librum primum & ſecundum tan-
tum, *Theonis* commentariis, & ad ſecun-
dum *Barlaami* Monachi Demonſtrationibus,
quibus ad numeros applicat, quæ de Lineis
ac figuris planis *Euclides* docuerat.

Libri. XV. Italice verſi & Explicati à
NICOLAO TARTAGLIA. Venet. 1565. 4.
& cum Commentario *Campani* itidem in lin-
gua Italica Venet. 1569. fol. Cum ſcholiis
antiquis incerti Autoris correſti & illuſtrati
à FREDRICO COMMANDINO 1575. fol.
& Piſauri. 1619. itidem Italice primi ſex
libri Mediolani. 8.

ARNOLDUS LENSÆUS Ifagogen in
Elementa *Euclids* compoſuit. Antw. 1565. 8.

CHRISTIANUS HERLINUS, & CON-
RADUS DASYPODIUS, publicarunt Ar-
gentinæ 1566. fol. Analyſes Geometricas
VI. librorum *Euclids*; ubi propoſitiones,
Græcè, Demonſtrationes, mere latine

Libri XV. latine demonſtrati à FRAN-
CISCO FLUSSATE CANDALLA, & li-
bro XVI. per ipſum addito aucti; de ſoli-
dorum regularium inter ſe invicem collatio-
ne, itemque XVII. de compoſitis regulari-
bus. Pariſiis 1566. fol. & 1578. fol.

Euclids Elementa cum notis H. BIL-
LINGSLEY & præfat. *Joh. Dee* Londinen-
ſis 1570. Lond. fol. idiomaſe anglicano ap-
paruere. ***** CON-

LXXXII BREVIS NARRATIO HISTORICA

CONRADUS DASYPODIUS inter alia *Euclidis* opera libros XV. Elementorum edidit Argent. 1571. 8. in ea editione nudæ propositiones græce & latine reperiuntur. Edidit & eodem anno librum primum *Theonis* commentariis illustratum græce, cum latina perspicua interpretatione, & *Heronis* vocabulis Geometricis.

FREDRICUS COMMANDINUS libros XV. *Euclidis* latine vertit, & cum suis commentariis edidit, Pisauri 1572. & 1619. fol.

FRANCISCUS MAUROYLYCUS Opuscula Mathematica Venetiis 1575. 4. edidit, in quibus Theoremata XIII^{ti} Elementi.

Per CONRADUM DASYPODIUM libri VI. latine in lucem editi, cum Scholiis *Isaaci* Monachi Argentorati. 1579. 8.

CHRISTOPHORUS CLAVIUS libros XV. latine cum scholiis & commentariis insignibus edidit Coloniae 1591. fol. Romæ 1603. 2 Tom. in 8. Francofurti 1607. 8. ac inter opera ejus Mathematica Moguntiae. 1612. fol. iterum Coloniae 1627. 8. prodit, in quorum decimo quarto & quinto, *Campanum* imitatur, *Flussatis* decimum sextum addit, ubi 31. Theoromatibus, ac 5. problematibus quinque corpora, variè sibi inscripta & circumscripta considerantur; ad modum tamen *Dasypodii* propositiones solas, absque Demonstrationibus ostendit. Alia iterum *Clavii* editio prodit Francofurti 1654. 2. Tom. in 8.

NASIRIDINUS TUSINUS Perfa *Euclidis*

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. LXXIII

dis libros XIII. Arabicè vertit ; quæ versio luculentis typis Arabicis lucem vidit Romæ 1594. fol. ex Typographia Medicea.

Excusus est Typis *Euclides* Coloniae 1600. 8. In hac solæ Euclideæ Propositiones absque Demonstratione reperiuntur ; præfixa est præfatio *Gracilis*.

CHRISTOPHORUS DIBAUDIUS latine Demonstrationem dedit linealem VI. priorum librorum. Arnhemiae 1603. 4. eorundemque demonstrationem numeralem. Lugd. Bat. 1603. Lib. VII. VIII. IX. Demonstrationem Arnhemiae 1605. libri X. seu Arithmeticæ irrationalium, demonstrationem Linealem & numeralem. ibid. eod.

AMBROSIUS RHODIUS XIII. libros latine demonstravit Witteb. 1609. 8. 1634. 1661.

SIMON MARIUS, Germanice VI. priores *Euclidis* libros demonstratos dedit, O. noldi. 1610. fol.

FLORIMUNDUS PUTEANUS librum *Euclidis* decimum cum commentariis edidit Parisiis. 1612. fol.

JOH. CHRIST. KNOPFF. libros duos priores, cum explicatione JOH. PAULI RESENI edidit Witteb. 1612. 8.

DOUNOT DE BAR-LE DUC. Gallice *Euclidis* Elementa vertit, Paris. 1613. 4. m. In libro decimo ordo turbatus, ut in Heruagiana latina editione in libris 5. 14. & 15. *Euclidem* stricte sequitur.

D. HENRION libros. XV. in Linguam Gal-

LXXXIV BREVIS NARRATIO HISTORICA

Gallicam versus est , Paris. 1615. 8. (& 1632. in 4ta) ac 1631. 8.

Libri VI. priores cum commentario JOH. LANZ. S. J. prodire Ingolst. 1617. 8.

SEBASTIANUS CURTIUS Germanicam paravit Editionem Amst. 1618. 4. item 1634. 8. m.

Libri XIII. Lond. 1620. fol. græce & latine prodire , nitida editio , cum *Com-
mandini* versione , adjectis figuris accuratis.

CAROLUS MALAPERTIUS. libros. VI. priores latine demonstravit. Duaci 1625. 12.

M. LUCAS BRUNN. Germanice *Euclidis* Elementa practica , oder auszug aller Problematum , und handarbeiten , aus den XV. büchern *Euclidis*. Norimb. 1625. 4. Definitiones nullæ , Theoremata nulla , sed nudæ Problematum solutiones.

PETRUS HERIGONIUS Gallice libros VI. priores vertit , ac edidit Paris. 1644. 8. & libros. XV. latine , & Gallice: in Tom. 1. *Curfus Mathematici* Paris. 1644. 8. m.

MARIUS MERSENNUS libros. VIII. latine in *Synopsi sua Mathematica* demonstratos dedit Paris. 1644. 4.

CLAUDIUS RICHARDUS latine in libros. XIII. commentatus est , Antwerp. 1645. fol.

MARIUS BETTINUS in *Ærario Mathematico* , Prolixos commentarios in VI. priores libros *Euclidis* dedit ; Bononiæ. 1648. 3. Tom. 4.

GEORGIUS FORNIER latine demonstra-
stra-

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. LXXXV

stravit VI. libros priores. Lond. 1654. 12.
& secunda editio Paris. 1654. 24.

ANDREAS TACQUET Elementa Geometrica Euclidea edidit Antwerp. 1654. 8. ac Amstel. 1701. 8. & cura WHISTONI recensita & locupletata est, Cantabrigiæ 1703. 8. (eadem recusa Amstel. 1725.) in quibus. VI. priores & XI. XII. continentur libri.

ISAACUS BARROUW librorum XV. editionem latinam paravit Cantabr. 1655. 8. Lond. 1659. 1678. Marburg. 1675. 8.

JOH. ALPHONSUS BORELLUS Euclidem restitutum, sive priscae Geometriæ Elementa brevius & facillius contexta elaboravit. Pisis. 1658. 4. Romæ 1677. 12.

CASPARUS SCHOTTUS libros VI. priores edidit in cursu Mathematico Herbip. 1662. Franc. 1674. & Bamb. 1677. fol.

CHRISTIANUS MELDER VI. priores Euclidis libros edi curavit Lugd. Bat. & Amstel. 1673. 12. *Furnerio* se multa debere ipse agnoscit.

CLAUDIUS FRANCISCUS MILLIET DECHALES XIV. libros Elementorum edidit in mundo Mathematico, ejusque Tom. I. qui prodiit. 1674. nec non post Autoris obitum, editore *Amato Varcino*. Lugd. 1690. fol. (Gallice vero libros. VI. priores cum XI. & XII. Paris. 1683. in 12.)

(Liber 5. Elementorum Euclidis explicatus secundum Doctrinam Gallilæi, à VINCENTIO VIVIANI Florentiæ 1674. 4.)

Euclidis Elementa Geometrica, novo ordine

LXXIVI BREVIS NARRATIO HISTORICA

dine ac Methodo fere demonstrata, una cum *Nicolai Mercatoris* in Geometriam Introductione brevi. Lond. 1678. 12. Autor misso ordine Geometræ, in margine expressit librum, & numerum propositionis ex ordine *Euclidis*.

JONAS MOORE anglice libros VI. priores cum XI. & XII. edidit, in the new systeme of the Mathematicks. Lond. 1681. 4.

HENRICUS COETS latine VI. priores libros demonstravit Lugd. Bat. 1691. 8. & Amstel. 1705. 8.

A. E. B. V. P. Teutsch Redender Euclides, oder acht Bücker (1-6. ac 11. & 12.) von denen anfängen des Meßkunst. Wien. 1694. 4.

OZANAM in cursu Mathematico libros VI. priores, una cum XI. & XII. Gallice interpretatus est, Paris. 1697. qui recusum Paris. 1699.

SAMUEL REYHERUS, germanice VI. priores libros edidit, Kiel. 1697. 4.

HENRICUS MEISNERUS Hamburgi *Elementa Euclidis* edere coepit Græcè & Germanicè, cum uberrimis Commentariis, itidem Germanicis A. 1699. fol. sed non editis ultra librum secundum.

DAVID GREGORIUS Græcè & Latinè libros XV. *Euclidis* recensuit, ac edidit Oxoniæ 1703. fol. è Theatro Sheldoniano. nitidissima Editio.

JACOBUS GOODEN ex *Euclide* præcipua collegit Theoremata, ac edidit. Leod. 1704. 8.

Decha-

DE EUCLIDIS VITA, AC ELEMENTIS. LXXXVII

Decholes par OZANAM Paris. 1709. 12. m.

The Elements of Euclid, With select Theorems out of Archimedes by the Learned Audrew Taquet, by WILLIAM WHISTON. the third edition Lond. 1714. 8. m.

JOANNES KEIL, ex versione *Commandini* libros VI. priores cum. XI. & XII. imprimi curavit. Oxon. 1715. 8.

P. JACOB KRESA *Euclidem* in linguam Hispanicam traduxisse fertur, in literariis novis Germanice 1721.

SAMUEL CUNN Keilianam editionem anglie traduxit Lond. 1723. 8.

Demonstration universelle des converses d'Euclide par Mr. SELLIER 1723.

Prodiit apud Woodward tomus secundus Elementorum Euclidis, ex editione *Gregorii* in linguam Anglicam versorum, per EDMUNDUM ROVAN 1732.

Euclids Elements of Geometry, from the Latin translation of *Commandine*, by Dr. *John Keill*, translated by *Samuël Cunn*, carefully revised and corrected by JOHN. HOM. the third. edition. 1733.

Præter has *Euclidis* Editiones etiam recensentur Elmenta *Euclidis* Arabice versa à THEBETO.

Persicam versionem Bodlejana; *Syriacam* Cantabrigienſis Bibliotheca servat.

Libri VII. ex Arabico Ebraicè versi à JOH. JACOBO MECHIR.

Alia Hebraica versio R. MOSIS ABEN TIBBON. Quam versionem *Buxtorfius* Mospes

LXXXVIII BREVIS NARRATIO HISTORICA

speffuli. A. C. 1210. factam esse testatur
vid. WOLFII. *Biblioth. Hebraea part. 1. pag.*
133.

Denique Sinice, ac Tartarice *Euclidis*
Elementa versa sunt.

Plantavitiuſ Romæ in Bibliotheca Me-
dicea præclariffimum *Euclidis Exemplar*
Hebræum vidiffe fe ait, magnis in folio
membranis, iisque teriffimis, nobilique
charactere, & auctario duorum librorum,
qui non exiftent in Græcis & Latinis exem-
plaribus uti refert WOLFIIUS in *Biblioth.*
Hebraea part. 1. pag. 133. funt & alia exem-
plaria Hebraica quæ à Wolfio loco citato
enumerantur.

EUCLIDIS



E U C L I D I S

E L E M E N T U M

P R I M U M.



Ortus hic primus liber in eo positus est, ut nobis tradat ortus proprietatesque triangulorum, tum quod ad eorum angulos spectat, tum quod ad latera: qua quidem inter se comparat interdum, interdum vero unumquodque per se inspicit, & contemplatur. Nam aliquando ex lateribus trianguli angulos considerat, aliquando vero ex angulis latera, secundum aequalitatem atque inaequalitatem, rimatur. Idemque variis rationibus inquirat, in duobus quandoque triangulis inter se collatis. Deinde aperit nobis parallelarum proprietates, parallelogrammorumque contemplationem aggreditur, tum inter se, tum etiam, ut cum triangulis inter easdem parallelas constitutis conferuntur. Ut autem hac omnia rectius, & commodius exequatur Euclides, docet divisionem anguli rectilinei, & lineam rectam in partes aequales, constitutionem lineam perpendicularis, quo pacto angulus angulo fiat aequalis, & alia huiusmodi. Itaque ut uno verbo rem totam complectar, in primo libro traduntur, ex Procli sententia, rectilinearum figurarum maxime prima, ac praecipua, triangula inquam, atque parallelogramma.

A

D E.

DEFINITIO. I.

Punctum est, cujus pars nulla est.

ANte omnia vero Euclides more Mathematicorum rem propositam exorditur a principiis, initio facto à definitionibus, quarum prima punctum explicat, docens illud dici punctum in quantitate continua, quod nullas habet partes. Qua quidem definitio planius ac facilius percipietur, si prius intelligamus, quantitatem continuam triplices habere partes, unas secundum longitudinem, alteras secundum latitudinem, & secundum profunditatem altitudinemve alteras. Itaque quod in quantitate continua, sive magnitudine existit, intelligiturque sine omni parte, ita ut neque longum, neque latum, neque profundum esse cogitur, id appellatur ab Euclide, & à Geometris punctum.

DEFINITIO. II.

Linea verò, longitudo latitudinis expers.

Definit hic lineam, primam speciem magnitudinis, quam dicit esse quantitatem longam duntaxat, non autem latam, intellige neque profundam.

Mathematici, ut nobis inculcent veram lineæ intelligentiam, imaginantur punctum jam descriptum superiore definitione, è loco in locum moveri. Cum enim punctum sit prorsus individuum, relinquetur ex isto motu imaginario vestigium quoddam longum om-

TAB. I. nis expers latitudinis. Ut si punctum *A*, fluere
Fig. 1. intelligatur ex *A*, in *B*, vestigium effectum *AB*, lineæ appellabitur, cum vere intervallum inter duo puncta *A*, & *B*, comprehensum sit longitudo quædam

dam carens omni latitudine, propterea quod punctum A, omni privatum dimensione, eam efficere nulla ratione potuerit.

DEFINITIO. III.

Lineæ autem termini, sunt puncta.

DOcet quod linea qualiter habens extrema, in TAB. I
suis extremitatibus puncta recipiat. Ut linea fg. 11
AB, extrema habet puncta A, & B.

DEFINITIO. IV.

Recta linea est, quæ ex æquo suâ
interjacet puncta.

HOc est, in qua nullum punctum intermedium
ab extremis sursum, aut deorsum, vel huc,
atque illuc deflectendo subsultat; in qua denique nihil
flexuosum reperitur.

Quemadmodum autem Mathematici per fluxum
puncti imaginarium concipiunt describi lineam, ita
per qualitatem fluxus puncti, qualitatem lineæ descripta
intelligunt. Si namque punctum recta fluere concipiatur
per brevissimum spatium, ita ut neque in hanc
partem, neque in illam deflectat, sed æquabilem
quendam motum, atque incessum teneat, dicetur
linea illa descripta, Recta.

DEFINITIO. V.

Superficies est, quæ longitudinem, latitudi-
nemque tantum habet.

POst lineam, quæ est prima quantitatis continua
species, unicamque habet dimensionem, definit
A 2 superæ

4 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

superficiem, quæ secundam magnitudinis speciem constituit, additque primæ dimensionis secundum longitudinem, alteram secundum latitudinem. Nam in superficie reperitur, non solum longitudo, ut in linea, verum etiam latitudo, sine tamen omni profunditate. Ut quantitas $ABCD$, inter lineas AB , BC , CD , DA , comprehensa, considerataque secundum longitudinem AB , vel CD , & secundum latitudinem AD , vel BC , omnis ex parte profunditatis, appellatur superficies.

TAB. I.
fig. 2.

Mathematici vero, ut nobis eam ob oculos ponant, monent, ut intelligamus lineam aliquam in transversum moveri: Vestigium enim relictum ex ipso motu erit quidem longum, propter longitudinem lineæ, latum quoque propter motum, qui in transversum est factus; nulla vero ratione profundum esse poterit, cum linea ipsum describens omni careat profunditate; quare superficies dicetur. Ut si linea AB , fluat versus DC , efficietur superficies $ABCD$.

DEFINITIO. VI.

Superficii autem extrema, sunt lineæ.

Non dissimilis est hac definitio superiori, qua termini lineæ fuere explicati. Vult enim extremitates superficiæ esse lineas, quemadmodum lineæ fines extiterunt puncta. Ut superficiæ $ABCD$, extrema sunt lineæ AB , BC , CD , DA .

TAB. I.
fig. 2.

DEFINITIO. VII.

Plana superficies est, quæ ex æquo suas interjacet lineas.

Hæc quoque definitio, similitudinem quandam descriptionis lineæ rectæ gerit. Superficies enim, quæ ex æquo lineas suas interjacet, ita ut

media

LIBER PRIMUS. §

media partes ab extremis sursum, deorsumve subsul-
tando, non recedant, appellabitur plana: qualis est
superficies perpolii alicujus marmoris, in qua partes
omnes in rectum sunt collocatae, ita ut nihil habeas
incisum angulis, nihil anfractibus, nihil eminent,
nihil lacunosum: In hac enim partes intermedia cum
extremis aequalem adeptae sunt situm, nec ulla est alia
sublimior, humiliorve, sed omnes aquabiliter pro-
sendantur.

Hac autem superficies sola erit ea, quam imagi-
nari, & intelligere possumus describi ex motu linea
rectae in transversum, qui super duas alias lineas rectas
conficitur. Ut si linea recta AB , per duas rectas TAB. 13
 AD , BC , feratur, efficietur superficies perfecte plana. fig. 2.

Solent Mathematici superficiem planam frequenter
appellare planum, ita ut quando loquuntur de plano,
intelligenda semper sit superficies plana.

DEFINITIO VIII.

Planus vero angulus, est duarum linearum
in plano se mutuo tangentium, & non in di-
rectum jacentium, alterius ad alteram inclinatio.

DEclarat, quidnam sit angulus planus, dicens;
quandocumque duae lineae in plana aliqua
superficie invicem concurrunt, & non in directum con-
stituuntur, efficietur ex hujusmodi concursu, seu in-
clinatione unius ad alteram, angulus, qui dicitur
planus, propterea quod in plana constituatur superficie.
Verbi gratia, quia duae lineae, AB , AC , concur-
runt in A , & non jacent in directum, ideo efficiunt TAB. 14
angulum A , planum in eadem existentem superficie, fig. 3.
in qua duae illae lineae constituuntur. Dicuntur autem
duae lineae non in directum jacere, quando altera ea-

5 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

rum versus concursum protensa non coincidit cum altera, sed vel eam secat, vel certe statim post punctum concursus ab ea recedit. Quod si dua lineæ se mutuo tangant jacentes in directum, ita ut alterutra producta congruat toti alteri, non fiet ullus angulus ex illo concursu, cum nulla sit inclinatio, sed amba unam integram lineam constituent. Ut quia recta

TAB. I.
Fig. 4.

AB, producta convenit cum recta BC, non efficietur angulus in B. Quare in directum dicentur jacere. Itaque ut lineæ rectæ efficiant angulum, necesse est, ut post concursum productæ se mutuo secent.

Consistit autem anguli cujuscvis quantitas in sola inclinatione, non in longitudine linearum; lineæ etenim longius excurrentes non augent suam inclinationem, igitur neque anguli magnitudinem.

DEFINITIO. IX.

Cum autem, quæ angulum continent lineæ, rectæ fuerint, rectilineus ille angulus appellatur.

Angulus omnis planus qui conficitur ex lineis duabus rectis, rectilineus dicitur.

DEFINITIO. X.

Cum vero recta linea super rectam consistens lineam eos, qui sunt deinceps, angulos æquales inter se fecerit, rectus est uterque æqualium angulorum. Et quæ insistit recta linea, perpendicularis vocatur ejus, cui insistit.

Docet hoc loco Euclides, quisnam angulus rectilineus apud Geometras appellatur rectus, quænam linea perpendicularis: si recta linea AB, recta CD, insistens efficiat duos angulos prope punctum B,

TAB. I.
Fig. 5.

L I B E R P R I M U S. 7

B, (qui quidem ideo dicuntur à Mathematicis esse deinceps, quod eos eadem linea CD, protracta, prope idem punctum B, efficiat) inter se aequales, quod tum demum fiet, quando recta AB, non magis in C, quam in D, inclinabit, sed aequaliter recta, CD, insistet, vocabitur uterque angulus B, rectus, & recta AB, perpendicularis recta, CD, cui insistet. Eadem ratione nominabitur recta CB, perpendicularis recta AB: quamvis enim CB, tantum faciat cum AB, unum angulum, tamen si AB, extenderetur in rectum & continuum versus punctum B, efficeretur alter angulus aequalis priori.

Itaque ut in Geometria concludamus angulum aliquem esse rectum, aut lineam, qua ipsum efficit, ad aliam esse perpendiculararem, requiritur, & sufficit, ut probemus angulum, qui est ei deinceps, aequali illi esse. Pari ratione, si dicatur aliquis angulus rectus, aut linea, qua ipsum constituit, perpendicularis ad aliam, colligere licebit, angulum illi deinceps aequalem quoque esse.

D E F I N I T I O. XI.

Obtusus angulus est, qui recto major est.

Quando recta AB, recta CD, insistentes non TAB. 6 fecerit angulos ad punctum B, aequales, & ob se. 6. cum causam neutrum rectum, sed unum quidem recto majorem, alterum vero minorem, dicitur major angulus obtusus, qualis est angulus B, ad punctum C, vergens, qui continetur rectis lineis, AB, BC.

8 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

DEFINITIO. XII.

Acutus vero, qui minor est recto.

TAB. I. **M**inor angulus B , ad punctum D , vergens, qui continetur rectis lineis AB , BD , vocatur acutus.

Quoniam vero ad quemvis angulum planum constituendum concurrunt dua linea, & aliquando in uno puncto plures existunt anguli, solent Mathematici, ut tollatur confusio, angulum quemlibet exprimere tribus literis, quarum media ostendit punctum, in quo linea conficiunt angulum, extrema vero significant initia linearum, qua angulum continent. Exempli gratia, angulum obtusum intelligunt per angulum ABC , acutum vero, per angulum ABD , quod diligenter est notandum, ut facile dignoscamus angulos, quorum mentio fit in demonstrationibus.

DEFINITIO. XIII.

Terminus est, quod alicujus extremum est.

Tres sunt termini juxta hanc definitionem. Punctum enim terminus est, seu extremum linea: Linea superficiei: & superficies corporis. Omne siquidem terminatum superat terminum suum una dimensione, ut perspicuum est ex adductis exemplis.

DEFINITIO. XIV.

Figura est, quæ sub aliquo, vel aliquibus terminis comprehenditur.

Non omnis quantitas terminos possidens Figura dici potest, ne lineam finitam figuram appellare

lare cogamur: Sed ea solum magnitudines, quæ latitudinem habens, nempe superficies terminata, & quæ profunditatem adepta quoque sunt, ut solida finita, Figura nomine appellabuntur. Hæ enim proprie terminis comprehendi dicuntur. Nam linea finita non proprie dicitur punctis extremis comprehendi, cum puncta lineam non ambiant, sed potius punctis terminari dicitur. Itaque termini debent quantitatem, quæ figura dicitur, ambire, & non tantum terminare.

DEFINITIO. XV.

Circulus, est figura plana sub una linea comprehensa, quæ peripheria appellatur; ad quam ab uno puncto eorum, quæ intra figuram sunt posita, cadentes omnes rectæ lineæ inter se sunt æquales.

Definit hic circulum, figuram inter planas perfectissimam, docens figuram illam planam, quæ unica linea circumscribitur, ad quam lineam omnes rectæ lineæ ductæ ab uno puncto, quod intra figuram existit, sint æquales, vocari circulum. Ut si superficies, seu spatium concludatur unica linea ABC , habuerisque hanc conditionem, ut ab aliquo puncto intus suscepto, utpote à D , omnes rectæ lineæ cadentes ad terminum ABC , quales sunt DA , DB , DC , inter se sint æquales, appellabitur talis figura plana circulus, alias non.

Adjungit quoque Euclides, lineam extremam circuli, qualis est ABC , appellari Peripheriam, seu, ut Latini exponunt, circumferentiam.

Potest circulus etiam hac ratione describi. Circulus est figura plana, quæ describitur à linea recta finita

TAB. 7.
fig. 7.

10 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

finita circa alterum punctum extremum quiescens circumducta, cum in eundem rursus locum restituta fuerit, unde moveri cœperat. Ut si intelligatur recta

TAB. I. AD, circa punctum D, quiescens moveri, donec
 fig. 7. ad eundem redeat locum, à quo dimoveri cœpit, describet ipsa recta totum spatium circulare; punctum vero alterum extremum A, delineabit peripheriam ABC: Erit quoque punctum quiescens D, illud, à quo omnes lineæ cadentes in peripheriam sunt inter se æquales, propterea quod recta AD, circumducta, omnes lineas, quæ ex D, possunt educi ad peripheriam, æque metiatur.

DEFINITIO. XVI.

Hoc vero punctum, centrum circuli appellatur.

Docet, punctum illud intra circulum, à quo omnes lineæ rectæ ad circumferentiam ductæ

TAB. I. sunt æquales, appellari centrum circuli; quale est
 fig. 7. punctum D.

DEFINITIO. XVII.

Diameter autem circuli, est recta quædam linea per centrum ducta, & ex utraque parte in circuli peripheriam terminata, quæ circulum bifariam fecat.

TAB. I. SI in circulo ducatur recta linea AB, per cen-
 fig. 8. trum C, ita ut extrema ejus A, & B, terminentur in peripheria, appellabitur ea circuli diameter. Non igitur omnis in circulo recta linea ducta diameter dicitur, sed ea solummodo, quæ per centrum usque ad peripheriam utrinque extenditur.

Unde

L I B E R P R I M U S. 27

Unde plures assignari poterunt in circulo diametri, unum vero centrum duntaxat.

Quod autem Euclides addit, circulum bifariam secari à diametro, perspicuum ex eo esse potest, quod diameter per medium circulum, utpote per centrum, ducitur. Hinc enim fit, ut propter directum diametri per centrum transitum, utrinque aequales circumferentia abscindantur.

D E F I N I T I O. XVIII.

Semicirculus vero est figura, quæ continetur sub diametro, & sub ea linea, quæ de circuli periphèria aufertur.

Exempli gratia, in circulo figura *ADB*, contenta sub diametro *AB*, & periphèria *ADB*, fig. 8. dicitur semicirculus; eadem ratione erit figura *AEB*, semicirculus. TAB. 1.

D E F I N I T I O. XIX.

Rectilinae figuræ sunt, quæ sub rectis lineis continentur.

Omnes igitur figura plana, qua undique rectis clauduntur lineis, rectilinea nuncupantur.

D E F I N I T I O. XX.

Trilateræ quidem, quæ sub tribus.

Affirmans Euclides, eas rectilineas figuras dici trilateras, qua tribus rectis lineis circumscribuntur.

D E.

EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

DEFINITIO. XXI.

Quadrilateræ quidem, quæ sub quatuor.

DEFINITIO. XXII.

Multilateræ autem, quæ sub pluribus, quam quatuor, rectis lineis comprehenduntur.

Quoniam species rectilinearum figurarum sunt innumerabiles, propter infinitum numerorum progressum. Ideo Euclides, ne infinitatem hanc figurarum cogatur persequi, vocat omnes alias figuras rectilineas, quæ pluribus, quam quatuor, rectis lineis circumscribuntur, generali vocabulo Multilateras.

DEFINITIO. XXIII.

Trilaterarum autem figurarum, Æquilaterum est Triangulum, quod tria latera habet æqualia.

TAB. I. QUANDO omnia tria latera inter se æqualia sunt, ut AB, BC, CA, dicitur triangulum Æquilaterum.
fg. 9.

DEFINITIO. XXIV.

Isoceles autem est, quod duo tantum æqualia habet latera.

TAB. I. UTi, si duo latera AB & AC, tantum inter se sint æqualia, vel DE & DF, dicitur utrumque triangulum Isoceles.
fg. 10.
fg. 11.

DEFINITIO. XXV.

Scalenum vero est, quod tria inæqualia
habet latera.

Quando omnia tria latera inter se sunt inæqualia, TAB. I,
uti AB , BC , & CA , dicitur triangulum *fig. 12.*
scalenum.

DEFINITIO. XXVI.

Ad hæc etiam, trilaterarum figurarum,
Rectangulum quidem triangulum est, quod
rectum angulum habet.

Quando triangulum aliquod habet angulum unum
rectum, vocatur ab Enclide, & aliis Geo-
metris Rectangulum. Ut, si triangulum ABC , TAB. I,
unum angulum habeat ad B rectum, dicetur illud *fig. 13.*
triangulum rectangulum.

DEFINITIO. XXVII.

Amblygonium autem, quod obtusum
angulum habet.

Triangulum Amblygonium, sive obtusangulum
est, quod unum habet angulum recto majorem.
Ut si in triangulo ABC , angulus ad B recto major TAB. I,
existat, vocetur triangulum amblygonium. *fig. 14.*

14 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

DEFINITIO. XXVIII.

Oxygonium vero, quod tres habet acutos angulos.

IN omni porro triangulo, cujus duo quacunque latera expresse nominantur, solet reliquum latus tertium à Mathematicis appellari *Basis*, sive illud in situ infimum occupet locum, sive supremum.

DEFINITIO. XXIX.

Quadrilaterarum autem figurarum, Quadratum quidem est, quod & æquilaterum, & rectangulum est.

Figura quadrilatera dicitur *Quadratum*, cujus quidem omnia quatuor latera inter se equalia existunt, omnesque anguli recti. Uti si in figura
 TAB. II. quadrilatera ABCD, omnia, quatuor latera, AB,
 fig. 1. BC, CD, & DA, sint inter se equalia, & omnes anguli recti, erit illa *Quadratum*.





DEFINITIO. XXX.


Altera vero parte longior figura est, quæ rectangula quidem, at æquilatera non est.

Figura quadrilatera appellatur *Altera parte longior*, in qua quidem anguli sunt recti, ac latera non sunt inter se equalia, quamvis bina opposita inter se equalia existant. Ut, si in figura
 TAB. II. ABCD, latera AB, DC, inter se, & AD,
 fig. 2. BC, inter se quoque equalia sint.

D E.

TAB. I.





DEFINITIO. XXXI.

Rhombus autem, quæ æquilatera, sed
rectangula non est.

Figura inter quadrilateras, quæ Rhombus dicitur,
oppositas prorsus habet conditiones, & diversas
à conditionibus figura altera parte longioris. Habet
enim omnia latera AB , BC , CD , & DA , TAB. II;
equalia, angulos vero non rectos, & inæquales, fig. 3:
quamvis bini oppositi A & C , B & D inter se
æquales existant.

DEFINITIO. XXXII.

Rhomboides vero, quæ adversa & latera,
& angulos habens inter se æquales, neque
æquilatera est, neque rectangula.

Est hæc figura, quæ Rhomboides vocatur, qua-
drato omni ex parte opposita. Nam neque
ejus latera omnia equalia sunt, neque ullus angulus
rectus, sed tamen latera bina opposita, qualia sunt
 AB , DC , & AD , BC , in Rhomboide $ABCD$, TAB. II;
equalia inter se, item anguli bini oppositi, quales fig. 4:
sunt A , C , & B , D , inter se existunt æquales.

DEFINITIO. XXXIII.

Præter has autem, reliquæ quadrilateræ
figuræ, Trapezia appellantur.

Reliquas omnes figuras quadrilateras, quæ à
prædictis quatuor differunt, ita ut neque
latera omnia equalia, neque omnes angulos æquales,
scilicet

16 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

seu rectos, neque latera bina opposita; neque angulos binos oppositos habeant inter sese aequales, qualis est

TAB. II. figura ABCD, generali vocabulo Trapezia nominat: fig. 5. qua quidem infinitis modis variari queant.

DEFINITIO. XXXIV.

Parallelæ rectæ lineæ sunt, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraque parte in infinitum producantur, in neutram sibi mutuo incidunt.

UT dua, vel plures rectæ lineæ dicantur parallelæ, sive æquidistantes, non satis est, ut in quamcunque partem, etiam spatio infinito, productæ nunquam ad unum punctum coeant; sed necesse quoque est, ut in una plana superficie existant. Multæ siquidem lineæ rectæ non existentes in eadem superficie plana productæ ad spatium infinitum, nunquam in unum conveniunt, & tamen non sunt parallelæ dicenda; quales sunt, exempli gratia, dua rectæ lineæ in transversum posita in medio aere, & non se tangentes; hæc etenim nunquam coire possunt.

Dicuntur autem dua lineæ in eadem existere plana superficie, quando superficies aliqua plana uni earum accommodata, ita ut omnia puncta illius tangat, & circa illam immobilem circumvoluta, alteri quoque accommodari potest secundum omnia ejus puncta, quamvis re ipsa in duabus superficiebus diversis reperiantur; Ut propositis duabus rectis lineis AB, CD, si superficies aliqua plana rectæ AB, applicetur, omnia ejus tangens puncta, ita ut circa illam circumducta tangat quoque omnia puncta alterius rectæ CD; dicuntur hujusmodi rectæ dua lineæ in eadem superficie plana existere, alias non. Si igitur hæc dua rectæ lineæ eadem non

TAB. II. fig. 6.

CHARTI,

coeant, etiamsi infinite producantur tam ad partes, *A*, *C*, quam ad, *B*, *D*, appellabuntur parallela, seu aequidistantes.

Quod si dua recta linea per immensum aliquod spatium extensa non cernantur coire, constet tamen, eas tandem ex una parte longius protractas in unum punctum conventuras, quamvis ex altera semper magis ac magis inter se distent, ac disjungantur, nequaquam appellandæ erunt parallela.

Hic finem imponit Euclides definitionibus primo libri. Quoniam vero hoc eodem libro mentio fit figura, qua Parallelogrammum, nec non earum, qua complementa parallelogrammi dicuntur, necessarium esse duximus, duabus definitionibus adjunctis explicare, quid sit Parallelogrammum, & qua sint parallelogrammi complementa, ut facilius demonstrationes percipiantur.

DEFINITIO. XXXV.

[Parallelogrammum est figura quadrilatera; cujus bina opposita latera sunt parallela, seu aequidistantia.]

UT figura quadrilatera *ABCD*, siquidem latus *AB*, aequidistet lateri *DC*, & latus *AD*, lateri *BC*, nuncupatur Parallelogrammum. TAB. II.
fig. 4.

DEFINITIO. XXXVI.

[Cum vero in parallelogrammo diameter ducta fuerit, duæque lineæ lateribus parallelæ secantes diametrum in uno eodemque puncto, ita ut parallelogrammum ab hisce parallelis in quatuor distribuatür parallelogramma; appellan-

B

pellan-

18 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

pellantur duo illa, per quæ diameter non transit, complementa; duo vero reliqua, per quæ diameter incedit, circa diametrum consistere dicuntur.]

TAB. II. *fig. 7.* Sit parallelogrammum $ABCD$, in quo diameter AC , & linea EF , secans diametrum in G , & parallela existens lateribus AD , BC . Item linea HI , secans diametrum in eodem puncto G , parallelaque lateribus AB , DC , existens. Quæ cum ita sint, perspicuum est, parallelogrammum totum divisum esse in quatuor parallelogramma, quorum quidem duo $EBIG$, $GFDH$, per quæ diameter AC , non transit, vocantur à Geometris complementa, sive supplementa reliquorum duorum $AEGH$, $GICF$, quæ dicuntur circa diametrum consistere, quippe cum per eam diameter transeat, ut videre est in presenti figura.

PETITIO VEL POSTULATUM. I.

Postuletur, ut à quovis puncto in quodvis punctum, rectam lineam ducere concedatur.

Primum hoc postulatam planum admodum est, si recte considerentur ea, quæ paulo ante de linea scripsimus. Nam cum linea sit fluxus quidam puncti imaginarius, atque adeo linea recta fluxus directo omnino itinere progrediens, fit, ut si punctum quodpiam ad aliud directo moveri intellexerimus, ducta sane sit à puncto ad punctum recta linea: Id quod prima hac permissione postulat Euclides, quemadmodum

TAB. II. *fig. 8.* hic vides à puncto A , ductam esse rectam lineam ad punctum B ; ab eodemque aliam ad punctum C ; Item aliam ad punctum D ; & sic innumera alia ab eodem puncto educi possunt ad alia atque alia puncta. PE.

PETITIO VEL POSTULATUM. II.

Et rectam lineam terminatam in continuum recta producere.

Quod si punctum illud ferri adhuc cogitaverimus motu directo, & qui omnis inclinationis sit expers, producta erit ipsa recta linea terminata, & nunquam erit finis hujus productionis, cum punctum illud intelligere possimus moveri ad infinitam distantiam. Sic linea recta *AB*, producta est primo in continuum ad punctum *C*. Deinde ad punctum *D*, &c.

TAB. II.
fig. 9.

PETITIO VEL POSTULATUM. III.

Item quovis centro, & intervallo circulum describere.

Jam vero, si terminatam rectam lineam cujuscunque quantitatis, mente conceperimus applicatam esse secundum alterum extremum ad quodvis punctum, ipsamque circa hoc punctum fixum circumduci, donec ad eum revertatur locum, a quo dimoveri coepit; descriptus erit circulus, effectumque, quod tertia petitio jubet. Exemplum habes in his quinque lineis *AB*, *AC*, *AD*, *AE*, *AF*, qua singula circa centrum *A*, circumvoluta, singulos circulos descripserunt juxta quantitatem, seu intervallum ipsarum.

TAB. II.
fig. 10.

Præter hæc tria postulata, quibus Euclides contentus fuit, sunt multa alia aequæ facilia, è quibus dumtaxat in medium proferre decrevi illud, quod frequentius repetendum erit in progressu totius Geometriæ.

PETITIO VEL POSTULATUM. IV.

[Item quacunque magnitudine data, sumi posse aliam magnitudinem vel majorem, vel minorem.]

Omnis enim quantitas continua per additionem augeri, per divisionem vero diminui potest infinite: Unde nunquam dabitur quantitas continua adeo magna, quin ea major dari possit: neque tam parva, quin minor ea possit exhiberi.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. I.

Quæ eidem æqualia, & inter se sunt æqualia.

[Et quod uno æqualium majus est, aut minus, majus quoque est, aut minus altero æqualium. Et si unum æqualium majus est, aut minus magnitudine quapiam, alterum quoque æqualium eadem magnitudine majus est, aut minus.]

Fieri nulla ratione potest, ut due quantitates inæquales, æquales sint alteri quantitati. Si enim minor illarum proposita quantitati æqualis extiterit, excedet eandem necessario major illarum. Et si major æqualis fuerit proposita quantitati, superabitur minor ab eadem. Quare recte colligitur, quantitates, quæ eidem quantitati æquales fuerint, inter se æquales quoque esse.

AXIO-

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. II.

Et si æqualibus æqualia adjecta sint, tota sunt æqualia.

SI enim quantitates constare, sive composita, inæquales forent, proculdubio majori plus esset adjectum, quam minori, cum antea æquales existerint. Quare ex additione æqualium quantitatum ad quantitates æquales, conficiuntur quantitates quoque æquales.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. III.

Et si ab æqualibus æqualia ablata sint, quæ relinquuntur, sunt æqualia.

Nam si reliqua quantitates forent inæquales, à minore plus fuisset detractum, quam à majore.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. IV.

Et si inæqualibus æqualia adjecta sint, tota sunt inæqualia.

[Et, si inæqualibus inæqualia adjecta sint, majori majus, & minori minus, tota sunt inæqualia, illud nimirum majus, & hoc minus.]

Quin &, si æqualibus inæqualia adjecta sint, tota erunt inæqualia: quoniam major quantitas addita uni æqualium, majorem constituit quantitatem, quam minor alteri æqualium adjecta: quemadmodum & si inæqualibus æqualia adjiciantur, composita quantitas ex majore, major est, quam composita ex minore.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. V.

Et si ab inæqualibus æqualia ablata sint, reliqua sunt inæqualia.

[Et si ab inæqualibus inæqualia ablata sint, à majori minus, & à minori majus, reliqua sunt inæqualia, illud nimirum majus, & hoc minus.]

*S*ic etiam, si ab equalibus inæqualia ablata sint, reliqua erunt inæqualia: quia major quantitas ablata relinquet minorem quantitatem, quam minor; quemadmodum residuum majoris majus est residuo minoris, si æqualia auferantur ab inæqualibus.

In his omnibus pronunciatis, primo excepto, nomine equalium quantitatum intelligenda est etiam una & eadem multis communis. Si enim equalibus idem commune adjiciatur, tota fiunt equalia: Et si ab equalibus idem commune detrahatur, residua equalia erunt: Et si inæqualibus idem commune adjiciatur; vel eidem communi addantur inæqualia, tota fiunt inæqualia: & si ab inæqualibus idem commune detrahatur; vel ab eodem communi inæqualia auferantur, residua existent inæqualia.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. VI.

Et quæ ejusdem duplicia sunt, inter se sunt æqualia.

[Et quod unius æqualium duplum est, duplum est & alterius æqualium.]

*S*imiliter, quæ ejusdem sunt triplicia, vel quadruplicia, vel quintuplicia, &c. inter se sunt equalia. Si enim inæqualia forent, & majus eorum esset

esse duplex, vel triplex, &c. alicujus quantitatis, deficeret utique minus à duplici, vel triplisi. &c. Quod si contra, minus esset duplex, vel triplex, &c. quantitatis cujuscumque, excederet sane majus duplex ipsum; vel triplex, &c.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. VII.

Et quæ ejusdem sunt dimidia, inter se æqualia sunt.

[Et contra, Quæ æqualia sunt, ejusdem sunt dimidia.]

Pari ratione, quæ ejusdem sunt partes tertia, vel quarta, vel quinta, &c. inter se æqualia sunt.

In his duobus pronunciatis per eandem quantitatem, intelligi debent quantitates etiam æquales. Nam quæ æqualium duplicia sunt, vel triplicia, &c. inter se æqualia quoque sunt: Item, quæ æqualium sunt dimidia, vel tertia, vel quarta, &c. & inter se æqualia necessario existunt.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. VIII.

Et quæ sibi mutuo congruunt, ea inter se sunt æqualia.

Hoc est, duæ quantitates, quarum una superposita alteri, neutra alteram excedit, sed amba inter se congruunt, æquales erunt. Ut duæ lineæ rectæ dicuntur esse æquales, quando una alteri superposita, ea quæ superponitur, alteri tota congruit, ita ut eam nec excedat, nec ab ea excedatur. Sic etiam duo anguli rectilinei æquales erunt, quando uno alteri superposito, is qui superponitur, alterum nec excedit,

34 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

neq ab eo exceditur, sed linea illius cum lineis huius prorsus coincidunt: Ita enim erunt inclinationes linearum aequales, quamvis linea interdum inter se inaequales existant.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. IX.

Et totum sua parte majus est.

Cum pars à toto ablata relinquat adhuc aliquid, ne totum ipsum auferatur; perspicuum est, omne totum sua esse parte majus.

In sequentibus porro pronuntiatis interrumpitur ordo Euclidis. In margine tamen numeros appositus ordinis Euclidis respondententes.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. X.

[Duæ lineæ rectæ non habent unum & idem segmentum commune.]

Non est difficile istud Axioma, si perfecte intelligatur natura rectæ lineæ. Cum enim linea recta directo semper itinere, nullam in partem deflectendo, producat, fieri nullaratione potest, ut duæ lineæ rectæ habeant unam partem, quamvis minimam, communem, præter unicum punctum, in quo se mutuo interfecant.

Possunt tamen duæ lineæ rectæ commune habere segmentum, quando unam & eandem rectam lineam

TAB. II. fig. 9. constituunt. Ut in hoc figura, rectæ AC, BD, commune habent segmentum BC, quia amba unam rectam constituunt lineam AD. At vero quando

TAB. II. fig. 11. duæ rectæ sunt diversæ, quales sunt AB, CD, non possunt possidere segmentum aliquod commune.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XI.

[Duæ rectæ in uno puncto concurrentes, si producantur ambæ, necessario se mutuo in eo puncto interfecabunt.]

HOc etiam Axioma ex natura lineæ rectæ pendet.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XII. X

Item, omnes anguli recti sunt inter se æquales.

HOc axioma apertissimum esse cuilibet potest ex 10. definitione, qua angulus rectus describitur; propterea quod inclinatio linearum angulum rectum constituentium augeri, minuive nequit, sed prorsus est immutabilis. Efficitur enim rectus angulus à lineâ perpendiculari, quæ quidem alteri lineæ rectæ ita superstat, ut faciat utrobique angulos æquales, neque magis in unam partem, quam in alteram inclinet. Ex quo fit, omnes angulos rectos æquales inter se esse, cum semper sit eadem inclinatio, quamvis lineæ sint inæquales interdu n.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XIII. XI

Et si in duas rectas lineas altera recta incidens, internos ad easdemque partes angulos duobus rectis minores faciat, duæ illæ rectæ lineæ in infinitum productæ sibi mutuo incident ad eas partes, ubi sunt anguli duobus rectis minores.

UT si in duas lineas rectas AB, CD, incidens TAB. II. alia recta EF, faciat duos angulos internos, & fig. 12

¶ EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ex eadem parte BEF, DFE, minores duobus rectis, vidit Euclides, illas tandem conuenturas esse ad aliquod punctum unum, versus eam partem, in qua duo anguli minores existunt duobus rectis, ut appositum exemplum commonstrat. Ratio hujus perspicua est, quoniam quando duo anguli interni, & ex eadem parte aequales sunt duobus rectis, dua recta linea in neutram partem coire possunt, sed aequali semper spatio protenduntur, ut in propos. 28. hujus lib. demonstrabitur. Quare si duo anguli interni, & ex eadem parte efficiuntur minores duobus rectis, necesse est ex ea parte dictarum linearum spatium coarctari, ex altera vero magis ac magis dilatari; ideoque eas conuenturas tandem esse aliquando in unum punctum.

XII. AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XIV.

Duæ rectæ lineæ spatium non comprehendunt.

Nullam prorsus habet difficultatem hoc principium.

TAB II
fig. 13.

Si enim dua recta linea AB, & CB, ex una parte B, coeant ad efficiendum angulum, necessario ex altera parte A, & C, semper magis ac magis disjungentur, si producantur, ut in exemplo proposito perspicuum est. Quare ut superficies, spatiumve quodpiam rectilineum ex omni parte concludatur, duobus rectis lineis tertia quadam adjungenda est.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XV.

[Si æqualibus inæqualia adjiciantur, erit totorum excessus, adjunctorum excessui æqualis.]

HOC, & sequens pronunciatum desumpsit Proclus ex Pappo. Aequalibus inque quantitatibus,
AB,

AB, CD, addantur inæquales BE, DF, sitque TAB. II. BE, major quam DF. Et ex BE, auferatur BG, æqualis ipsi DF, ut sit GE, excessus, quo quantitas addita BE, superat quantitatem additam DF. Quoniam igitur æqualibus AB, CD, addita sunt æqualia BG, DF, æ erunt tota AG, CF, æqualia. Quare constat, totam quantitatem AE, superare totam CF, eodem excessu GE, quo magnitudo DF, adjuncta, à magnitudine adjuncta BE, superatur. Quod est propositum.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XVI.

[Si inæqualibus æqualia adjungantur, erit totorum excessus, excessui eorum, quo à principio erant, æqualis.]

IN eadem figura, inæqualibus quantitatibus BE, DF, addantur æquales AB, CD. Et ex majore BE, auferatur BG, æqualis ipsi DF, ut GE, sit excessus; quo quantitas BE, superat DF, Quoniam igitur æqualibus BG, DF, addita sunt æqualia AB, CD, æ erunt tota AG, CF, æqualia. Quamobrem tota quantitas AE, superabit totam CF; eodem excessu GE, quo major quantitas proposita BE, minorem DF, superat. Quod est propositum.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XVII.

[Si ab æqualibus inæqualia demantur, erit residuorum excessus, excessui ablatorum æqualis.]

AB æqualibus AB, CD, auferantur inæqualia BE, DF. Sitque EG, excessus, quo quantitas BE, superat quantitatem DF; ita ut BG, æqualis sit ipsi DF. Quia igitur ab æqualibus AB, CD, ablata sunt æqualia BG, DF, b remanebunt AG,

18 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

AG, CF, aequalia. Perspicuum ergo est, residuum AE, superari à residuo CF, eodem excessu EG, quo magnitudo ablata BE, ablatam magnitudinem DF, superat. Quod est propositum.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XVIII.

[Si ab inæqualibus æqualia demantur, erit residuorum excessus excessui totorum æqualis.]

TAB. II.
fig. 16.

A^B *inaequalibus AB, CD, auferantur aequalia AE, CF. Sitque BG, excessus, quo tota quantitas AB, superat totam quantitatem CD, ita ut AG, æqualis sit ipsi CD. Quoniam igitur ab æqualibus AG, CD, ablata sunt aequalia AE, CF, c remanebunt EG, FD, aequalia. Quare residuum EB, superabis residuum FD, eodem excessu BG, quo tota quantitas AB, superat totam quantitatem CD. Quod est propositum.*

c 3. pron.

In his quoque quatuor proxime positis pronuntiatis, nomine quantitatum æqualium intelligenda est una etiam sola quantitas multis communis.

AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XIX.

[Omne totum æquale est omnibus suis partibus simul sumptis.]

Q*uoniam omnes partes simul sumptæ constituunt totum, cujus sunt partes, manifesta est veritas hujus axiomatis.*





AXIOMA VEL PRONUNCIATUM. XX.


[Si totum totius est duplum, & ablatum ablati; erit & reliquum reliqui duplum.]

U*t quia totus numerus 20. duplus est totius numeri 10; Et ablati ex illo 6. ablati ex hoc 3. propterea reliquus illius 14. duplus est etiam reliqui hujus 7.*

P R O.

TAB. II.







PROBLEMA I.

PROPOSITIO I.

Super data recta linea terminata triangulum æquilaterum constituere.



It igitur proposita recta linea terminata *TAB. III.*
 AB, super quam constituere jubemur *fig. 1.*
 triangulum æquilaterum. Centro A, *a 1. p. 1.*
 & intervallo rectae AB, describatur *a 2. p. 1.*
 circulus CBD: Item centro B, & in-
 tervallo ejusdem rectae BA, alius circulus descri-
 batur CAD, secans priorem in punctis C, & D.
 Ex quorum utrovis, nempe ex C, ducantur *a 1. p. 1.*
 duae rectae lineae CA, CB, ad puncta A, & B;
 Eritque super rectam AB, constitutum triangulum
 ABC, hoc est, figura rectilinea contenta tribus
 rectis lineis. Dico, hoc triangulum ita con-
 structum necessario esse æquilaterum. Quoniam
 rectae AB, AC, ducuntur ex centro A, ad cir-
 cumferentiam circuli CBD, erit recta AC, rectae *b 1. p. 1.*
 AB, aequalis: Rursus, quia rectae BC, BA, du-
 cuntur ex centro B, ad circumferentiam circuli
 CAD, erit recta BC, rectae BA, aequalis. Tam
 igitur AC, quam BC, aequalis est rectae AB, *c 1. p. 1.*
 Quare & AC, BC, inter se aequales erunt, atque
 idcirco triangulum ABC, erit æquilaterum. Super
 data ergo recta linea terminata, &c. Quod fa-
 ciendum erat. *d 1. p. 1.*

PRO-

56 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ij.

PROBLEMA 2. PROPOSITIO. 2.

Ad datum punctum, datæ rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere.

TAB. III. **Fig. 2. 3.** Sit punctum datum A, & data recta linea BC, cui aliam rectam æqualem ponere oportet ad punctum A. Facto alterutro extremo lineæ BC, nempe C, centro, a describatur circulus BE, intervallo rectæ BC. Et ex A, ad centrum C, b 1. per. b recta ducatur AC; (nisi punctum A, intra rectam BC, fuerit: ut in figura 3. Tunc enim pro linea ducta sumetur AC,) Super recta vero AC, c 1. primi. c construatur triangulum æquilaterum ACD, sursum, aut deorsum versus, ut libuerit; cuius duo latera modo constituta DA, DC, versus rectam AC, d 2. per. d extendantur; DC, quidem oppositum puncto dato A, usque ad circumferentiam in E; DA, vero oppositum centro C, quantum libet in F. Deinde centro D, intervallo vero rectæ DE, e 3. per. e per C, centrum transeuntis, e alter circulus describatur EG, secans rectam DF, in G. Dico rectam AG, quæ posita est ad punctum datum A, æqualem esse datæ rectæ BC. Quoniam DE, DG, ductæ sunt ex centro D, ad circumferentiam EG, f ipsæ inter se æquales erunt: Ablatis igitur DA, DC, æqualibus lateribus trianguli æquilateri ACD, g remanebit AG, æqualis rectæ CE. Sed eidem CE, a æqualis est recta BC. (cum ambæ rectæ CB, CE, cadent ex centro C, ad circumferentiam BE.) Igitur rectæ AG, BC, quandoquidem utraque æqualis est, ostensa rectæ CE, inter se b æquales erunt. Ad datum igitur punctum, &c. quod erat faciendum.

Quod si punctum datum fuerit in extremo datæ lineæ, quale est C, facile absolvetur problema. Si enim centro C, & intervallo CB, c 3. per. c describatur circulus, ad cuius circumferentiam d 1. per. d recta d ducatur utcumque; CE, erit hæc posita ad punctum datum C, e æqualis datæ rectæ BC, cum utraque & BC, & CE, ex eodem centro egrediatur ad circumferentiam BE.

PRO.

PROBL. 3. PROPOS. 3. ij.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus, de majore æqualem minori rectam lineam detrhere.

Sint duæ rectæ inæquales A , minor, & BC , *TAB. III.*
 major, oporteatque ex majore BC , detrhere *fig. 4.*
 lineam æqualem minori A . Ad alterutrum extre-
 morum lineæ majoris BC , nempe ad punctum B , *a 2. prim.*
 ponatur aliqua linea, quæ sit BD , æqualis
 minori A . Deinde centro B , intervallo autem *b 3. p.*
 BD , circulus b describatur secans BC , in E .
 Dico BE , detractam esse æqualem ipsi A . Quo-
 niam BE , *c 15. def.*
 c æqualis est rectæ BD , & eidem,
 BD , æqualis est recta A , per constructionem;
 d erunt A , & BE , inter se æquales. Duabus *d 1. prop.*
 igitur datis rectis &c. quod erat faciendum.

Quod si duæ rectæ datæ conjungantur in uno extremo, quales sunt BD , & BC , conjunctæ in extremo utriusque B ; describendus erit circulus ex B , ad intervallum minoris BD . Hic enim auferet BE , æqualem ipsi BD , ut constat ex definitione circuli.

THEOREMA I. PROPOS. 4. ij.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, utrumque utriusque; habeant vero & angulum angulo æqualem sub æqualibus rectis lineis contentum: Et basim basi æqualem habebunt: eritque triangulum triangulo æquale; ac reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, uterque utriusque, sub quibus æqualia latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC , DEF ; & unius utrum- *TAB. III.*
 que latus AB , AC , æquale sit alterius utriusque *fig. 1.*
 lateri

32 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

lateri DE, DF, hoc est, AB, ipsi DE, & AC, ipsi DF, angulusque A, contentus lateribus AB, AC, æqualis angulo D, contento lateribus DE, DF. Dico basim BC, æqualem quoque esse basi EF; & triangulum ABC, triangulo DEF; & utrumque angulum B, & C, utrique angulo E, & F, id est, angulos B, & E, qui opponuntur lateribus æqualibus AC, DF, inter se; & angulos C, & F, qui opponuntur æqualibus lateribus AB, DE, inter se quoque esse æquales. Quoniam enim recta AB, rectæ DE, ponitur æqualis, sit, ut si altera alteri superponi intelligatur, collocato puncto A, in puncto D, a ipsæ sibi mutuo congruant, punctumque B, in punctum E, cadat. Neque enim dicere quis poterit, partem rectæ AB, rectæ DE, congruere, & partem non, quia tunc duæ rectæ haberent idem segmentum commune, b quod est impossibile. Quod si quis dicat, posito puncto, A, in D, cadere quidem punctum B, in E, sed rectam AB, cadere vel ad dextram, vel ad sinistram DE, claudent duæ rectæ lineæ superficiem. c quod fieri non potest. Quare recta AB, rectæ DE, congruet, ut dictum est. Cum ergo angulus A, angulo D, ponatur æqualis, d congruet quoque alter alteri, hoc est, recta AC, rectæ DF, congruet, punctumque C, in punctum F, cadet, ob æqualitatem rectarum AC, DF. Basis igitur BC, basi EF, congruet quoque: alias si supra caderet, aut infra, ut efficeretur recta EGF, EHF, clauderent duæ rectæ EF, EGF; vel EF, EHF, superficiem, (negare enim nemo poterit, tam EGF, quam EHF, rectam esse, cum utraque ponatur esse eadem, quæ recta BC.) quod est absurdum. Duæ enim rectæ superficiem e claudere non possunt. Quocirca f basis BC, basi EF, æqualis erit, cum neutra alteram excedat; & triangulum ABC, triangulo DEF; & angulus B, angulo E; & angulus C, angulo F, æqualis. ob eandem causam, existet. Quare si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, &c. Quod demonstrandum erat.

THEOR.

THEOR. 2. PROPOS. 5. 9

Isoſcelium triangulorum, qui ad baſim ſunt, anguli inter ſe ſunt æquales: Et productis æqualibus rectis lineis, qui ſub baſi ſunt, anguli inter ſe æquales erunt.

ſit triangulum Iſoſceles ABC, in quo latera, *TAB. III.*
 AB, AC, inter ſe ſint æqualia. Dico angu- *fig. 6.*
 los ABC, ACB, ſupra baſim BC, æquales inter
 ſe eſſe: Item ſi latera æqualia AB, AC, produ-
 cantur quantum libuerit, uſque ad puncta D, &
 E, angulos quoque DBC, ECB, infra baſim
 eandem BC, eſſe æquales. Ex linea enim AE,
 producta infinite a abſcindatur AF, æqualis ipſi *a 3. prim.*
 AD; & ducantur rectæ BF, CD. Conſide- *b 1. peti.*
 derentur deinde duo triangula ABF, ACD. Quia
 ergo duo latera AB, AF, trianguli ABF,
 æqualia ſunt duobus lateribus AC, AD, trianguli
 ACD, utrumque utrique, nempe AB, ipſi AC,
 ex hypotheſi, & AF, ipſi AD, ex conſtructione;
 angulusque A, contentus lateribus AB, AF,
 æqualis eſt angulo A, contento lateribus AC,
 AD, immo angulus A, communis eſt utrique
 triangulo: c Erit baſis BF, æqualis baſi CD, *c 4. prim.*
 & angulus F, angulo D, & angulus ABF, an-
 gulo, ACD; cum & priores duo, & posteriores
 opponantur æqualibus lateribus in dictis triangu-
 lis, ut patet: Rurſus conſiderentur duo triangula
 BDC, CFB. Quoniam vero rectæ AD, AF,
 æquales ſunt, per conſtructionem, ſit ut, ſi au-
 ferantur ex ipſis æquales AB, AC, d & reliquæ *d 3. prim.*
 BD, & CF, ſint æquales. Quare duo latera
 BD, DC, trianguli BDC, æqualia ſunt duobus
 lateribus CF, FB, trianguli CFB, utrumque
 utrique, videlicet BD, ipſi CF, & DC, ipſi FB,
 ut probatum eſt: Sunt autem & anguli D, &
 F, contenti dictis lateribus æqualibus æquales,
 ut oſtenſum etiam fuit. Igitur erit angulus
 C DBC,

24 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

64. *primi*: e DBC, angulo FCB, æqualis; & angulus BCD, angulo CBF. Tam enim priores duo, quam posteriores, æqualibus opponuntur lateribus, existuntque supra communem basim BC, utriusque trianguli BDC, CFB. Quod si ex totis angulis æqualibus ABF, ACD, (quos æquales esse jam demonstravimus in prioribus triangulis) detrahantur anguli æquales CBF, BCD, (quos itidem in posterioribus triangulis modo probavimus esse æquales) remanebunt anguli ABC, ACB, supra basim BC, æquales: Ostensum est autem in posterioribus triangulis, & angulos DBC, FCB, qui quidem sunt infra eandem basim BC, esse æquales. Igitur & anguli supra basim inter se, & anguli infra eandem inter se sunt æquales; ac propterea Isoscelium triangulorum, qui ad basim sunt anguli, &c. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M.

Ex hac propositione quinta liquet, omne triangulum æquilaterum esse æquiangulum quoque: Hoc est, tres angulos cujuslibet trianguli æquilateri esse inter se æquales. Sit enim triangulum æquilaterum ABC. Quoniam igitur duo latera AB, AC, sunt æqualia, & erunt duo anguli B, & C, æquales. Item quia duo latera AB, BC, sunt æqualia, erunt & anguli C, & A, æquales. Quare omnes tres A, B, & C, æquales erunt. Quod ostendendum erat.

vi. THEOR. 3. PROPOS. 6.

Si trianguli duo anguli æquales inter se fuerint: & sub æqualibus angulis subtensa latera æqualia inter se erunt.

TAB. III. *fg. 8.* IN triangulo ABC, sint duo anguli ABC, ACB, super latus BC, æquales. Dico duo latera illis opposita AB, AC, esse quoque æqualia. Si enim non credantur æqualia, existentibus nihilominus angulis dictis æqualibus, erit alterum majus

jus altero ; sit igitur AB, majus quam AC, si
 fieri potest : Et ex AB, b abscindatur in D, recta b 3. primi
 BD, æqualis rectæ AC, (quæ minor dicitur esse
 quam AB,) ducaturque recta CD. Considerentur
 jam duo triangula ACB, DBC. In quibus cum
 duolatera AC, CB, trianguli ACB, æqualia sint
 duobus lateribus DB, BC, trianguli DBC, utrum-
 que utriusque, nempe AC, ipsi DB, (abscidimus
 enim ex AB, ipsi AC, concessu adversarij, æqua-
 lem DB,) & CB, ipsi BC, cum sit unum & idem ;
 Sint autem & anguli ACB, DBC, contenti dictis
 lateribus æquales, per hypothesin : c Erunt trian- c x. primi
 gula ACB, DBC, æqualia, totum & pars, quod
 fieri non potest d. Non igitur erunt latera AB, d 9. prop.
 AC, inæqualia, si anguli B, & C, super latus
 BC, æquales sunt, ne totum parti æquale esse
 concedamus : sed æqualia existent. Quare si tri-
 anguli, duo anguli, &c. Quod demonstrandum erat.

COROLLARIUM.

Sequitur ex hac propositione, omne triangulum æqui-
 angulum, id est, cujus omnes anguli sunt æquales, esse
 æquilaterum. Quod quidem conversum est corollarij
 quintæ propositionis, ut liquet. Sint enim trianguli TAB. III.
 ABC, tres anguli æquales. Dico ipsum esse æquilaterum. fg. 7.
 Cum enim duo anguli B, & C, sint æquales, a erunt a 6. primi.
 latera AB, AC, æqualia. Rursus cum duo anguli A,
 & B, sint æquales, erunt quoque latera AC, BC, æqua-
 lia, & idcirco omnia tria latera AB, BC, AC, æqualia.
 Quod ostendendum erat.

THEOR. 4. PROPOS. 7. vii.

Super eadem recta linea, duabus eisdem
 rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales,
 utraque utriusque, non constituentur, ad aliud
 atque aliud punctum : ad easdem partes, eos-
 demque terminos cum duabus initio ductis rectis
 lineis habentes.

Super recta AB, constituentur ad punctum TAB. III.
 quodvis C, duæ rectæ lineæ AC, BC. Dico fg. 9. 10.
 C a super 11, 12 13.

- super eandem rectam AB, versus partem eandem C, non posse ad aliud punctum, ut ad D, consistui duas alias rectas lineas, quæ sint æquales lineis AC, BC, utraque utrique, nempe AC, ipsi AD, quæ eundem habent terminem A; & BC, ipsi BD, quæ eundem etiam terminum possident B. Sint enim, si fieri potest, rectæ AC, AD, inter se, & rectæ BC, BD, inter se etiam æquales. Aut igitur punctum D, erit in alterutra rectarum AC, BC, ita ut recta AD, in ipsam rectam AC, vel, BD, in ipsam BC, cadat; aut intra triangulum ABC; aut extra. Sit primo punctum D, in altera rectarum AC, BC, nempe in AC, ut AD, sit pars ipsius AC. Quoniam igitur rectæ AC, AD, eundem terminum A, habentes dicuntur æquales, erit pars AD, toti AC, æqualis. Quod fieri non potest. Sit deinde punctum D, intra triangulum ABC; & ducta recta CD, producatur rectæ BC, BD, utque ad E, & F. Quoniam igitur in triangulo ACD, ponuntur latera AC, AD, æqualia, erunt anguli ACD, ADC, super basim CD, æquales; *a* Est autem angulus ACD, minor angulo DCE; nempe pars toto: Igitur & angulus ADC, minor erit eodem angulo DCE. Quare angulus CDF, pars ipsius ADC, multo minor erit eodem angulo DCE. Rursum, quia in triangulo BCD, latera BC, BD, ponuntur æqualia, erunt anguli CDF, DCE, sub basi CD, æquales. Ostensum autem fuit, quod idem angulus CDF, multo sit minor angulo DCE. Idem ergo Angulus CDF, & minor est angulo DCE, & eidem æqualis, quod est absurdum. Sit postremo punctum D, extra triangulum ABC.
- TAB. III.** Aut igitur in tali erit loco, ut una linea super alteram cadat, dummodo loco D, intelligas C, & loco C, ipsum D; ex quo rursus colligetur pars æqualis toti, quod est absurdum. Aut in tali erit loco, ut posteriores duæ lineæ ambiant priores duas, si modo loco D, iterum intelligas C, & D, loco C. Quo posito, in idem absurdum incidemus, nempe angulum DCF, & minorem

rem esse angulo CDE, & eidem æqualem, ut perspicuum est. Aut denique punctum D, ita erit extra triangulum ABC, ut altera linearum posteriorum, nempe AD, fecet alteram priorum, ut ipsam BC. Ducta igitur recta CD, cum in triangulo ACD, latera AC, AD, ponantur æqualia, & erunt anguli ACD, ADC, supra basim CD, æquales: Ac proinde & cum angulus ADC, minor sit angulo BDC, pars toto, erit & angulus ACD, minor eodem angulo BDC. Quare multo minor erit angulus BCD, pars anguli ACD, angulo eodem BDC. Rursum cum in triangulo BCD, latera BC, BD, ponantur æqualia, & erunt anguli BCD, BDC, super basim CD, æquales: Est autem jam ostensum, angulum BCD, multo esse minorem angulo BDC. Idem igitur angulus BCD, & minor est angulo BDC, & eidem æqualis, quod est absurdum. Non ergo æquales sunt inter se AC, AD, nec inter se quoque BC, BD. Quare super eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis. &c. Quod erat demonstrandum.

TAB. III.
fig. 13.

d 5. prim.
e 9. prim.

a 5. prim.

THEOR. 5. PROPOS. 8. viij.

Si duo triangula duo latera habuerint duobus lateribus, utrumque utrique, æqualia, habuerint vero & basim basi æqualem: Angulum quoque sub æqualibus rectis lineis contentum angulo æqualem habebunt.

Sint duo latera AB, AC, trianguli ABC, duobus lateribus DE, DF, trianguli DEF, æqualia, utrumque utrique, nempe AB, ipsi DE, & AC, ipsi DF; sit autem & basim BC, basi EF, æqualis. Dico angulum A, æqualem esse angulo D, quorum videlicet uterque dictis lateribus continetur. Nam si mente intelligatur basim BC, superponi basi EF, & neutra excedet alteram, sed punctum B, congruet puncto E, & punctum C, puncto

TAB. III.
fig. 14.

a 8. prim.

38 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

puncto F, cum hæc bases ponantur æquales inter se. Deinde si triangulum ABC, cogitetur cadere super triangulum DEF, cadet punctum A, aut in ipsum punctum D, aut alio. Si punctum A, in ipsum punctum D, cadet, congruent sibi mutuo triangulorum latera, cum ponantur æqualia; Ac propterea *a* angulus A, æqualis erit Angulo D, cum neuter alterum excedat. Quod si punctum A, aliud dicatur cadere, ut ad G, quomodocumque id contingat, hoc est, sive in latus ED, sive intra triangulum EDF, sive extra, ut in figuris apparet; erit perpetuo EG, (quæ eadem est, quæ BA,) æqualis ipsi ED; & FG, (quæ eadem est, quæ CA,) æqualis ipsi FD, propterea quod latera unius trianguli æqualia ponuntur lateribus alterius. Hoc *b* 7. *primi*. autem fieri non posse, jam dudum *b* demonstratum est, cum tam rectæ EG, ED, terminum eundem E, quam rectæ FG, FD, eundem linitem F, possideant. Non igitur punctum A, cadet aliud quam in punctum D: ac propterea angulus A, angulo D, æqualis erit. Quare si duo triangula duo latera habuerint duobus lateribus, &c. Quod erat demonstrandum.

S C H O L I U M.

Si duo triangula bases habuerint æquales, & angulos super bases constitutos æquales, utrumque utrique: Habebunt quoque reliqua latera æqualia, utrumque utrique, quæ videlicet æqualibus angulis subtendantur, angulosque reliquos hisce lateribus inclusos æquales.

TAB. III. *Si enim basis BC, æqualis basi EF, & angulus*
fig. 14. B, angulo E, angulusque C, angulo DFE. Dico
latus quoque AB, lateri DE, & latus AC, lateri
DF, æquale esse, angulumque A, angulo D. Nam
a 8. *primi*. *si basis basi superponatur, æ congruent sibi mutuo ex-*
trima eorum, nec non & lineæ angulorum æqualium.
Quare

Quare omnia sibi congruent, proptereaque omnia inter sese equalia erunt.

COROLLARIUM.

Porro ex antecedente hujus octavæ propositionis non solum colligi potest, angulos lateribus æqualibus contentos æquales esse, verum etiam reliquos angulos, qui ad bases constituuntur, utrumque utrique, ut angulum B, angulo E, & angulum C, angulo F, immo totum triangulum toti triangulo, ut constat ex eadem superpositione unius trianguli super alterum. Nam sibi mutuo congruent & dicti anguli, & tota triangula, ut perspicuum est.

PROBL. 4. PROPOS. 9. ixi

Datum angulum rectilineum bifariam secare.

Sit dividendus rectilineus angulus BAC, bifariam, hoc est, in duos angulos æquales. In recta AB, sumatur quodcunque punctum D, & rectæ AD, a secetur ex AC, recta AE, æqualis, ducaturque recta DE. Deinde super DE, b constituatur triangulum æquilaterum DFE, & ducatur recta AF, dividens angulum BAC, in angulos BAF, CAF. Dico hos angulos inter se esse æquales. Cum enim latera DA, AF, trianguli DAF, æqualia sint lateribus EA, AF, trianguli EAF, utrumque utrique, quod DA, ipsi EA, per constructionem, sit æquale, & AF, commune; Sit autem & basis DF, basi EF, æqualis, propterea quod triangulum DFE, constructum est æquilaterum: c Erit angulus DAF, angulo EAF, æqualis, ideoque angulus BAC, divisus bifariam, quod erat faciendum.

PROBL. 5. PROPOS. 10.

Datam rectam lineam finitam bifariam secare.






TAB. IV. Sit recta finita AB, dividenda bifariam, id est
fig. 1. in duas partes æquales. *a* Describatur super
a 1. primi. AB, triangulum æquilaterum ABC, cujus angu-
b 9. primi. lus C, per rectam CD, *b* dividatur bifariam,
 rectaque CD, rectam AB, secet in D. Dico
 rectam AB, bifariam esse divisam in D. Quoniam
 duo latera AC, CD, trianguli ACD, æqualia
 sunt duobus lateribus BC, CD, trianguli BCD,
 utrumque utrique, nempe AC, ipsi BC, cum sint
 ambo latera trianguli æquilateri, & CD, est com-
 mune; Est autem & angulus ACD, angulo
c 4. primi. BCD, æqualis, per constructionem: *c* Erit basis
 AD, basi BD, æqualis. Datam ergo rectam
 AB, bifariam secimus in D, quod facere oportebat.

PROBL. 6. PROPOS. 11.

Data recta linea, à puncto in ea dato, rectam lineam ad angulos rectos excitare.

TAB. IV. Recta linea data sit AB; & in ea punctum C,
fig. 2. à quo jubemur erigere super AB, lineam ad
 Angulos rectos, seu perpendicularem. A puncto
a 3. primi. C, sumatur recta CD, *a* cui æqualis auferatur
b 1. primi. CE. Deinde super DE, *b* constituatur triangulum
 æquilaterum DEF, atque ex F, ad C, ducatur
 recta FC, quam dico esse perpendicularem ad
 AB. Quoniam latera DC, CF, trianguli DCF,
 æqualia sunt lateribus EC, CF, trianguli ECF,
 utrumque utrique, nempe DC, ipsi EC, per con-
 structionem, & CF, commune; Est vero & ba-
 sis DF, basi EF, æqualis, ob triangulum æqui-
fig. 8. primi. laterum: *c* Erunt anguli ad C, contenti dictis
@ 10. def. lateribus, æquales. *d* Quare dicetur uterque
 rectus,

TAB. III.





LIBER PRIMUS. 41

rectus, atque adeo FC, recta, ad AB, perpendicularis. Data igitur recta linea à puncto in ea dato, &c. Quod faciendum erat.

PROBL. 7. PROPOS. 12. 42

Super datam rectam lineam infinitam, à dato puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam deducere.

Sit recta AB, interminatae quantitatis, & extra ipsam punctum C, à quo oporteat lineam perpendicularem deducere ad rectam AB. Centro C, intervallo vero quolibet circulus describatur secans AB, in D, & E, (quoniam intervallum assumptum tantum esse debet, ut transcendat rectam AB; alias eam non secaret.) Divisa autem recta DE, bifariam in F, ducatur recta CF, quam dico perpendicularem esse ad AB. Si enim ducantur CD, CE, erunt duo latera DF, FC, trianguli DFC, aequalia duobus lateribus EF, FC, trianguli EFC, utrumque utriusque per constructionem; est autem & basis CD, basi CE, aequalis, cum hæ sint ex centro C, ad circumferentiam. Quare b erit angulus DFC, angulo EFC, aequalis, & propterea uterque rectus. Ducta est igitur CF, perpendicularis, quod faciendum erat.

TAB. IV.
fig. 3.
e 3. perib.
a 10. prim.
d 15. def.
b 8. prim.
c 10. def.

THEOR. 6. PROPOS. 13. 43

Cum recta linea super rectam consistentem lineam angulos facit, aut duos rectos, aut duobus rectis aequales efficiet.

Recta linea AB, consistentem super rectam DC, faciat duos angulos ABC, ABD. Si igitur AB, fuerit perpendicularis ad DC, erunt dicti anguli duo recti. Si vero AB, non fuerit perpendicularis, faciet unum quidem angulum obtusum,

TAB. IV.
fig. 4.
c 10. def.

C s sum,

4. EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

sum, alterum vero acutum. Dico igitur ipsos
 duobus esse rectis æquales. *d* Educatur enim BE,
 ex B, perpendicularis ad CD, ut sint duo anguli
 EBC, EBD, recti. Quoniam vero angulus rectus
 EBD, *e* æqualis est duobus DBA, ABE; ferunt,
 appposito communi angulo recto EBC, duo recti
 EBD, EBC, tribus angulis DBA, ABE, EBC,
 æquales. Rursus quia *g* angulus ABC, duobus
 angulis ABE, EBC, æqualis est; *a* erunt, appo-
 sito communi angulo ABD, duo anguli ABC,
 ABD, tribus angulis DBA, ABE, EBC, æqua-
 les. Sed eisdem his tribus ostendimus, æquales
 etiam esse duos rectos EBD, EBC; quæ autem
 eidem æqualia, *b* inter se sunt æqualia. Duo
 igitur anguli ABC, ABD, æquales sunt duobus
 rectis EBD, EBC. Cum ergo recta linea supra
 rectam consistens lineam, &c. Quod ostendere
 oportebat.

xiv. THEOR. 7. PROPOS. 14.

Si ad aliquam rectam lineam, atque ad
 ejus punctum, duæ rectæ lineæ non ad ean-
 dem partes ductæ eos, qui sunt deinceps,
 angulos duobus rectis æquales fecerint; in
 directum erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.

TAB. IV. AD punctum C, lineæ rectæ AB, in diversas
fig. 5. partes eductæ sint duæ rectæ CD, CE, fa-
 cientes cum AB, duos angulos ACD, ACE,
 vel rectos, vel duobus rectis æquales. Dico ip-
 sas CD, CE, inter se esse constitutas in di-
 rectum, ita ut DCE, sit una linea recta. Si enim
 non est recta DCE; producta DC, ad partes C,
 in directum, & continuum, cadet aut supra CE,
 ut sit recta DCF, aut infra CE, ut sit recta
 DCG. Si cadit supra, cum AC, consistat super
 rectam DCF, *a* sicut duo anguli ACD, ACF,
 duobus rectis æquales; Ponuntur autem & duo
 anguli ACD, ACE, æquales duobus rectis; *b* &
 omnes

omnes recti sunt inter se æquales. Quare duo anguli ACD, ACF, duobus angulis ACD, ACE, erunt æquales, ablato igitur communi angulo ACD, *c* remanebunt anguli ACF, ACE, inter se æquales, pars & totum, *d* quod est absurdum. Non igitur recta DC, producta cadet supra CE; Sed neque infra cadet; Eadem enim ratione probarentur anguli ACE, ACG, æquales. Igitur DC, producta eadem efficietur, quæ CE; proptereaque, si ad aliquam rectam lineam, atque ad ejus punctum, &c. Quod demonstrandum erat.

THEOR. 8. PROPOS. 15. xvj

Si duæ rectæ lineæ se mutuo secuerint, angulos ad verticem æquales inter se efficiant.

SEcent se duæ rectæ AB, CD, in puncto E, utcunque. Dico angulos, quos faciunt ad verticem E, inter se esse æquales, angulum videlicet AED, angulo BEC, & angulum AEC, angulo BED. Quoniam recta DE, consistit super rectam AB, *b* erunt duo anguli AED, DEB, æquales duobus rectis. Rursus quia recta BE, super rectam CD, consistit, erunt eadem ratione duo anguli CEB, BED, duobus rectis æquales. Cum igitur omnes recti anguli inter se sint æquales; erunt duo anguli AED, DEB, duobus angulis DEB, BEC, æquales. Dempto igitur communi angulo DEB, *d* remanebit angulus AED, angulo BEC, æqualis. Eadem ratione confirmabitur, angulos AEC, BED, inter se æquales esse. Nam duo anguli AEC, CEB, *e* qui duobus sunt rectis æquales, æquales erunt duobus quoque angulis DEB, BEC, qui duobus rectis sunt æquales. Ablato igitur angulo communi BEC, *f* remanebunt anguli AEC, BED, æquales inter se. Si igitur duæ rectæ lineæ se mutuo secuerint, &c. Quod ostendere oportebat.

44 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

COROLLARIUM. I.

Euclides colligit ex demonstratione hujus theorematis, (ex sententia Præcti, quoniam alia exemplaria hoc corollarium non habent) duas lineas rectas se mutuo secantes, efficere ad punctum sectionis quatuor angulos, quatuor rectis angulis æquales. Nam in demonstratione ostensum fuit, tam duos angulos AED, DEB, quam duos AEC, CEB, duobus esse rectis æquales, per 13. propos. Omnes igitur quatuor anguli ad E, constituti æquipollent bis duobus rectis angulis. Quare quatuor rectis æquales existunt.

COROLLARIUM. II.

Eadem ratione colligemus, omnes angulos circa unum & idem punctum constitutos, quotcumque fuerint, quatuor duntaxat rectis angulis æquales esse. Si enim ex E, aliz lineæ quotlibet educantur, dividuntur solummodo illi quatuor anguli ad E, constituti, in plurimas partes, & que omnes simul sumptæ totis suis adæquantur. Cum ergo illi quatuor anguli æquales sint quatuor rectis, ex 1. corollario, erunt quoque omnes alii simul sumpti quatuor tantum rectis æquales. Ex quo perspicuum est, omne spatium punctum aliquod in plano circumstant, æquivalere quatuor rectis angulis, ut multi auctores asserunt: quia omnes anguli, qui circa illud punctum constitui possunt, quatuor sunt rectis angulis æquales. Simili modo constat, quotlibet lineas rectas se invicem secantes, facere ad punctum sectionis angulos æquales quatuor rectis.

EX PROCLO.

Si ad aliquam rectam lineam, ad ejusque finem, dua recta lineæ non ad easdem partes sumptæ, angulos ad verticem æquales fecerint; ipsa recta lineæ in directum sibi invicem erunt.

TAB. IV. fig. 6. *Ex puncto E, recta AB, in diversa partes extendantur dua rectæ ED, EC, facientes angulos AED,*

LIBER PRIMUS: 49.

AED, BEC, inter se aequales: Vol etiam duas AEC, BED. Dico duas EC, ED, efficere unam lineam rectam. Quoniam eorum angulus AED, aequalis est angulo BEC; addito communi angulo BED, b 2. prim
angulis CEB, BED, aequales: Sed c anguli AED, c 13. prim
DEB, sunt aequales duobus rectis. Igitur & duo CEB, BED, duobus erunt rectis aequales. Quamobrem EC, ED, a erunt linea una recta. Hoc a 14. prim
autem, ut vides, conversum est propositionis decimaquinta.

THEOR. 9. PROPOS. 16. xvj:

Cujuscunque trianguli uno latere producto, externus angulus utrolibet interno, & opposito, major est.

TRIANGULI ABC, latus BA, producat ad D. TAB. IV. Dico angulum externum DAC, majorem esse interno, & opposito ACB, itemque majorem interno, & opposito ABC. Dividatur enim AC, bifariam in E; & ex B, per E, extendatur recta BEF, ita ut EF, b absissa sit aequalis rectae EB; ducaturque recta FA. Quoniam igitur latera CE, EB, trianguli CEB, aequalia sunt lateribus AE, EF, trianguli AEF, utrumque utriusque, per constructionem; Sunt autem & Anguli ad E, dictis lateribus comprehensi, e inter se aequales, cum sint circa verticem E, & oppositi: Erit a basis CB, aequalis basi AF, & angulus ECB, angulo EAF; Est autem angulus DAC, externus major angulo EAF, totum videlicet parte. Igitur & externus angulus DAC, major erit interno, & opposito angulo ACB. Quod si latus CA, producat ad G; & AB, dividatur bifariam in H; extendaturque recta CHI, ut HI, aequalis sit rectae HC, & ducatur recta IA: demonstrabitur eadem prorsus ratione, angulum externum GAB, majorem esse interno angulo, & opposito ABC; Est autem e angulus DAC, c 15. prim angulo

46 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

angulo GAB, æqualis, cum lineæ BD, CG, se mutuo fecerint in A. Igitur & angulus DAC, major erit interno & opposito angulo ABC. Est autem idem angulus DAC, major quoque ostensus angulo interno & opposito ACB. Cujuscunque ergo trianguli uno latere producto, &c. Quod demonstrandum erat.

xvij. THEOR. 10. PROPOS. 17.

Cujuscunque trianguli duo anguli duobus rectis sunt minores, omnifariam sumpti.

TAB. IV. fig. 8. Sit triangulum ABC; Dico duos angulos ABC, & ACB, minores esse duobus rectis; Item duos CBA, & CAB; Itemque duos BAC, & BCA. Producantur enim duo quævis latera, nempe CB, CA, ad D, & E. Quoniam igitur *d* 16. *primi* angulus ABD, externus major est interno & opposito angulo ACB; si addatur communis *e* 4. *pron.* angulus ABC, *e* erunt duo anguli ABD, ABC, majores duobus angulis ABC, ACB: *f* Sed *f* 13. *primi* ABD, ABC, æquales sunt duobus rectis. Igitur ABC, ACB, minores sunt duobus rectis. Eadem ratione erunt anguli CBA, & CAB, minores duobus rectis. Nam cum angulus externus ABD, *g* 16. *primi* *g* major sit angulo CAB, interno, *h* 4. *pron.* & opposito; *b* erunt, appposito communi angulo ABC, duo anguli ABD, ABC, majores duobus *i* 13. *primi* angulis CAB, CBA. Cum ergo *i* duo illi duobus rectis sint æquales, erunt hi alii duo duobus rectis minores. Non secus ostendemus, duos BAC, BCA, duobus esse rectis minores. *m* 16. *primi* Cum enim angulus externus BAE, *m* major sit interno & opposito angulo BCA; si apponatur *n* 4. *pron.* communis angulus BAC, *n* erunt duo anguli BAE, BAC, duobus angulis BCA, BAC, *o* 13. *primi* majores: ac proinde cum illi duo *o* sint duobus rectis æquales, erunt duo hi minores duobus rectis. Cujusque igitur trianguli, &c. Quod demonstrandum erat.

EX PROCLO.

Hinc perspicuum est, ab eodem puncto ad eandem TAB. IV. rectam lineam non posse deduci plures lineas perpen- fig. 11. diculares, quam unam. Si enim fieri potest, ducantur ex A, ad rectam BC, duae perpendiculares AB, AC. Erunt igitur in triangulo ABC, duo anguli interni B, & C, duobus rectis aequales, cum sint duo recti, quod est absurdum. a Saut 217. primi enim quilibet duo anguli in triangulo quocunque ostensit minores duobus rectis. Non ergo plures perpendiculares, quam una, ex A, ad BC, deduci possunt. Quod est propositum.

COROLLARIUM I.

Constat etiam ex his, in omni triangulo, cujus unus angulus fuerit rectus, vel obtusus, reliquos esse acutos.

Cum enim per hanc propos. duo quilibet anguli sint duobus rectis minores, necesse est, si unus fuerit rectus, vel obtusus, quemcunque reliquorum esse acutum, & duos angulos in triangulo rectos, aut duobus rectis majores esse fateamur.

COROLLARIUM II.

Sequitur etiam ex hac propos. si linea recta cum alia recta angulos inaequales faciat, unum acutum, & obtusum alterum, lineam perpendicularem ex quovis ejus puncto ad aliam illam rectam demissam cadere ad partes acuti anguli: Faciat enim recta AB, cum recta CD, TAB. IV. angulos inaequales, nempe ABD, acutum, & ABC, fig. 9. obtusum, & mittaturque ex puncto A, quocunque ad CD, perpendicularis AD. Dico AD, cadere ad partes anguli acuti ABD. Nam si non cadit ad partes acuti anguli ABD, cadat si fieri potest, ad partes anguli obtusi ABC. Igitur duo anguli ABC, ACB, obtusus & rectus, in triangulo ABC, majores sunt duobus rectis; sed & duobus rectis sunt minores, quod est absurdum. b 17. primi Non ergo ex A, perpendicularis ad CD, deducta cadit ad partes anguli obtusi. Quare ad partes acuti anguli cadet.

EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

COROLLARIUM. III.

Pari ratione fit ex hac propof. manifestum, omnes angulos trianguli æquilateri, & duos angulos trianguli Isosceles supra basin, esse acutos. Nam *c* cum & quilibet duo in triangulo æquilatero, & duo in Isosceles supra basin sint inter se æquales; *d* sintque simul tam illi duo, quam hi duobus rectis minores: erit quilibet illorum recto minor, hoc est, acutus. Si enim rectus foret; aut obtusus, essent ambo vel duobus rectis æquales, aut majores.

xvii. THEOR. II. PROPOS. 18.

Omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit.

LEMMA IV. IN triangulo ABC, sit latus AC, majus latere AB. Dico angulum ABC, subtensum à majori latere AC, majorem esse angulo ACB, qui à minori latere AB, subtenditur. Nam ex *a 3. primi* AC, *a* auferatur AD, æqualis ipsi AB, & ducatur recta BD. Quoniam igitur duo latera *b 5. primi* AB, AD, æqualia sunt per constructionem, *b* erunt anguli ABD, ADB, æquales: Est autem *c 16. primi* *c* angulus ADB, major angulo ACB. Igitur & angulus ABD, major erit angulo ACB. Quamobrem cum *d* angulus totus ABC, major adhuc sit angulo ABD; erit angulus ABC, multo major angulo ACB. Eadem ratione, si latus AC, majus ponatur latere BC, ostendes angulum ABC, majorem esse angulo BAC; si nimirum ex CA, abscindatur linea æqualis ipsi CB, &c. Quare omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit. Quod demonstrandum erat.

COROLLARIUM.

LEMMA V. Ex hoc sequitur, omnes tres angulos trianguli Scaleni esse inæquales. Sit enim triangulum Scalenum ABC, *fig. 11.* cujus

ejus maximus quidem latus AC, minimum autem BC, & medium locum habens AB. Dico ejusdem omnes angulos inaequales esse. Cum enim latus AC, ponatur majus latere AB, erit per hanc propof. angulus B, angulo C, major. Eadem ratione major erit angulus C, angulo A, quandoquidem & latus AB, latere BC, majus ponitur. Sunt igitur omnes tres anguli inaequales, maximus quidem B, minimus vero A, & C, medium locum inter utrumque tenens.

THEOR. 12. PROPOS. 19.

Omnis trianguli major angulus majori lateri subtenditur.

IN triangulo ABC, angulus B, major fit angulo C. Dico latus AC, subtendens majorem angulum B, majus esse latere AB, quod angulum minorem C, subtendit. Si enim latus AC, majus non est latere AB, erit vel æquale illi, vel minus. Si dicatur AC, æquale esse ipsi AB, erit angulus B, æqualis angulo C; Est autem & major per hypothefin, quod est absurdum. Si vero AC, minus esse dicatur latere AB, erit angulus B, subtensus à minori latere AC, minor angulo C, subtenso à majore latere AB; Ponitur autem major, quod magis est absurdum. Cum igitur AC, latus neque æquale fit lateri AB, neque minus eo, erit majus. Eadem ratione probabitur, latus AC, majus esse latere BC, si angulus B, major esse concedatur angulo A. Omnis ergo trianguli major angulus majori lateri subtenditur; Quod demonstrandum proponebatur.

COROLLARIUM.

Sequitur ex hac propof. omnium rectarum ex quovis puncto ad rectam quamcunque ductarum, eam, quam perpendicularis est, esse minimam. Ducantur enim ex puncto A, ad rectam BC, quotcunque lineæ AD, AE, AF, & alix, quarum AD, sola fit perpendicularis ad BC.

70 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

BC, & nulla alia, cum ex eodem puncto ad eandem rectam sola una perpendicularis duci possit, ut ex Proclo ad propos. 17. demonstravimus. Dico omnium minimam esse AD. Nam in triangulo AED, cum duo anguli
b 17. primi ADE, AED, *b* sint duobus rectis minores, ponaturque
e 19. primi ADE, rectus; erit AED, acutus. Quare *e* majus erit latus AE, latere AD. Eodem modo ostendemus, omnes alias rectas majores esse recta AD, ac proinde perpendicularis AD, omnium erit minima.

THEOR. 13. PROPOS. 20.

Omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora, quomodocunque assumpta.

Tab. 17. Sit triangulum ABC. Dico quælibet ejus duo
Æ. 13. latera, nempe AB, AC, simul majora esse reliquo latere BC. Producatur unum ex illis,
e 3. primi ut CA, usque ad D, *e* sitque recta AD, æqualis alteri lateri non producto AB, & ducatur recta DB. Quoniam igitur duo latera AB, AD,
f 5. primi æqualia inter se sunt, per constructionem, ferunt anguli ABD, ADB, æquales inter se: Est autem
g 9. primi angulus ABD, *g* major angulus CBD. Igitur & angulus CBD, major erit angulo ADB. In triangulo ergo CBD, latus CD, oppositum majori
h 19. primi angulo CBD, *h* majus erit latere BC, quod minori angulo CDB, opponitur. Cum igitur duo latera AB, AC, simul æqualia sint ipsi CD, (si enim æqualibus AB, AD, commune addatur AC,
i 2. primi *i* fient tota æqualia; nimirum linea composita ex AB, AC, & linea composita ex AD, AC,) erunt quoque latera AB, AC, simul majora latere BC. Eodem modo demonstrabitur, quælibet alia duo latera majora esse reliquo. Quare omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora, &c. Quod demonstrandum erat.

THEOR.

THEOR. 14. PROPOS. 21. xxi.

Si super trianguli uno latere, ab extremitatibus duæ rectæ lineæ interius constitutæ fuerint; hæ constitutæ reliquis trianguli duobus lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt.

IN triangulo ABC, super extremitates B, & C, TAB. IV. lateris BC, intra triangulum constituantur duæ rectæ lineæ BD, CD, in puncto D, concurrentes. Dico BD, CD, simul minores esse duobus lateribus BA, CA, simul; At vero angulum BDC, majorem angulo BAC. Producat enim altera linearum interiorum, nempe BD, ad punctum E, lateris CA. Quoniam igitur in triangulo BAE, duo latera BA, AE, *c* majora sunt latere BE, si addatur commune EC, *a* erunt BA, AC, majora, quam BE, EC. Rursus quia in triangulo CED, duo latera CE, ED, *b* majora sunt latere CD, si commune apponatur DB, *c* erunt CE, EB, majora, quam CD, DB. Ostensum vero jam fuit, AB, AC, majora esse, quam BE, EC. Multo igitur majora erunt BA, CA, quam BD, CD, quod primo proponebatur. Præterea, quoniam angulus BDC, *d* major est angulo DEC, externus interno; & angulus DEC, angulo BAC, major quoque est, eandem ob causam. Erit angulus BDC, multo major angulo BAC, quod secundo proponebatur. Si igitur super trianguli uno latere, ab extremitatibus, &c. Quod erat ostendendum.

PROBL. 8. PROPOS. 22. xxij.

Ex tribus rectis lineis, quæ sint tribus datis rectis lineis æquales, triangulum constituere. Oportet autem duas reliqua esse majores

D 2

5^a EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

jores omnifariam sumptas: quoniam uniuscujusque trianguli duo latera omnifariam sumpta reliquo sunt majora.

TAB. IV. **T**res lineæ rectæ datæ sint A, B, & C, quarum quælibet duæ reliquæ sint majores, (Alias ex ipsis non posset constitui triangulum, ut constat ex proposition. 20. in qua ostensum fuit, duo quævis latera trianguli reliquo esse majora.) oporteatque construere triangulum habens tria latera tribus datis lineis æqualia. Ex assumpta recta quavis DE, infinitæ magnitudinis *a* abscindatur recta DF, æqualis rectæ A. Et ex reliqua FE, recta FG, æqualis rectæ B; & ex reliqua GE, recta GH, æqualis rectæ C. Deinde centro F, intervallo vero FD, circulus describatur DIK. Item centro G, intervallo autem GH, alius circulus describatur HIK, qui necessario priorem secabit in punctis I, & K, (cum enim duæ FD, GH, majores ponantur recta FG; si ex FE, sumatur recta FL, æqualis ipsi FD; & ex GD, recta GM, æqualis ipsi GH, cadet punctum M, inter L, & D. Si namque *b* M, caderet in L, punctum, essent GM, FL, hoc est, GH, & FD, æquales rectæ FG: Si vero *c* M, caderet inter G, & L, essent eadem duæ FL, GM, hoc est, DF, GH, minores recta FG, quorum utrumque est contra hypothesein. Id quod ex appositis figuris apparet) ex quorum quolibet, nimirum ex K, ducantur ad puncta, F, G, rectæ KF, KG, factumque erit triangulum FGK, cujus latera dico æqualia esse datis *b* rectis A, B, & C. Cum enim recta FK, *b* æqualis sit rectæ FD, & recta A, per constructionem eidem FD, æqualis; *a* erit latus FK, rectæ A, æquale. Rursus quia GK, æqualis est ipsi GH, & recta C, eidem GH; erit quoque latus GK, rectæ C, æquale: Positum autem fuit per constructionem, reliquum latus FG, reliquæ rectæ B, æquale. Omnia igitur tria latera FK, FG, GK, tribus datis rectis A, B, C, æqualia sunt.

Fig. 3.




Fig. 8.




Fig. 10.




Fig. 14.






Fig. 16.





sunt. Constituumus ergo ex tribus rectis lineis, quæ sunt tribus datis rectis lineis æquales, triangulum: Quod faciendum erat.

PROBL. 9. PROPOS. 23. xxij.

Ad datam rectam lineam, datumque in ea punctum, dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum constituere.

DATA recta sit AB, datumque in ea punctum *TAB. V.*
 C, & datus angulus DEF. Oportet igitur *fig. 2.*
 ad rectam AB, in puncto C, angulum constituere æqualem angulo E. Sumantur in rectis ED, EF, duo puncta utcumque G, H, quæ recta GH, connectantur: Deinde a constituatur *aaa primæ*
 triangulum CIK, habens tria latera æqualia tribus rectis EG, GH, HE, ita ut CI, æquale sit ipsi EG; & CK, ipsi EH; & IK, ipsi GH. (Quod facile fiet, si CI, sumatur æqualis ipsi EG, & CL, ipsi EH, & IM, ipsi GH. Deinde ex centris C, & I, intervallis vero CL, & IM, circuli describantur secantes sese in K, &c.) Dico angulum C, æqualem esse angulo E. Quoniam enim duo latera CI, CK, æqualia sunt duobus lateribus EG, EH, utrumque utrique, & basis IK, basi GH, per constructionem; b erit angulus C, angulo E, æqualis. *b 8. primæ* Effecimus igitur angulum ad C, æqualem angulo E, &c. Quod facere oportebat.

THEOR. 15. PROPOS. 24. xxiv.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint; utrumque utriusque, angulum vero angulo majorem sub æqualibus rectis lineis contentum: Et basin basi majorem habebunt.

DUO latera AB, AC, trianguli ABC, æqualia sint *TAB. V.*
 duobus lateribus, DE, DF, trianguli DEF, utrum- *fig. 3.*
 que

54 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

- que utrique, nempe AB, ipsi DE, & AC, ipsi DF; Angulus vero A, major sit angulo EDF. Dico Basin BC; majorem esse base EF. Ad lineam enim DE, ad ejusque punctum D, *b* constitutur angulus EDG, æqualis angulo A; (cadetque recta DG, extra triangulum DEF, cum angulus EDF, minor ponatur angulo A) ponaturque *e* 3. *primi* DG, æqualis ipsi DF, *c* hoc est, ipsi AC. Ducta deinde recta EG; cadet ea aut supra rectam EF, aut in ipsam, aut infra ipsam. Cadat primum supra EF, ducaturque recta FG. Quia ergo latera AB, AC, æqualia sunt lateribus DE, DG, utrumque utrique, & angulus A, æqualis angulo EDG, per constructionem: *d* Erit basis BC, basi EG, æqualis. Rursus quia duo latera DF, DG, inter se sunt æqualia; *e* erunt anguli DFG, DGF, æquales: Est autem angulus DGF, *f* major angulo EGF. Igitur & angulus DFG, eodem angulo EGF, major erit. Quare multo major erit totus angulus EFG, eodem angulo EGF. In triangulo igitur EFG, *a* majus erit latus EG, latere EF. Est autem ostensum EG, æquale esse ipsi BC. Major igitur erit quoque BC, quam EF. Quod est propositum.
- Cadat deinde EG, (utin figura 4.) in ipsam EF. *b* 4. *primi* Et quia rursus, ut prius, basis EG, *b* æqualis est basi BC: & EG, *c* major quam EF, erit & BC, major, quam EF, quod est propositum.
- TAB. V.* Cadat tertio EG, infra EF, producanturque *fig. 5.* rectæ DF, DG, usque ad H, & I, & ducatur *d* 4. *primi* recta FG. Erit autem rursus, ut prius, *d* basis EG, basi BC; æqualis. Deinde quia duo latera DF, DG, æqualia sunt inter se, per constructionem, *e* erunt anguli GFH, FGI, infra basin FG, æquales: Est autem angulus FGI, *f* major angulo FGE. Igitur & angulus GFH, eodem angulo FGE, major erit. Quare multo major erit totus angulus EFG; eodem angulo FGE. In triangulo ergo EFG, *g* majus erit latus EG, latere EF. Est autem ostensum EG, æquale esse ipsi BC. Major igitur erit quoque BC, basi EF. Si igitur

LIBER PRIMUS. 55

igitur duo triangula duo latera duobus lateribus, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 16. PROPOS. 25. xiv

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrumque utrique, basin vero basi majorem: Et angulum sub æqualibus rectis lineis contentum angulo majorem habebunt.

DUO latera AB, AC, trianguli ABC, æqualia *TAB. P. fig. 6.* sint duobus lateribus DE, DF, trianguli DEF; utrumque utrique, hoc est, AB, ipsi DE, & AC, ipsi DF; Basis autem BC, major sit base EF. Dico angulum A, majorem esse angulo D. Si enim non est angulus A, major angulo D, erit vel æqualis, vel minor. Si dicatur esse æqualis, cum etiam duo latera circa A, æqualia sint duobus circa D, utrumque utrique, per hypothesin; erit & basis BC, æqualis basi EF; quod est absurdum. Ponitur enim basis BC, base EF, major; Si vero angulus A, dicatur esse minor angulo D; erit, propter æqualitatem laterum circa istos angulos, basis EF, *b 24 primi* major base BC; quod magis est absurdum, cum EF, ponatur esse minor quam BC. Quare angulus A, cum neque possit æqualis esse angulo D, neque minor, erit major. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 17. PROPOS. 26. xvii

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habuerint, utrumque utrique, unumque latus uni lateri æquale, sive quod æqualibus adjacet angulis, seu quod uni æqualium angulorum subtenditur: & reliqua latera reliquis lateribus æqualia; utrumque

D 4 utri-

56 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

utriusque, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

*TAB. V.
Fig. 7.*

Sint duo anguli B, & C, trianguli ABC, æquales duobus angulis E, & EFD, trianguli DEF, uterque utriusque, hoc est, B, ipsi E, & C, ipsi EFD; Sitque primo latus BC, quod angulis B, & C, adjacet, lateri EF, quod angulis E, & EFD, adjacet, æquale. Dico, reliqua quoque latera AB, AC, reliquis lateribus DE, DF, æqualia esse, utrumque utriusque, hoc est, AB, ipsi DE, & AC, ipsi DF, ea nimirum, quæ æqualibus angulis subtenduntur; reliquumque angulum A, reliquo angulo D. Si enim latus AB, non est æquale lateri DE, sit DE, majus, à quo *c* abscindatur recta linea EG, æqualis rectæ lineæ AB, ducaturque recta GF. Quoniam igitur latera AB, BC, æqualia sunt lateribus GE, EF, utrumque utriusque, & anguli B, & E, æquales per hypothefin: *d* Erit angulus C, æqualis angulo EFG. Ponitur autem angulus C, æqualis angulo EFD. Quare & angulus EFG, eidem angulo EFD, æqualis erit, pars toti; Quod est absurdum *e*. Non est igitur latus AB, inæquale lateri DE, sed æquale. Quamobrem, cum latera AB, BC, æqualia sint lateribus DE, EF, utrumque utriusque, & anguli contenti B, & E, æquales; *a* erunt & bases AC, DF, & anguli reliqui A, & D, æquales. Quod est propositum.

*TAB. V.
Fig. 8.*

Sint deinde latera AB, DE, subtendentia æquales angulos C, & EFD, inter se æqualia. Dico rursus reliqua latera BC, CA, reliquis lateribus EF, FD, esse æqualia, utrumque utriusque, hoc est, BC, ipsi EF, & CA, ipsi FD; reliquumque angulum A, reliquo angulo D, æqualem. Si enim latus BC, non est æquale lateri EF, sit EF, majus: *b* ex quo sumatur recta EG, æqualis ipsi BC, ducaturque recta DG. Quoniam igitur latera AB, BC, æqualia sunt lateribus DE, EG, utrumque utriusque, & anguli contenti B, & E, æquales, per hypothefin; *c* Erit angulus C, angulo

angulo EGD, æqualis: Ponitur autem angulus C, angulo EFD, æqualis; Igitur & angulus EGD, angulo eidem EFD, æqualis erit, externus interno, & opposito, quod est absurdum. Est enim major. Non ergo est latus BC, lateri EF, inæquale. Quocirca, ut prius, colligetur institutum ex 4. propos. hujus libri. Si duo igitur triangula duos angulos duobus angulis æquales habuerint, &c. Quod demonstrandum erat. d 16 primi

C O R O L L A R I U M.

Sequitur ex demonstratione hujus theorematís, tota etiam triangula, quoad areas, esse æqualia. Nam si latera AB, BC, lateribus DE, EF, æqualia sint, ut ostensum fuit, contineantque ex hypothefi angulos æquales B, E, erunt tota quoque triangula æqualia inter se. e 4. primi

T H E O R. 18. P R O P O S. 27. xxvij.

Si in duas rectas lineas recta incidens linea, alternatim angulos æquales inter se fecerit: parallelæ erunt inter se illæ rectæ lineæ.

IN duas rectas AB, CD, incidens recta EF, TAB. V. faciat angulos alternatim AGH, DHG, fig. 9. inter se æquales. Dico lineas AB, CD, esse parallelas. Si enim non sunt parallelæ, coibunt tandem, si producantur infinite. Si namque non coirent unquam, parallelæ essent, ex parallelarum definitione. Conveniant ergo ad partes B, & D, in puncto I. Quoniam igitur triangulum est GIH, (cum AB, recta continuata sit, itém recta CD, usque ad punctum I;) & angulus AGH, positus est æqualis angulo DHG; erit externus angulus AGH, æqualis interno, & opposito DHG; quod est absurdum; quoniam externus interno major est. Quod si AB, CD, coire dicantur ad partes A, & C, in puncto K, erit rursus eadem ratione angulus externus DHG, æqualis interno & opposito, AGH, quod est absurdum. Non igitur e 16 primi

60 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Quoniam enim ostensum fuit, angulum externum AGE, æqualem esse angulo CHE, interno; si addatur communis AGH, *a* erunt duo AGE, AGH, duobus CHG, AGH, æquales: Sed duo AGE, AGH, *b* æquales sunt duobus rectis. Igitur & duo anguli CHG, AGH, æquales duobus rectis erunt. Eodem modo anguli BGH, DHG, duobus erunt rectis æquales. In parallelas ergo rectas lineas recta incidens linea, & alternatim angulos, &c. Quod erat demonstrandum.

XXX. THEOR. 21. PROPOS. 30.

Quæ eidem rectæ lineæ parallelæ & inter se sunt parallelæ.

TAB. V.
fig. 11. Sint rectæ AB, CD, eidem rectæ EF, parallelæ. Dico & ipsas AB, CD, esse inter se parallelas. Quoniam enim omnes hæ lineæ in eodem ponuntur esse plano, (Nam in propos. 9. undecimi libri agitur de lineis in diversis planis) ducta recta GH, secabit omnes, scilicet AB, in I; CD, in K; & EF, in L. Quia igitur AB, ponitur parallela ipsi EF, *e* erit angulus AIL, alterno FLI, æqualis. Rursus quia CD, ponitur etiam parallela ipsi EF, *d* erit angulus DKI, eidem angulo FLI, nempe internus externo, vel externus interno, æqualis. Quare anguli AIL, DKI, *e* æquales inter se quoque erunt. Cum igitur sint alterni, *f* erunt rectæ AB, CD, parallelæ inter se. Quæ igitur eidem rectæ lineæ parallelæ, & inter se sunt parallelæ. Quod demonstrandum erat.

XXXI. PROBL. 10. PROPOS. 31.

A Dato puncto, datæ rectæ lineæ parallelam, rectam lineam ducere.

TAB. VI.
fig. 1. EX puncto A, ducenda sit linea parallela lineæ BC. Ducatur ex A, ad BC, linea AD, ut.




Fig. 3.





Fig. 4.





Fig. 6.





Fig. 8.






Fig. 11.



utcumque, faciens angulum quemcumque ADB; Cui ad A, e æqualis constituatur EAD. Dico e 23 primi rectam EA, extensam ad F, quantumlibet, parallelam esse ipsi BC. Cum enim anguli alterni ADB, DAE, æquales sint, per constructionem, f Erunt rectæ BC, EF, parallelæ. A dato igitur puncto, data rectæ lineæ, &c. Quod erat faciendum. f 27 primi

THEOR. 22. PROPOS. 32.

Cujuscunque trianguli uno latere producto: Externus angulus duobus internis, & oppositis est æqualis. Et trianguli tres interni anguli duobus sunt rectis æquales.

PRoducatur in triangulo ABC, latus BC, ad D. Dico primo, angulum externum ACD, æqualem esse duobus internis, & oppositis simul A, & B. Ducatur enim ex C, linea CE, parallela rectæ AB. Quoniam igitur recta AC, incidit in parallelas AB, CE, erunt anguli alterni A, & ACE, æquales. Rursus, quia recta BD, in easdem parallelas incidit, erit angulus externus DCF, æqualis interno B. Additis igitur æqualibus ACE, & A, idem æqualibus ECD, & B. fiet totus ACD, (qui ex duobus DCE, ACE, componitur) duobus A, & B, simul æqualis. Quod est propositum. a 19 primi b 29 primi c 2. primi

Dico secundo, tres angulos internos ejusdem trianguli A, B, & ACB, duobus esse rectis æquales. Cum enim externus angulus ACD, ut ostensum fuit, æqualis sit duobus internis A, & B; si addatur communis ACB, erunt duo anguli ACD, ACB, æquales tribus A, B, & ACB: Sed duo ACD, ACB, æquales sunt duobus rectis. Igitur & tres interni A, B, ACB, duobus sunt rectis æquales. Quare cujuscunque trianguli uno latere producto, &c. Quod erat demonstrandum. d 2. primi e 13 primi

62. EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

S C H O L I U M.

Omnes anguli figura rectilinea cuiusvis, aequales sunt bis tot rectis angulis, demptis quatuor, quot ipsa continet latera, seu angulos.

TAB. XV *Hoc est, anguli cuiuslibet trianguli aequales sunt bis tribus rectis, demptis quatuor, nempe duobus*
fig. 6. 7: *rectis. Ita etiam anguli figura continentis 20 latera*
æquivalentur bis 20. angulis rectis minus quatuor, nimirum 36. rectis angulis, &c. Demonstratio
autem hujus rei talis est. Si à quovis puncto A,
intra figuram assumpto ad omnes angulos B, C, D,
vel B, C, D, E, vel B, C, D, E, F, recta linea
AD, AB, AC. vel AB, AC, AD, AE, vel
AB, AC, AD, AE, AF, ducantur, efficiuntur tot
triangula, quot latera, angulofve figura ipsa continet.
632-prim *Cum igitur anguli cuiuscunque trianguli a aequales*
sint duobus rectis, erunt omnes anguli illorum trian-
gularum aequales bis tot rectis, quot latera figuram
ambiant. At anguli eorundem triangularum circa
punctum A, intra figuram assumptam consistentes non
pertinent ad angulos figura rectilinea proposita, ut
constat. Quare si hi auferantur, erunt reliqui trian-
gularum anguli constituentes angulos figura proposita,
bis quoque tot rectis aequales, demptis illis circa
punctum A, assumptam constitutis, quot latera, vel
angulos continet figura. Sunt autem omnes illi an-
guli, quotquot sint, circa dictum punctum A, exi-
stentes aequales 4. rectis tantummodo, ut collegimus
ex propof. 15. Quamobrem anguli cuiusque figura
bis tot rectis sunt aequales, ablatis quatuor, quot ipsa
figura continet angulos, seu latera, quod est propo-
situm.

C O R O L L A R I U M. I.

Ex hac propof. 31. colligitur, tres angulos cuiuslibet trianguli simul sumptos aequales esse tribus angulis cuiusque alterius trianguli simul sumptis: Quoniam tam illi tres,

LIBER PRIMUS. 63

tres, quam hi g æquales sunt duobus angulis rectis. g 32 primi
 Unde si duo anguli unius trianguli fuerint æquales duobus angulis alterius trianguli, erit & reliquus illius reliquo hujus æqualis, æquiangulaque erunt ipsa triangula.

COROLLARIUM II.

Constat etiam, in omni triangulo Isoscele, cujus angulus lateribus æqualibus comprehensus rectus fuerit, quemlibet reliquorum esse semirectum. Nam reliqui duo simul conficiunt unum rectum, h cum omnes tres sint æquales duobus rectis: & tertius ille ponatur rectus. Quare h 32 primi
 cum duo reliqui inter se sint æquales, erit quilibet eorum semirectus. i 5. primi
 At vero si angulus æqualibus lateribus contentus fuerit obtusus, quemlibet aliorum esse semirecto minorem. Reliqui enim duo simul minores erunt uno recto, &c. Si denique dictus angulus extiterit acutus, utrumque reliquorum majorem esse semirecto. Quoniam reliqui duo simul majores erunt uno recto, &c.

COROLLARIUM III.

Perspicuum quoque est, quemvis angulum trianguli æquilateri esse duas tertias partes unius recti, vel tertiam partem duorum rectorum. Duo enim anguli recti, & quibus æquales sunt tres anguli trianguli æquilateri, k 32 primi
 divisi in tres angulos, faciunt duas tertias partes unius recti.

COROLLARIUM IV.

Liquet etiam, si ab uno angulo trianguli æquilateri perpendicularis ad latus oppositum ducatur, constitui duo triangula scalena, quorum unumquodque habet unum angulum rectum prope perpendicularem; alium duas tertias partes unius recti, illum scilicet, qui est & angulus trianguli æquilateri; reliquum denique tertiam partem unius recti.

THEOR.

64 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

xxxij. THEOR. 23. PROPOS. 33.

Rectæ lineæ, quæ æquales, & parallelas lineas ad partes easdem conjungunt; Et ipsæ æquales, & parallelæ sunt.

TAB. VI. **S**int rectæ lineæ AB, CD, æquales, & parallelæ; Ipsas autem conjungant ad easdem partes rectæ AD, BC. Dico AD, BC, æquales quoque esse, & parallelas. Ducatur enim recta AC. Quoniam igitur AC, incidit in parallelas AB, CD, *d 19 primi* erunt anguli alterni BAC, DCA, æquales. Quare cum duo latera BA, AC, trianguli BAC, æqualia sint duobus lateribus CD, CA, trianguli CDA, utrumque utrique, & anguli quoque dictis lateribus inclusi æquales; *a 4 primi* erunt bases BC, AD, æquales, & angulus ACB, angulo DAC, æqualis. Cum igitur hi anguli sint *b 27 primi* alterni inter rectas AD, BC, *b erunt* AD, BC, parallelæ: Probatum autem jam fuit, easdem esse æquales. Rectæ ergo lineæ, quæ æquales, & parallelas lineas, &c. Quod erat demonstrandum.

xxxv. THEOR. 24. PROPOS. 34.

Parallelogrammorum spatiorum æqualia sunt inter se, quæ ex adverso & latera, & anguli; atque illa bifariam secat diameter.

TAB. VI. **S**it parallelogrammum ABCD, quale definitivimus definitione 35. Dico latera opposita AB, DC, inter se esse æqualia, nec non latera opposita AD, BC. Item angulos oppositos B, & D, æquales inter se esse; nec non & angulos oppositos DAB, & DCB: Denique ducta diametro AC, parallelogrammum ipsum bifariam secari. *c 29 primi* Cum enim AB, DC, sint parallelæ, *c erunt* anguli

all alterni BAC, DCA, æquales. Rursus quia
 AD, BC, sunt parallelæ, & erunt & anguli al- d 19. primæ
 terni BCA, DAC, æquales. Itaque cum anguli
 BAC, BCA, trianguli ABC, æquales sint duobus
 angulis DCA, DAC, trianguli ADC, uter-
 que utrique, & latus AC, dictis angulis adja-
 cens, commune utrique triangulo; e erit recta e 26. primæ
 AB, æqualis oppositæ rectæ DC, & recta BC,
 oppositæ rectæ AD, quod est primum. Erit rur-
 sus eadem de causa angulus B, angulo D, æ-
 qualis. Et quia si æqualibus angulis BAC,
 DCA, addantur æquales anguli DAC, BCA,
 toti quoque anguli BAD, BCD, f fiunt æqua- a 2. primæ
 les; constat secundum, angulos nimirum opposi-
 tos esse æquales. Quoniam vero duo latera
 AB, BC, trianguli ABC, æqualia sunt duobus
 lateribus CD, DA, trianguli CDA, utrumque
 utrique, & angulus B, angulo D, æqualis, ut
 jam ostendimus; b erunt triangula ABC, CDA, b 4. primæ
 æqualia, ideoque parallelogrammum ABCD,
 divisum erit bifariam à diametro AC, quod tertio
 loco proponebatur. Parallelogrammorum igitur
 spatiorum æqualia sunt inter se, quæ ex adverso,
 &c. Quod ostendendum erat.

THEOR. 25. PROPOS. 35. [XXXV]

Parallelogramma super eadem basi, & in
 eisdem parallelis constituta, inter se sunt æ-
 qualia.

I Nter duas parallelas AB, CD, super basi CD, TAB. VII
 existant duo parallelogramma CDEA, CDBF. fig. 4.
 (Dicuntur autem parallelogramma in eisdem esse
 parallelis, quando duo latera opposita partes sunt
 parallelarum, ut in exemplo proposito cernitur.)
 Dico ipsa parallelogramma inter se esse æqualia,
 non quoad angulos & latera, sed quoad arcam,
 seu capacitatem. Cadet enim primo punctum F,
 inter A, & E. Quoniam igitur in parallelo-
 grammo

66 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

- a 34. *primi* grammō CDEA, recta AE, *a* æqualis est rectæ CD, oppositæ, & eidem CD, æqualis est FB, in parallelogrammo CDBF, opposita; Erunt
- b 1. *pron.* AE, b FB, inter se æquales. Dempta igitur
- c 3. *pron.* communi FE, c remanebit AF, ipsi EB, æqua-
- d 34. *primi* lis: d Est autem & AC, ipsi ED, oppositæ æ-
- e 29. *primi* qualis in parallelogrammo CDEA; e & angulus
- f 7. *primi* BED, angulo FAC, externus interno. f Quare triangulum FAC; triangulo BED, æquale erit.
- g 2. *pron.* Addito igitur communi trapezio CDEF, g fiet totum parallelogrammum CDEA, toti parallelogrammo CDBF, æquale. Quod est propositum.
- TAB. VI.
fig. 5. Cadat secundo punctum F, in punctum E. Dico rursus, parallelogramma CDEA, CDBE, æqualia esse. Erunt enim, ut prius, rectæ AE, EB, æquales, nec non & anguli BED, EAC; atque adeo b triangula, EAC, BED, æqualia.
- h 4. *primi*
- i 2. *pron.* Addito igitur communi triangulo CDE, i fient parallelogramma CDEA, CDBE, æqualia.
- TAB. VI.
fig. 6. Cadat tertio punctum F, ultra E, ita ut recta CF secet rectam DE, in G. Quoniam igitur, ut prius, rectæ AE, FB, sunt æquales; si communis addatur EF; k erit tota AF, toti EB, æqualis, nec non & anguli BED, FAC, æquales erunt; atque adeo l triangulum FAC, triangulo BED, æquale. Ablato ergo communi triangulo EGF, m remanebit trapezium AEGC, trapezio FGDB, æquale. Quocirca addito communi triangulo CDG, fiet totum parallelogrammum CDEA, toti parallelogrammo CDBF, æquale. Parallelogramma igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia. Quod erat demonstrandum.

xxxvi. T H E O R. 26. P R O P O S. 36.

Parallelogramma super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta; inter se sunt æqualia.

TAB. VI.
fig. 7. Sint duo parallelogramma ACEF, GHDB, super æquales bases CE, HD, inter easdem paral-

parallelas AB, CD. Dico ea esse æqualia. Con-
nectantur enim extrema rectarum CE, GB, ad
easdem partes lineis rectis CG, EB. Quoniam
igitur recta CE, æqualis ponitur rectæ HD, &
eidem HD, o æqualis est GB, in parallelogram- o 34. primi
mo GHDB, opposita; erunt CE, GB, p æqua- p 1. prop.
les inter se: Sunt autem & parallelæ, per hypo-
thesin. Quare & CG, EB, ipsas conjungentes,
& parallelæ erunt, & æquales, ideoque CEEG, q 33. primi
parallelogrammum erit. Itaque cum parallelo-
gramma ACEF, GCEB, sint inter easdem paral- r 35. primi
lelas, & super eandem basin CE, r erit paralle-
logrammum ACEF, parallelogrammo GCEB,
æquale. Rursus quia parallelogramma GCEB,
GHDB, sunt inter easdem parallelas, & super
eandem basin GB, s erit quoque parallelogrammum s 35. primi
GHDB, eidem parallelogrammo GCEB, æquale.
Quare & parallelogramma ACEF, GHDB, s inter t 1. prop.
ter se æqualia erunt. Parallelogramma igitur
super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis
constituta, &c. Quod ostendendum erat.

THEOR. 27. PROPOS. 37. xxxvii.

Triangula super eadem basi constituta, &
in eisdem parallelis, inter se sunt æqualia.

Inter parallelas AB, CD, & super basin CD, TAB VI.
sint constituta duo triangula ACD, ECD. 18. 8.
(Dicitur autem triangulum inter duas esse paral-
lelas constitutum, quando basis est pars unius, &
angulus oppositus alteram attingit.) Dico ea tri-
angula esse æqualia. Per D, exim s ducatur i 31. primi
DE, parallela rectæ AC, & DF, parallela rectæ
BC. k Erunt igitur parallelogramma ACDE, k 35. primi
BCDF, æqualia. Sunt enim super eandem basin,
CD, & inter easdem parallelas. Sed horum di-
midia sunt triangula ACD, BCD; / quæ AD, l 34. primi
BD, diametri bifariam secant parallelogramma
ACDE, BCDF. Igitur & triangula ACD,
BCD, m æqualia erunt. Triangula igitur su- m 7. prop.
m 7. prop.

68 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

per eadem basi, &c. Quod erat demonst-
dum.

xxxviii. THEOR. 28. PROPOS. 38.

Triangula super æqualibus basibus consti-
tuta, & in eisdem parallelis, inter se sunt
æqualia.

TAB. VI.
fig. 9.
x 31. primi
y 36. primi
z 34. primi
a 7. pron.
Inter parallelas AB, CD, & super æquales ba-
ses CE, FD, sint constituta triangula ACE,
BFD. Dico ipsa esse æqualia. *x* Ducatur enim
EG, parallela ipsi AC, & DH, ipsi BF: Erunt-
que *y* parallelogramma ACEG, BFDH, æqualia.
z Cum igitur horum *z* dimidia sint triangula ACE,
BFD; *a* erunt hæc inter se æqualia. Triangula
ergo super æqualibus basibus, &c. Quod erat
ostendendum.

xxxix. THEOR. 29. PROPOS. 39.

Triangula æqualia super eadem basi, &
ad easdem partes constituta; & in eisdem
sunt parallelis.

TAB. VI.
fig. 10.
a 31. primi
b 37. primi
c 1. pron.
Sint duo triangula æqualia, ABC, DBC, super
eandem basin BC, & ad easdem partes. Dico
ipsa esse inter easdem parallelas constituta, hoc
est, rectam ductam AD, parallelam esse ipsi BC.
a Si enim non est, *a* ducatur ex A, parallela ipsi
BC, quæ vel cadet supra AD, vel infra. Cadat
primum supra, qualis est AE, coeatque cum BD,
protracta in E, & ducatur recta EC. Quoniam
b igitur parallelæ sunt AE, BC, *b* erit triangulo
ABC, triangulum EBC, æquale: Est autem per
hypothesin, triangulum quoque DBC, æquale
c eidem triangulo ABC. Igitur *c* erunt triangula
DBC, EBC, æqualia, pars & totum, quod est
absurdum. Quod si parallela ducta per A, cadat
infra AD, qualis est AF; ducta recta FC, erunt
eadem

eadem ratiocinatione triangula BFC, BDC, æqualia, pars & totum; quod est absurdum. Erit igitur AD, parallela ipsi BC. Quare triangula æqualia super eadem basi, &c. Quod ostendendum erat.

THEOR. 30. PROPOS. 40. xxx.

Triangula æqualia super æqualibus basibus, & ad eandem partes constituta, & in eisdem sunt parallelis.

Sint duo triangula æqualia ABC, DEF, super *TAB. VI.* bases æquales BC, EF, (quæ in eadem recta *fig. 11.* linea collocentur,) & ad eandem partes constituta. Dico ea esse in eisdem parallelis, hoc est, rectam ex A, ad D, ductam parallelam esse rectæ BF. Si enim non est, cadet parallela ipsi BF, per A, ducta vel supra AD, vel infra. Cadat primum supra, cocatque cum ED, producta in G, & ducatur recta GF. Quoniam igitur parallelæ sunt AG, BF, erit triangulum EFG, triangulo *38. prim.* ABC, æquale: Ponitur autem & triangulum DEF, eidem triangulo ABC, æquale. Igitur & triangula DEF, GEF, æqualia erunt, pars & *k 1. prim.* totum. Quod est absurdum. Quod si parallela ducta per A, cadat infra AD, qualis est, AH; ducta recta HF, erunt eadem argumentatione triangula HEF, DEF, æqualia, pars & totum, quod est absurdum. Est igitur AD, parallela ipsi BF. Quare triangula æqualia super æqualibus basibus, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 31. PROPOS. 41. xli.

Si parallelogrammum cum triangulo eandem basin habuerit, in eisdemque fuerit parallelis, duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli.

Inter parallelas AB, CD, & super basin CD, *TAB. VI.* constituantur parallelogrammum ACDE, & *fig. 12.*

70 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

triangulum BCD. Dico parallelogrammum esse
 duplum trianguli BCD. Ducta enim diametro
 a 37. primi AD, in parallelogrammo, erunt *a* triangula
 b 34. primi ACDE, duplum est trianguli ACD; *b* quod
 triangula ACD, ADE, æqualia quoque inter se
 e 6. prop. sint. Igitur & trianguli BCD, *c* duplum erit
 idem parallelogrammum ACDE. Quamobrem,
 si parallelogrammum cum triangulo, &c. Quod
 erat demonstrandum.

S C H O L I U M.

TAB. VI. Idem hoc theorema Euclidis demonstrari potest eo-
 dem modo, si parallelogrammum, & triangulum
 fig. 13. æquales habuerint bases, & non eandem, fuerintque
 in eisdem parallelis, ut cernis in parallelogrammo
 ACDE, & triangulo BFG, quorum bases CD,
 FG, æquales sunt. Ducta enim diametro AD, in
 g 38. primi parallelogrammo, *g* erunt triangula ACD, BFG,
 æqualia. Cum igitur parallelogrammum ACDE,
 h 34. primi duplum sit trianguli ACD: h quod diameter AD,
 i 6. prop. secet parallelogrammum ACDE, bifariam: i erit
 quoque idem trianguli BFG, duplum. Eadem ra-
 tione si basis FG, duplicaretur, & recta ad B,
 duceretur, fieret triangulum parallelogrammo æquale,
 quoniam triangulum hoc esset duplum eisdem trianguli
 BFG, &c.

alij. P R O B L. II. P R O P O S. 42.

Dato triangulo æquale parallelogrammum
 constituere in dato angulo rectilineo.

TAB. VI. D A TUM triangulum sit ABC, & datus angulus
 fig. 14. rectilineus D. Oportet igitur constituere
 parallelogrammum æquale triangulo ABC, ha-
 bens angulum æqualem angulo D. Dividatur
 a 10. primi latus unum trianguli, nempe BC, *a* bifariam in
 b 3. primi E, & *b* fiat angulus CEF, æqualis angulo D,
 pro ut

pro ut libet, hoc est, sive angulus CEF , vergat ad partes C , sive ad partes B , pro ut magis videbitur expedire. Ducatur item per A , c recta AF , c 31. primi parallela ipsi BC , quæ secet EF , in F . Rursus per C , vel B , ducatur ipsi EF , parallela CG , occurrens rectæ AF , productæ in G , Eritque in angulo CEF , qui dato angulo rectilineo D , factus est æqualis, constitutum parallelogrammum $CEFG$, quod dico esse æquale triangulo ABC . Ducta enim recta EA , quoniam parallelogrammum $CEFG$, d duplum est trianguli AEC , & triangulum ABC , duplum ejusdem trianguli AEC , e quod triangula AEC , ABE , super æ- e 38. primi quales bases EC , BE , & in eisdem parallelis, sint æqualia. Erunt parallelogrammum $CEFG$, & triangulum ABC , f æqualia inter se. Cum f 6. prop. igitur angulus CEF , factus sit æqualis angulo D , constat propositum. Quocirca dato triangulo æquale parallelogrammum constituimus in dato angulo rectilineo. Quod erat faciendum.

T H E O R. 32. P. R O P O S. 43. xliij.

In omni parallelogrammo complementa eorum, quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum, inter se sunt æqualia.

IN parallelogrammo $ABCD$, sint circa diametrum AC , parallelogramma $AEGH$, $CFGI$, TAB VII. fig. 1. & complementa $DFGH$, $EBIG$, ut in 36. defin. diximus. Dico complementa hæc inter se esse æqualia. Cum a enim triangula ABC , CJA , a 34. primi æqualia sint; Itemque triangula AEG , GHA ; si hæc ab illis demantur, b remanebunt trapezia b 3. prop. $CBEG$, $CDHG$, æqualia: c Sunt autem & triangula c 34. primi CGI , CGF , æqualia. Quare si detrahantur ex trapeziis, d remanebunt æqualia complementa d 3. prop. $DFGH$, $EBIG$. In omni igitur parallelogrammo, complementa &c. Quod ostendendum erat.

PROBL. 12. PROPOS. 44.

Ad datam rectam lineam, dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.






TAB. VII.
fig. 2. **D**ata recta linea sit *A*, datum triangulum *B*, & datus angulus rectilineus *C*. Oportet igitur constituere parallelogrammum æquale triangulo *B*, angulum habens æqualem angulo *C*, & unum latus æquale rectæ *A*. Constituitur triangulo *B*, *a* æquale parallelogrammum *DEFG*, habens angulum *EFG*, angulo *C*, æqualem, producaturque *GF*, ad *H*, ut *FH*, sit æqualis rectæ *A*, & per *H*, *b* ducatur *HI*, parallela ipsi *FE*, occurrens *DE*, productæ in *I*. Extendatur deinde ex *I*, per *F*, diameter *IF*, occurrens rectæ *DG*, productæ in *K*; & *c* per *K*, ducatur *KL*, parallela ipsi *GH*, secans *IH*, protractam in *L*, producaturque *EF*, ad *M*. Dico parallelogrammum *LMFH*, esse id, quod quaeritur. Habet enim latus *FH*, æquale datæ rectæ *A*, & angulum *HFM*, angulo dato *C*, æqualem, *d* cum angulus *HFM*, æqualis sit angulo *EFG*, qui factus est æqualis angulo *C*: Denique parallelogrammum *LMFH*, æquale est triangulo *B*, *e* cum æquale sit complemento *DEFG*, quod factum est æquale triangulo *B*. Ad datam igitur rectam lineam dato triangulo, &c. Quod erat faciendum.

PROBL. 13. PROPOS. 45.

Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum constituere, in dato angulo rectilineo.

TAB. VII.
fig. 3. **Q**uamvis Euclides proponat hoc problema absolute, non adstringendo nos ad certam aliquam

TAB. VI.





quam rectam lineam datam, ut in præcedenti
 propos. 44. fecerat; tamen quia in sequentibus
 frequenter usurpatur in data recta linea, placuit
 ipsum proponere una cum data recta linea. Sit
 ergo recta data EF, rectilineum ABC, & datus
 angulus D. Oportet igitur construere ad datam
 rectam EF, parallelogrammum æquale rectilineo
 ABC, quod habeat angulum æqualem angulo D.
 Resolvatur rectilineum in triacula A, B, & C.
 Deinde triangulo A, æquale parallelogrammum
 constituatur EFGH, super rectam EF, habens an- *a44. primus*
 gulum F, angulo D, æqualem. Item super re-
 ctam GH, parallelogrammum GHIK, æquale
 triangulo B, habens angulum G, æqualem angu-
 lo D. Item super rectam IK, parallelogrammum
 IKLM, æquale triangulo C, habens angulum K,
 æqualem angulo D; Et sic deinceps procedatur,
 si plura fuerint triacula in dato rectilineo: fa-
 ctumque erit, quod jubetur. Nam tria parallelo-
 grammata constructa, quæ quidem æqualia sunt
 rectilineo dato ABC, efficiunt totum unum pa-
 rallelogrammum, quod sic demonstratur. Duo
 anguli EFG, HGK, *b* inter se sunt æquales, *b* 17. primus
 cum uterque æqualis sit angulo D. Addito igitur
 communi angulo FGH, erunt duo anguli
 EFG, FGH, *c* qui duobus rectis æquivalent, *c* 29. primus
 æquales duobus angulis HGK, FGH; ideoque hi *d* 2. 2. 2.
 anguli duobus etiam rectis æquales erunt. Quare *e* 14. primus
 FG, GK, unam rectam lineam efficient. Eadem
 ratione ostendemus, EH, HI, unam rectam line-
 am efficere, propterea quod duo anguli EHG,
 HIK, æquales inter se sunt, (si cum sint æqua- *f* 34. primus
 les oppositis angulis æqualibus EFG, HGK.)
 g & duo anguli HIK, IHG, duobus sunt rectis *g* 29. primus
 æquales. &c. Cum igitur EI, FK, sint paralle-
 læ; *b* Itemque EF, IK, quod utraque parallela *h* 30. primus
 sit rectæ HG; Parallelogrammum erit EFKI,
 Eodem modo demonstrabitur, parallelogrammum
 IKLM, adjunctum parallelogrammo EFKI,
 constituere totum unum parallelogrammum EFLM.
 Ad datam ergo rectam lineam EF, dato rectili-
 neo

74 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

neo ABC, constituimus æquale parallelogrammum EFLM, habens angulum F, æqualem angulo D, dato. Quod erat efficiendum.

S C H O L I U M.

Datis duobus rectilineis inæqualibus, excessum majoris supra minus inquirere.

TAB. VII. *Sint data rectilinea A, & B, sitque A, majus. Oportet igitur indagare, qua magnitudine rectilineum A, superet rectilineum B, i* **fig. 4.** *Fiat parallelogrammum CDEF, in quocunque angulo D, æquale majori rectilineo A. Et super rectam CD, parallelogrammum CDGH, in eodem angulo D, æquale rectilineo minori B. Quoniam igitur parallelogrammum CDt.F, superat parallelogrammum CDGH, parallelogrammo EFHG, superabit quoque figura A, figuram B, eodem parallelogrammo EFHG. Quod est propostum.*

xlv. . . P R O B L. 14. P R O P O S. 46.

A Data recta linea quadratum describere.

TAB. VII. *S* **fig. 5.** *It data recta AB, super quam oporteat quadratum describere. Ex A, & B, a educantur AD, BC, perpendiculares ad AB, sintque ipsi AB, æquales, & connectatur recta CD. Dico ABCD, esse quadratum. Cum enim a* **12. primi** *anguli A, & B, sint recti, b erunt AD, BC, parallelæ: Sunt autem & æquales, quod utraque c* **33. primi** *æqualis sit ipsi AB. Igitur c & AB, DC, parallelæ sunt & æquales: & ideo parallelogrammum est ABCD, in quo, cum AD, DC, CB, æquales sint ipsi AB, omnes quatuor lineæ æquales existunt; sunt autem & omnes quatuor anguli recti, cum C, & D, d æquales sint oppositis rectis A, & B. Quadratum igitur est ABCD, ex definitione; Ac proinde à data recta linea quadratum descripsimus. Quod faciendum erat.*

THEOR.

THEOR. 33. PROPOS. 47. xivj

In rectangulis triangulis, quadratum, quod à latere rectum angulum subtendente describitur, æquale est eis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur, quadratis.

IN triangulo ABC, angulus BAC, sit re- TAB. VII.
ctus *a* describanturque super AB, AC, fig. 6.
BC, quadrata ABFG, ACHI, BCDE. Dico a 46. primæ
quadratum BCDE, descriptum super latus
BC, quod angulo recto opponitur, æquale esse
duobus quadratis ABFG, ACHI, quæ super
alia duo latera sunt descripta, sive hæc duo la-
tera æqualia sint, sive inæqualia. Ducatur enim
recta AK, *b* parallela ipsi BE, vel ipsi CD, se- b 31. primæ
cans BC, in L, & jungantur rectæ AD, AE,
CF, BH. Et quia duo anguli BAC, BAG, sunt
recti, *c* erunt rectæ GA, AC, una linea recta; c 14. primæ
eodemque modo IA, AB, una recta linea erunt.
Rursus quia anguli ABF, CBE, sunt æquales,
cum sint recti, si addatur communis angulus
ABC, *d* fiet totus angulus CBF, toti angulo d 2. primæ
ABE, æqualis; similiterque totus angulus BCH,
toti angulo ACD. Quoniam igitur duo latera
AB, BE; trianguli ABE, æqualia sunt duobus
lateribus FB, BC, trianguli FBC, utrumque u-
trique, ut constat ex definitione quadrati: Sunt
autem & anguli ABE, FBC, contenti hisce late-
ribus æquales, ut ostendimus; *e* Erunt triangula e 4. primæ
ABE, FBC, æqualia. Est autem quadratum,
seu parallelogrammum ABFG, *f* duplum trianguli f 41. primæ
FBC, cum sint inter parallelas BF, CG, &
super eandem basin BF: Et parallelogrammum
BEKL, duplum trianguli ABE, quod sint inter
parallelas BE, AK, & super eandem basin BE.
Quare *g* æqualia erunt quadratum ABFG, & pa- g 6. primæ
rallelogrammum BEKL. Eadem ratione ostendetur

76 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

detur, æqualia esse quadratum ACHI, & parallelogrammum CDKL. *b* Erunt enim rursus triangula ACD, HCB, æqualia, ideoque eorum dupla, parallelogrammum videlicet CDKL, & quadratum ACHI, æqualia erunt. Quamobrem totum quadratum BCDE, quod componitur ex duobus parallelogrammis BEKL, CDKL; æquale est duobus quadratis ABFG, ACHI. In reëctangulis ergo triangulis, quadratum, &c. Quod demonstrandum erat.

S C H O L I U M.

Si in quadrato quovis diameter ducatur, quadratum à diametro descriptum duplum erit prædicti quadrati.

TAB. VII. *In quadrato ABCD, ducatur diameter AC. Dico quadratum diametri AC, duplum esse quadrati ABCD. fig. 5. Cum enim in triangulo ABC, angulus B, reëctus sit, g eris quadratum lateris AC, æquale duobus quadratis laterum AB, BC. Cum igitur quadrata linearum AB, BC, æqualia sint, quod linea AB, BC, sint æquales; erit quadratum diametri AC, duplum cujuslibet illorum, ut quadrati linea AB, hoc est, quadrati ABCD. Quod est propositum.*

xlvii. THEOR. 34. PROPOS. 48.

Si quadratum, quod ab uno laterum trianguli describitur, æquale sit eis, quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur, quadratis; Angulus comprehensus sub reliquis duobus trianguli lateribus, reëctus est.

TAB. VII. *DEUR triangulum ABC, sitque quadratum lateris AC, æquale quadratis reliquorum laterum BA, BC. Dico angulum ABC, esse reëctum. Ducatur namque BD, perpendicularis ad*

ad BA *k*, & æqualis rectæ BC, connectaturque *k* *ii. prim*
 recta AD. Quoniam igitur in triangulo ABD,
 angulus ABD, rectus est; *g* erit quadratum re-
 ctæ AD, æquale quadratis rectarum BA, BD: *g 47. prim*
 Est autem quadratum rectæ BD, quadrato rectæ
 BC, æquale, ob linearum æqualitatem. Quare
 quadratum rectæ AD; quadratis rectarum BA,
 BC, æquale erit. Cum ergo quadratum rectæ
 AC, eisdem quadratis rectarum BA, BC, æquale
 ponatur; *h* erunt quadrata rectarum AD, AC, *h i. prim*
 inter se æqualia, ac propterea & rectæ ipsæ AD,
 AC, æquales. Quoniam igitur latera BA, BD;
 trianguli ABD, æqualia sunt lateribus BA, BC,
 trianguli ABC; basis AD, ostensa est æqualis
 basi AC; *i* erant anguli ABD, ABC, æquales: *i 8. prim*
 Est autem angulus ABD, ex constructione rectus.
 Igitur & angulus ABC, rectus erit. Si igitur
 quadratum, quod ab uno laterum trianguli de-
 scribitur, &c. Quod demonstrandum erat.





EUCLIDIS ELEMENTUM SECUNDUM.

Agit Euclides secundo hoc libro de potentiis linearum rectarum, inquirendo, quanta sint & quadrata partium cujuscvis linea recta divisa, & parallelogramma rectangula sub partibus ejusdem linea divisa comprehensa, tam inter se, quam comparata cum quadrato totius linea &c. Quod ut commode exequatur, explicat prius duabus definitionibus duo ad ea, qua demonstranda sunt, recte intelligenda maxime necessaria.

DEFINITIO. I.

Omne parallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub rectis duabus lineis, quæ rectum comprehendunt angulum.

Hac definitione exponit, sub quibus rectis lineis contineri dicatur parallelogrammum quodcunque rectangulum: Et quid sit, parallelogrammum contineri sub duabus lineis rectis. Quod ut intelligatur, explicandum primum est, Parallelogrammum illud dici rectangulum, cujus

cujus omnes anguli sunt recti. Cujus quidem duo tantum sunt genera. Quadratum, & Altera parte longius. In his enim omnes anguli sunt recti, ut perspicuum est ex eorum definitionibus. In omni porro parallelogrammo, si unus angulus dumtaxat detur rectus, erunt & reliqui tres necessario recti.

Sit enim in parallelogrammo $ABCD$, angulus A , TAB. VII.
fig. 8.
rectus. Dico reliquos tres angulos B , C , D , rectos quoque esse. Nam cum parallela sint AD , BC , a erunt anguli A , & B , interni duobus 229. primi
rectis aequales: At angulus A , rectus est, ex hypothesis. Igitur & B , rectus erit. Quoniam vero b quilibet suo opposito est aequalis, ut angulus A , b 34. primi
angulo C , & angulus B , angulo D ; erunt & anguli C , & D , recti.

Dicit itaque Euclides, quodlibet parallelogrammum rectangulum contineri sub duabus rectis lineis, qua unum ejus angulum rectum continent, Ut parallelogrammum rectangulum $ABCD$, contineri dicitur sub duabus lineis rectis AB , AD ; vel sub AD , DC ; vel sub DC , CB , vel denique sub AB , BC : quoniam qualibet hujusmodi dua linea exprimunt totam parallelogrammi magnitudinem, una quidem ut AB , vel DC , ejus longitudinem, altera vero, ut AD , vel BC , ejus latitudinem. Unde expressis duabus lineis, qua angulum rectum continent in parallelogrammo rectangulo, statim tota ejus quantitas concipitur, intelligiturque, longitudo nimirum, atque latitudo. Accedit etiam, quod ex motu imaginario unius linea in alteram hujusmodi parallelogrammum conficitur. Si namque animo concipiatur recta AB , deorsum secundum rectam AD , moveri in transversum, ita ut semper angulum rectum cum AD , constituat, donec punctum A , ad punctum D , & punctum B , ad punctum C , perveniat, descriptum
erit

§ EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

erit totum parallelogrammum $ABCD$. Idem fiet, si AD , ponatur moveri transversum secundum rectam, AB , &c. Quamobrem jure optimo sub talibus duabus lineis rectis continere dicitur parallelogrammum rectangulum.

Itaque parallelogrammum rectangulum; quod sub duabus rectis lineis contineri dicitur, erit illud, cujus duo latera circa unum angulum rectum equalia sunt duabus illis rectis lineis, utrumque utriusque. Ut
TAB. VII. parallelogrammum rectangulum sub rectis E , & F ,
Fig. 9. contentum, erit idem, quod parallelogrammum $ABCD$: quoniam latus AB , aequale est rectæ E , & latus AD , rectæ F .

Perpicuum autem est ex dictis, parallelogrammum rectangulum contentum sub duabus lineis equalibus esse quadratum. Cum enim quælibet illarum linearum equalium equalis sit lineæ oppositæ, erunt omnia quatuor parallelogrammi rectanguli latera equalia. Quare ex definitione quadrati, quadratum erit.

Item manifestum est, si due rectæ lineæ aliis duabus rectis lineis æquales fuerint, utraq; utriusque, rectangulum parallelogrammum sub prioribus duabus comprehensum, æquale esse ei, quod sub duabus posterioribus comprehenditur, parallelogrammo rectangulo: quoniam & anguli, & latera unius equalia sunt & angulis, & lateribus alterius. Quod tamen facile hac etiam ratione demonstrari potest. Sint
TAB. VIII rectæ AB , BC , æquales rectis DE , EF , utraq;
Fig. 1. utriusque. Dico parallelogrammum rectangulum $ABCG$, contentum sub AB , BC , æquale esse parallelogrammo rectangulo $DEFH$, contentio sub DE , EF . Ductis etenim diametris AC , DF , cum latera AB , BC , trianguli ABC , equalia sint lateribus DE , EF , trianguli DEF , & anguli B , & E , equalis,

TAB. VII.

Fig. 2.





Fig. 4.






Fig. 8.




Fig. 9.

D



LIBER SECUNDUS. 81

les, nempe recti; cerunt triangula ABC , DEF , c. 4 primi aequalia. Eadem ratione aequalia erunt triangula AGC , DHF . Quare tota parallelogramma $ABCG$, $DEFH$, aequalia erunt.

Obiter quoque monendus mihi lector videtur, Euclidem in hoc secundo libro, & in aliis, qui sequuntur, parallelogrammum rectangulum appellare simpliciter rectangulum; quod etiam ceteri Geometrae observant, ita ut nomine rectanguli perpetuo intelligendum sit parallelogrammum rectangulum. Rursus, ne toties eadem litera repetantur, solent Geometrae exprimere parallelogrammum tam rectangulum, quam non rectangulum duobus duntaxat literis, quae per diametrum opponuntur. Ut appositum parallelogrammum appellant AC , vel BG .

TAB. VIII
fig. 1.

DEFINITIO. II.

In omni parallelogrammo spatio, unumquodlibet eorum, quae circa diametrum illius sunt, parallelogrammorum, cum duobus complementis, Gnomon vocetur.

IN parallelogrammo $ABCD$, sive rectangulum TAB. VIII illud sit, sive non, ducatur diameter, AC , ex fig. 2, 3. cujus puncto quolibet G , ducantur rectae EF , HI , parallelae lateribus parallelogrammi, ita ut parallelogrammum divisum sit in quatuor parallelogramma, quorum duo EH , IF , dicuntur esse circa diametrum, alia vero duo BG , GD , complementa, ut manifestum est ex ultima definitione primi lib. Itaque figura composita ex parallelogrammo utrolibet circa diametrum, ut ex IF , una cum duobus complementis BG , GD , qualis est figura $EBCDHGE$, quam complectitur circumferentia KLM , dicitur Gnomon. Eadem ratione figura $FDABIGF$,

F

com-

82. EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

composita ex parallelogrammo EH, circa diametrum, & duobus complementis BG, GD, Gnomon appellabitur.

I. THEOR. I. PROPOS. I.

. Si fuerint duæ rectæ lineæ, seceturque ipsarum altera in quocumque segmenta: Rectangulum comprehensum sub illis duabus rectis lineis, æquale est eis, quæ sub infecta, & quolibet segmentorum comprehenduntur, re-ctangulis.

TAB. VII.
fig. 2.

Sint duæ rectæ A, & BC, quarum BC, secetur quomodocumque in quolibet segmenta BD, DE, EC. Dico rectangulum sub A, & BC, comprehensum æquale esse omnibus rectangulis simul sumptis, quæ sub linea indivisa A, & quolibet segmento comprehenduntur, nempe rectangulo sub A, & BD; Item sub A, & DE; Item sub A, & EC, comprehenso.

Rectangulum enim BF, comprehendatur sub A, & BC, hoc est, recta GB, æqualis sit rectæ A. Quod quidem fiet, si erigantur ad BC, duæ perpendiculares BG, CF, æquales rectæ A, ducaturque recta FG. Nam rectæ BG, CF, & parallelæ erunt, ob rectos angulos B, C: Sed & æquales inter se sunt, quod utraque rectæ A, æqualis ponatur. Igitur erunt quoque FG, BC, parallelæ, & æquales inter se: ac proinde rectangulum erit BF, contentum sub A, sive GB, & BC, ex defin. 1. hujus lib. Deinde ex D, & E, ducantur rectæ DH, EI, parallelæ ipsi BG, vel CF. Itaque DH, EI, cum parallelæ sint ipsi BG, d inter se quoque parallelæ erunt. Rursus eadem, cum ex constructione parallelogramma sint BH, BI, æquales erunt rectæ BG, ac propterea rectæ A. Quoniam igitur recta BG, æqualis

æqualis est rectæ A, erit rectangulum BH, comprehensum sub infecta linea A, & segmento BD. Eadem ratione erit rectangulum DI, comprehensum sub A, & segmento DE. Item rectangulum EF, sub A, & segmento EC. Quare cum rectangula BH, DI, EF, æqualia sint toti rectangulo BF; perspicuum est, rectangulum comprehensum sub A, & BC, æquale esse rectangulis omnibus, quæ sub A, & segmentis BD, DE, EC, comprehenduntur. Si ergo fuerint duæ rectæ lineæ, seceturque ipsarum altera, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 2. PROPOS. 2. ij.

Si recta linea secta sit utcunque: Rectangula, quæ sub tota, & quolibet segmentorum comprehenduntur: æqualia sunt ei, quod à tota fit, quadrato.

RECTA linea AB, dividatur utcunque in C, duas in partes. Dico duo rectangula comprehensa sub tota AB, & segmentis AC, CB, simul sumpta, æqualia esse quadrato totius lineæ AB. Describatur enim AD, quadratum lineæ AB, & ex C, ducatur CF, parallela rectæ AE, vel BD, quæ æqualis erit rectæ AE, hoc est, rectæ AB, cui æqualis est recta AE, ex definitione quadrati. Quoniam igitur recta AE, æqualis est rectæ AB, erit rectangulum AF, comprehensum sub tota AB, & segmento AC. Similiter erit rectangulum CD, comprehensum sub tota AB, & segmento CB. Quare cum rectangula AF, CD, æqualia sint quadrato AD, perspicuum est, rectangula comprehensa sub AB, & segmentis AC, CB, æqualia esse quadrato lineæ AB. Si igitur recta linea secta sit utcunque, &c. Quod demonstrandum erat.

Aliter. Sumatur recta D, æqualis rectæ AB. Quoniam igitur AB, divisa est in C, erit rectangulum

TAB. VIII. fig. 5.

c 46. primi

a 34. primi

TAB. VII.

fig. 6.

F 2

gulum

84 *EUCLIDIS GEOMETRIÆ.*

b 1. *sec.* **AB**, hoc est, quadratum rectæ **AB**, & æquale duobus rectangulis, quæ comprehenduntur sub **D**, infecta, hoc est, sub **AB**, & singulis segmentis **AC**, **CB**, quod est propositum.

ũj. THEOR. 3. PROPOS. 3.

Si recta linea secta sit utrunque: Rectangulum sub tota, & uno segmentorum comprehensum æquale est & illi, quod sub segmentis comprehenditur, rectangulo, & illi, quod à prædicto segmento describitur, quadrato.

TAB. VIII. **L** *fig. 7. 8.* Inca recta **AB**, divisa sit utrunque in puncto **C**. Dico rectangulum comprehensum sub tota **AB**, & utrovis segmento, ut **AC**, (sive hoc segmentum majus sit uti in *fig. 7.* sive minus uti in *fig. 8.*) æquale esse rectangulo sub segmentis **AC**, **CB**, comprehenso, & quadrato prioris segmenti assumpti **AC**. Constituatur enim quadratum dicti segmenti **AC**, quod sit **AD**: & ex **B**, educatur **BF**, parallela ipsi **AE**, donec coeat cum **ED**, protracta in **F**. Quoniam igitur **AE**, recta, recta **AC**, æqualis est, ex quadrati definitione; erit rectangulum **AF**, comprehensum sub tota **AB**, & segmento **AC**. Rursum, quia recta **CD**, eadem ratione æqualis est rectæ **AC**; erit rectangulum **CF**, comprehensum sub segmentis **AC**, & **CB**. Cum igitur rectangulum **AF**, æquale sit quadrato **AD**, & rectangulo **CF**; liquido constat, rectangulum sub **AB**, tota, & segmento **AC**, comprehensum esse æquale rectangulo comprehenso sub segmentis **AC**, **CB**, & quadrato prædicti segmenti **AC**. Itaque si recta linea secta sit utrunque, &c. Quod erat ostendendum.

TAB. VIII. *fig. 9.* Aliter. Accipiat recta **D**, æqualis segmento **AC**. Quoniam igitur recta **AB**, divisa est in **C**,
erit

L I B E R S E C U N D U S . 85

erit rectangulum comprehensum sub D, & AB, hoc est, sub AB, & AC, a æquale rectangulo sub D, & CB, hoc est, sub AC, CB, & rectangulo sub D, & AC, hoc est, quadrato segmenti AC. Quod est propositum.

T H E O R . 4 . P R O P O S . 4 . iv.

Si recta linea secta sit utcumque : Quadratum, quod à tota describitur, æquale est & illis, quæ à segmentis describuntur, quadratis, & ei, quod bis sub segmentis comprehenditur, rectangulo.

R E C T A linea AB divisa sit utcumque in C. Di- TAB. VIII,
fig. 10.
co quadratum totius rectæ AB, æquale esse quadratis segmentorum AC, CB, & rectangulo comprehenso bis sub segmentis AC, CB. Describatur enim super AB, quadratum AD, ducaturque diameter BE. Deinde ex C, agatur CF, parallela rectæ BD, secans diametrum in G, puncto, per quod rursus ducatur HI, parallela rectæ AB. Eritque quadratum AD, divisum in quatuor parallelogramma. Quoniam igitur trianguli ABE, duo latera AB, AE, æqualia sunt; a erunt duo anguli ABE, AEB, æquales: Atqui b tres anguli ABE, AEB, BAE, trianguli ABE, duobus rectis sunt æquales, & BAE, rectus est. Reliqui ergo duo anguli ABE, AEB, semirecti erunt. Eadem ratione ostendes angulos DBE, DEB, semirectos esse. Quia ergo anguli quoque tres trianguli EFG, c æquales sunt duobus rectis, & d angulus EFG, rectus est, e cum sit æqualis recto D, externus interno; nec non FEG, ostensus semirectus; erit & reliquus EGF, semirectus; ideoque æqualis angulo FEG. Quare f æqualia erunt latera EF, FG: quæ cum sint g æqualia oppositis lateribus GH, HE, erit parallelogrammum FH, quadratum, cum omnia ejus latera
F 3 sint

a 5. primi
b 32. primi
c 32. primi
d 29. primi
e 6. primi
f 34. primi

86 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

sunt æqualia, & omnes anguli recti; propterea quod existente uno angulo recto, nempe FEH, vel F, in parallelogrammo FH, omnes quatuor recti sunt, ut ad defin. 1. hujus lib. demonstravimus. Eadem ratione quadratum erit CI. Quamobrem CI, FH, quadrata sunt segmentorum AC, CB, quod latus HG, g æquale sit rectæ AC. Rectangula quoque AG, DG, comprehensa erunt sub segmentis AC, CB, propterea quod CG, GI, æquales sunt rectæ CB, ob quadratum CI: & FG æqualis rectæ GH, ob quadratum FH, hoc est, h rectæ AC. Quocirca cum quadratum AD, æquale sit quadratis CI, FH, & rectangulis AG, DG; constat quadratum AD, totius lineæ AB, æquale esse quadratis segmentorum AC, CB, & rectangulo comprehenso sub eisdem segmentis AC, CB, b's sumpto. Igitur si recta linea secta sit utcumque, quadratum, quod à tota describitur, &c. Quod demonstrandum erat.

g 34. primi

h 34. primi

TAB. VIII.

fig. 11.

i 2. sec.

k 3. sec.

Aliter. Quoniam recta AB, divisa est in C, i erit quadratum totius AB, æquale rectangulis, quæ sub tota AB, & segmentis AC, CB, comprehenduntur: Rectangulum autem sub AB, AC, comprehensum, k æquale est rectangulo comprehenso sub AC, CB, & quadrato segmenti AC: Item rectangulum sub AB, CB, comprehensum, æquale est rectangulo sub CB, AC, comprehenso, & quadrato segmenti CB. Igitur quadratum rectæ AB, æquale etiam est quadratis segmentorum AC, CB, & rectangulis sub AC, CB, & sub CB, AC. Quod est propositum.

COROLLARIUM I.

Hinc manifestum est, parallelogramma circa diametrum quadrati esse quadrata.

COROLLARIUM II.

Sequitur etiam ex demonstratione hujus propof. 4. diametrum cujusvis quadrati dividere ejus angulos biseriam,

riam. Probatum enim fuit angulos AEB, DEB, esse TAB.VIII
femircos, uti angulos DEB, & DBE. fig. 10.

THEOR. 5. PROPOS. 5. v.

Si recta linea secetur in æqualia, & non æqualia: Rectangulum sub inæqualibus segmentis totius comprehensum, una cum quadrato, quod ab intermedia sectionum, æquale est ei, quod à dimidia describitur, quadrato.

Dividatur recta AB, bifariam in C, & per TAB.VIII
inæqualia in D, ut sectionum intermedia sit fig. 12.
recta CD, qua nimirum dimidia CB, minus segmentum DB, superat, vel qua majus segmentum AD, dimidium AC, excedit. Dico rectangulum sub segmentis inæqualibus AD, DB, comprehensum, una cum quadrato rectæ CD, quæ inter duas est sectiones, æquale esse quadrato dimidiæ CB. Describatur enim CF, quadratum super dimidia CB; & ducta diametro BE, ducatur ex D, recta DG, parallela rectæ BF, secans diametrum BE, in H, puncto, per quod ducatur rectæ BC, parallela IK: Item ex A, rectæ CE, parallela AL, secans IK, productam in L. Erunt igitur per corollarium i. præcedentis propos. DI, KG, quadrata, ideoque DH, recta rectæ DB, æqualis: Est autem & KH, ipsi CD, æqualis. a 34. primæ
Quare rectangulum AH, comprehenditur sub AD, DB. & KG, erit quadratum rectæ CD; Probandum itaque est, rectangulum AH, una cum quadrato KG, æquale esse quadrato CF. Quoniam ergo b complementa CH, FH, æqualia b 43. primæ sunt; si addatur commune quadratum DI, erit parallelogrammum DF, parallelogrammo CI, æquale: Est autem & AK, eidem CI, æquale, c 36. primæ quod & bases AC, CB, æquales sint. Igitur DF, AK, æqualia etiam inter se erunt: quibus si commune apponatur CH, erit gnomon MNO, rectangulo AH æqualis. Quocirca cum gnomon MNO,

& quadratum KG , æqualia sint quadrato CF ; erit & rectangulum AH , una cum quadrato KG , æquale eidem quadrato CF . Si recta ergo linea secetur in æqualia, & non æqualia, &c. Quod ostendendum erat.

vi. THEOR. 6. PROPOS. 6.

Si recta linea bifariam secetur, & illi recta quædam linea in rectum adjiciatur, Rectangulum comprehensum sub tota cum adjecta & adjecta, una cum quadrato à dimidia, æquale est quadrato à linea, quæ tum ex dimidia, tum ex adjecta componitur, tanquam ab una, descripto.

TAB. VIII.
Fig. 13.

SECetur recta AB , bifariam in C , & ei in rectum addatur BD . Dico rectangulum comprehensum sub tota composita AD , & DB , adjecta, una cum quadrato dimidiæ CB , æquale esse quadrato lineæ CD , quæ ex dimidia CB , & adjecta BD , componitur. Describatur namque CE , quadratum super CD , & ducta diametro DF , ducatur ex B , recta BG , parallela rectæ DE , secans diametrum DF , in H , puncto, per quod agatur IK , parallela rectæ CD : Item ex A , ducatur rectæ CF , parallela AL , secans IK , productam in L . Erunt igitur per corollarium i. propof. 4. hujus lib. BI , KG , quadrata, ideoque recta DI , rectæ DB , æqualis: α Est autem & KH , rectæ CB , æqualis. Quare rectangulum AI , comprehendetur sub rectis AD , DB ; & KG , erit quadratum rectæ CB . Probandum itaque est, rectangulum AI , una cum quadrato KG , æquale esse quadrato CE . Quoniam ergo parallelogrammum AK , b æquale est parallelogrammo CH , quod bases AC , CB , æquales sint: ϵ Est autem & parallelogrammum HE , eidem CH , æquale, complementum complemento; erunt AK , HE , æqualia inter se. Addito ergo communi CI , erit rectangulum

gulum AI, gnomoni MNO, æquale. Quocirca cum gnomon MNO, & quadratum KG, quadrato CE, sint æqualia; erit & rectangulum AI, una cum eodem quadrato KG, eidem quadrato CE, æquale. Itaque si recta linea bifariam fecetur, & illi recta quædam linea in rectum adiciatur, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 7. PROPOS. 7. vij.

Si recta linea fecetur utcunque; Quod à tota, quodque ab uno segmentorum, utraque simul quadrata, æqualia sunt & illi, quod bis sub tota, & dicto segmento comprehenditur, rectangulo, & illi, quod à reliquo segmento fit, quadrato.

SEcetur recta AB, utcunque in C. Dico quadratum totius AB, & quadratum segmenti five majoris, five minoris AC, æqualia esse rectangulo bis comprehenso sub tota AB, & dicto segmento AC, una cum quadrato reliqui segmenti CB. Describatur enim super AB, quadratum AD, & ducta diametro BE, ducatur ex C, recta CF, parallela rectæ AE, secans diametrum in puncto G, per quod agatur HI, parallela rectæ AB. Erunt igitur per corollarium 1. propos. 4. hujus lib. CI, HF, quadrata: & quia recta GH, æqualis est rectæ AC, erit HF, quadratum segmenti AC. Rursus quia AE, æqualis est ipsi AB, erit rectangulum AF, comprehensum sub tota AB, & segmento AC. Eadem ratione rectangulum HD, comprehensum erit sub eisdem rectis AB, AC, quod rectæ DE, EH, æquales sint rectis AB, AC, ob quadrata AD, FH. Quoniam igitur rectangulis AF, FI, una cum quadrato CI, hoc est, gnomoni KLM, una cum quadrato CI, æquale est quadratum AD; si apponatur commune quadratum HF, erunt quadrata AD, HF, æqualia rectangulis

F \int AF,

TAB. VIII
fig. 14. 15.
a 34. primi

90 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

AF, DH. (quorum quodlibet comprehenditur sub tota AB, & segmento AC,) una cum CI, quadrato reliqui segmenti CB. Si igitur recta linea secetur utcunque, &c. Quod erat demonstrandum.

vij. THEOR. 8. PROPOS. 8.

Si recta linea secetur utcunque: Rectangulum quater comprehensum sub tota, & uno segmentorum, cum eo, quod à reliquo segmento fit, quadrato, æquale est ei, quod à tota, & dicto segmento, tanquam ab una linea describitur, quadrato.

TAB. VII. **fig. 16, 17.** Sit recta AB, in C, divisa utcunque. Dico rectangulum quater comprehensum sub AB, & segmento sive majore, sive minore CB, una cum quadrato reliqui segmenti AC, æquale esse quadrato lineæ, quæ ex recta AB, & dicto segmento CB, componitur. Producatnr enim AB, versus dictum segmentum CB, ad D, sitque BD, recta æqualis segmento CB; & super tota AD, quadratum describatur AE. Ducta autem diametro DF, ducantur BG, CI, parallelæ ipsi DE, secantes diametrum in H, K, punctis, per quas circantur LM, OP, parallelæ ipsi AD, quæ fecerint priores parallelas in N, Q. Erunt igitur per corollarium 1. propos. 4. hujus lib. OI, NQ, BM, LG, CP, circa diametrum DF, quadrata. Et quia OK, a æqualis est rectæ AC; erit OI, quadratum segmenti AC. Rursus b quia NH, æqualis est rectæ CB, erit NQ, quadratum segmenti CB, ideoque quadrato BM, æquale, cum rectæ CB, BD, æquales sint. Quare rectæ BH, HQ, æquales sunt segmento CB; atque adeo duo rectangula AH, LQ, comprehensa erunt sub AB, & segmento CB, c cum LH, sit æqualis rectæ AB. Eadem ratione erunt duo rectangula NG, HE, comprehensa sub AB, & CB; cum

a 34. primi

b 34. primi

c 34. primi

LIBER SECUNDUS. 91

cum NH, HM, rectæ d æquales sint rectis CB, ^{d 34. prim.}
 BD; & rectæ GH, EM, rectæ FL, hoc est, re-
 ctæ LH, hoc est, rectæ AB. Et quia quadrata
 NQ, BM, æqualia sunt; si addatur commune
 KG, erunt BM, KG, simul æqualia rectangulo
 NG. Quapropter quinque rectangula AH, LQ,
 HE, BM, & KG, gnomonem RST, compo-
 nentia, æqualia sunt rectangulo quater compre-
 hensio sub recta AB, & segmento CB. Cum
 igitur gnomon RST, & quadratum OI, æqualia
 sint quadrato AE; erit rectangulum quater com-
 prehensum sub data recta AB, & segmento CB,
 una cum quadrato reliqui segmenti AC, æquale
 quadrato lineæ AD, compositæ ex AB, & dicto
 segmento CB. Quamobrem, si recta linea secetur
 utcunque, &c. Quod demonstrandum erat.

THEOR. 9. PROPOS. 9. ^{viii.}






Si recta linea secetur in æqualia, & non
 æqualia: Quadrata, quæ ab inæqualibus tō-
 tius segmentis fiunt, simul duplicia sunt, &
 ejus, quod à dimidia, & ejus, quod ab
 intermedia sectionum fit, quadrati.


SECetur recta AB, bifariam in C, & non bifariam in D. Dico quadrata segmentorum inæ- ^{TAB. VII.}
 qualium AD, DB, simul dupla esse quadratorum ^{fig. 18.}
 simul, quæ fiunt ex dimidia AC, & ex interme-
 dia sectionum CD. Educatur enim ex C, ad
 AB, perpendicularis CE, quæ sit æqualis dimi-
 diæ AC, vel CB, ducanturque rectæ EA, EB.
 Deinde ex D, ducatur quoque ad AB, perpendi-
 cularis DF, secans EB, in puncto F, per quod
 ducatur FG, parallela ipsi AB, secans CE, in
 G, ducaturque tandem AF. Quoniam igitur in
 triangulo ACE, latera CA, CE, æqualia sunt;
 erunt anguli CAE, CEA, æquales: Est autem ^{a 5. prim.}
 angulus ACE, rectus: Reliqui igitur b anguli ^{b 32. prim.}
 alium rectum facient, ideoque AEC, semire-
 ctus

92 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Cuius erit. Eadem ratione angulus BEC, semi-
 rectus erit; ac propterea totus AEB, rectus. Rur-
 sus, quia trianguli FGE, angulus EGF, *c* æqua-
 lis est recto ECB, externus interno; *d* erunt reli-
 qui duo anguli uni recto æquales: Ostensum au-
 tem est, angulum FEG, esse semirectum. Igitur
 & EFG, semirectus erit, proptereaque anguli
 EFG, FEG, æquales erunt, *e* ideoque & latera
 EG, GF, æqualia inter se. Eodem modo osten-
 detur, in triangulo BDF, latera BD, DF, esse
 æqualia. Nam angulus FDB, est rectus, & B,
 semirectus, &c. Itaque cum in triangulo ACE,
 angulus C, rectus sit, *f* erit quadratum lateris
 AE, æquale duobus quadratis laterum AC, CE:
 Atqui hæc duo quadrata inter se sunt æqualia,
 quod & lineæ AC, CE, æquales sint. Igitur
 quadratum lateris AE, duplum erit quadrati la-
 teris AC. Rursum, quia in triangulo EGF, an-
 gulus G, rectus est, erit quadratum lateris EF,
 æquale duobus quadratis laterum EG, GF: At
 duo hæc quadrata inter se æqualia sunt, ob æ-
 qualitatem linearum EG, GF. Igitur quadratum
 lateris EF, duplum erit quadrati lateris FG, hoc
 est, quadrati lineæ CD. Est enim CD, *b* rectæ
 FG, æqualis; cum CF, sit parallelogram-
 mum. Quare duo quadrata rectarum AE, EF,
 dupla sunt duorum quadratorum linearum recta-
 rum, AC, CD: Sunt autem duo quadrata recta-
 rum AE, EF, *i* æqualia quadrato rectæ AF; &
 quadratum rectæ AF, æquale duobus quadratis
 rectarum AD, DF. Igitur & duo quadrata re-
 ctarum AD, DF, dupla sunt duorum quadrato-
 rum rectarum AC, CD: Atqui quadratum rectæ
 DF, æquale est quadrato rectæ DB. Ostensum
 enim est rectas DF, DB, esse æquales. Quare
 duo quoque quadrata rectarum AD, DB, seg-
 mentorum inæqualium, dupla sunt quadratorum
 rectarum AC, CD, dimidiæ lineæ, & interme-
 diæ sectionum. Si ergo recta linea secetur in æ-
 qualia, & non æqualia &c. Quod erat demon-
 strandum.

THEOR.





THEOR. 10. PROPOS. 10. 2.

Si recta linea secetur bifariam, adjiciatur autem ei in rectum quæpiam recta linea: Quod à tota cum adjuncta, & quod ab adjuncta, utraque simul quadrata, duplicia sunt, & ejus, quod à dimidia, & ejus, quod à composita ex dimidia & adjuncta, tanquam ab una, descriptum sit, quadrati.

Secetur recta AB, bifariam in C, & ei in rectum *TAB. IX.*
 addatur BD. Dico duo, quadrata rectorum *fig. 1.*
 AD, BD, simul dupla esse quadratorum simul,
 quæ ex rectis AC, CD, describuntur. Super
 AB, enim ex C, erigatur perpendicularis CE,
 quæ sit æqualis dimidiæ AC, vel CB, & jun-
 gantur rectæ AE, EB. Per D, deinde educatur
 DF, ipsi CF, parallela, occurrens rectæ EB,
 protractæ in G, & per E, ducatur rectæ CD,
 parallela EF, secans DF, in F, jungaturque re-
 ctæ AG. Ostendetur jam, angulum AEB, esse
 rectum, ut in præcedenti propos. & CEB, semi-
 rectum; a ideoque ejus alternum EGF, semire-
 ctum quoque; b Est autem angulus F, rectus,
 cum in parallelogrammo CF, recto angulo C,
 opponatur. c Igitur & reliquis FEG, semirectus
 erit, & propterea ipsi EGF, æqualis. Quare
 d rectæ EF, FG, angulis FEG, EGF, oppositæ;
 æquales quoque erunt. Eadem arte ostendes
 rectas BD, DG, esse æquales, propterea quod
 angulus BDG, sit rectus, & BGD, semirectus,
 &c. Quoniam igitur quadratum rectæ AE, e æ-
 quale est quadratis æqualibus rectorum æqualium
 AC, CE; erit quadratum rectæ AE, duplum
 quadrati rectæ AC. Rursus quia quadratum re-
 ctæ EG, f quadratis æqualibus rectorum æquali-
 um EF, FG, æquale est, erit quoque quadra-
 tum rectæ EG, duplum quadrati rectæ EF, hoc
 est, rectæ CD, g cum CD, recta æqualis sit re-
 ctæ

a 19. primi

b 34. primi

c 32. primi

d 6. primi

e 47. primi

f 47. primi

g 34. primi

¶ EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ctæ EF. Duo igitur quadrata rectorum AE, EG, dupla sunt quadratorum ex rectoris AC, CD, descriptorum. Atqui duobus quadratis rectorum AE, EG, æquale est *b* quadratum rectoris lineæ AG; & quadrato rectoris AG, æqualia sunt duo quadrata, quæ ex duabus lineis rectoris AD, DG, describuntur. Quadrata ergo rectorum AD, DG, dupla sunt quadratorum ex rectoris AC, CD, descriptorum. Cum igitur quadratum rectoris DG, æquale sit quadrato rectoris BD; erunt quoque quadrata rectorum AD, DB, dupla quadratorum, quæ ex rectoris AC, CD, describuntur. Itaque si recta linea secetur bitariam, &c. Quod ostendendum erat.

xi. P R O B L. I. P R O P O S. II.

Datam rectoram lineam secare, ut comprehensum sub tota, & altero segmentorum rectorum, æquale sit ei, quod à reliquo segmento fit, quadrato.

TAB. IX.
fig. 1.

Data sit rectora AB, quam secare oportet in duas partes, ita ut rectorum comprehensum sub tota AB, & altero ejus segmentum, nempe minori, æquale sit quadrato reliqui segmentum, nimirum majoris. Describatur ex AB, quadratum AC, & diviso latere AD, quod cum linea data AB, angulum rectorum efficit, bitariam in E, jungatur rectora EB, cui ex EA, producta æqualis sumatur EF, & ipsi AF, abscindatur ex rectora AB, data æqualis AG. Est enim AB, major, quam AF. Nam cum EB, sit æqualis ipsi EF, ex constructione; & sint autem latera AE, AB, majora latere EB; Erunt quoque rectoræ EA, AB, majores rectora EF: ac proinde ablata communi AE, reliqua AB, major erit, quam reliqua AF. Dico rectoram AB, sectam esse in G, ita ut rectorum comprehensum sub AB, BG, æquale sit

fit quadrato rectæ AG; adeo ut AG, fit majus segmentum, & BG, minus. Ducatur enim per G, recta HI, parallela rectæ DF, secans CI, in I; Ac per F, ducatur ipsi AG, parallela FH, secans HI, in H. Erit igitur parallelogrammum AH, quadratum segmenti AG, cum omnia ejus quatuor latera sint æqualia, quippe cum \sphericalangle FH, *b 34. primi* GH, æqualia sint oppositis AG, AF; æqualibus; omnesque anguli ejusdem recti ob rectum A, ut ad defin. 1. hujus libri ostendimus. Rectangulum quoque CG, comprehensum erit sub AB, & segmento BG; quod AB, æqualis sit ipsi BC. Itaque probandum est, rectangulum CG, & quadratum AH, æqualia esse. Quoniam igitur recta DA, divisa est bisariam in E, & ei addita in rectum AF; erit rectangulum sub DF, FA, hoc *c 6. sec.* est, rectangulum DH, (cum FH, sit æqualis ipsi FA;) una cum quadrato dimidiæ AE, æquale quadrato rectæ EF, hoc est, quadrato rectæ EB, quæ rectæ EF, æqualis est: Est autem quadratum rectæ EB, *d 47. primi* æquale quadratis rectarum AE, AB. Quare rectangulum DH, una cum quadrato rectæ AE, æquale quoque est quadratis rectarum AE, AB. Dempto ergo communi quadrato rectæ AE, remanebit rectangulum DH, æquale quadrato rectæ AB, hoc est, quadrato AC. Abato igitur rursus communi rectangulo AI, remanebunt rectangulum CG, & quadratum AH, inter se æqualia. Quod est propositum. Datam igitur rectam AB, secuimus, &c. Quod erat faciendum.

THEOR. II. PROPOS. 12. *xi.*

In amblygoniis triangulis, quadratum, quod fit à latere angulum obtusum subtendente, majus est quadratis, quæ fiunt à lateribus obtusum angulum comprehendentibus, rectangulo bis comprehenso, & ab uno laterum, quæ sunt circa obtusum angulum,

lum, in quod, cum protractum fuerit, cadit perpendicularis, & ab assumpta exterius linea sub perpendiculari prope angulum obtusum.

TAB. IX. **TR**iangulum ABC, habeat angulum ABC, obtusum, & ex A, in latus CB, ad partes anguli obtusi protractum cadat perpendicularis AD. Dico quadratum lateris AC, quod obtuso angulo opponitur, majus esse quadratis laterum AB, BC, rectangulo bis comprehenso sub CB, BD, hoc est, quadratum lateris AC, æquale esse duobus quadratis laterum AB, BC, una cum rectangulo sub CB, BD, bis comprehenso. Cum enim recta CD, divisa sit in B, utcumque *a* erit quadratum rectæ CD, æquale duobus quadratis rectorum CB, BD, & rectangulo comprehenso bis sub CB, BD. Addito igitur communi quadrato rectæ AD, erunt duo quadrata rectorum CD, DA, æqualia tribus quadratis rectorum CB, BD, DA, & rectangulo comprehenso bis sub CB, BD: *b* Est autem quadratis rectorum CD, DA, æquale quadratum rectæ AC. Quare & quadratum rectæ AC, æquale erit tribus quadratis rectorum CB, BD, DA, & rectangulo comprehenso bis sub CB, BD. Cum igitur quadratis rectorum BD, DA, *c* æquale sit quadratum rectæ AB; erit quadratum rectæ AC, æquale quadratis rectorum CB, BA, & rectangulo comprehenso bis sub CB, BD. Quod est propositum. In amblygoniis ergo triangulis, quadratum, quod fit, &c. Quod erat ostendendum.

T H E O R. 12. P R O P O S. 13.

In oxygoniis triangulis, quadratum à latere angulum acutum subtendente minus est quadratis, quæ fiunt à lateribus acutum angulum comprehendentibus, rectangulo bis com-

comprehensio, & ab uno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & ab assumpta interius linea sub perpendiculari prope acutum angulum.

Sint omnes anguli trianguli ABC, acuti & ex A, perpendicularis AD, demissa cadat in latus BC. Dico quadratum lateris AB, quod acuto angulo ACB, opponitur, minus esse quadratis laterum AC, CB, circa angulum acutum dictum, rectangulo bis comprehenso sub BC, CD, hoc est, quadratum lateris AB, una cum rectangulo bis comprehenso sub BC, CD, æquale esse duobus quadratis laterum AC, CB. Cum enim recta BC, divisa sit in D, utcunque, erunt quadrata rectarum BC, CD, æqualia rectangulo comprehenso bis sub BC, CD, & quadrato rectæ BD. Addito ergo communi quadrato rectæ DA, erunt tria quadrata rectarum BC, CD, DA, æqualia rectangulo bis comprehenso sub BC, CD, & duobus quadratis rectarum BD, DA: Duobus autem quadratis rectarum CD, DA, æquale est quadratum rectæ CA. Duo igitur quadrata rectarum BC, CA, æqualia sunt rectangulo bis comprehenso sub BC, CD, & duobus quadratis rectarum BD, DA. Cum ergo duobus quadratis rectarum BD, DA, æquale sit quadratum rectæ AB; erunt duo quadrata rectarum BC, CA, æqualia rectangulo bis comprehenso sub BC, CD, & quadrato rectæ AB, quod est propositum. Eodem modo ostendetur, quadrata rectarum AB, BC, æqualia esse rectangulo bis comprehenso sub CB, BD, & quadrato rectæ AC, hoc est, quadratum lateris AC, minus esse quadratis laterum AB, BC, rectangulo comprehenso bis sub CB, BD. In oxygoniis ergo triangulis, quadratum à latere, &c. Quod demonstrandum erat.

PROBL. 2. PROPOS. 14.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

TAB. IX. Sit datum rectilineum A, cui quadratum æquale
fig. 8, 9. constituendum est. *a* Constituatur parallelo-
a 45. primi grammum BCDE, æquale rectilineo A, habens
 angulum rectum, cujus unum latus, ut DC,
 producatur ad F, sitque CF, recta æqualis rectæ
 BC. Dividatur quoque DF, bifariam in puncto
 G, quod cadet aut in punctum C, aut non.
fig. 8. Si cadit in punctum C, erit recta BC, (cum
 æqualis ponatur rectæ CF) rectæ CD, æqualis.
 Quare rectangulum BD, erit quadratum, cum
b 34. primi latera DE, EB, *b* æqualia sint oppositis lateribus
 BC, CD; atque adeo constitutum erit quadratum
fig. 9. æquale rectilineo A. Si vero punctum G; non
 cadit in C; facto G, centro, describatur inter-
 vallo GD, vel GF, semicirculus FHD, produca-
 turque BC, donec circumferentiam secet in H.
 Dico igitur, quadratum rectæ CH, esse æquale
 rectilineo A. Ducta enim recta GH; quia recta
 DF, dividitur bifariam in G, & non bifariam in
 C; erit rectangulum comprehensum sub DC,
 CF, hoc est, rectangulum BD, una cum qua-
c 5. sec. drato rectæ GC, *c* æquale quadrato rectæ GF,
 hoc est, quadrato rectæ GH; cum rectæ GF,
 GH, sint æquales: At quadratum rectæ GH,
d 47. primi æquale est quadratis rectarum GC, CH. Igi-
 tur rectangulum BD, una cum quadrato rectæ
 GC, æquale quoque erit quadratis rectarum GC,
 CH. Quamobrem dempto communi quadrato
 rectæ GC, remanebit rectangulum BD, hoc est,
 rectilineum A; quadrato rectæ CH, æquale. Da-
 to ergo rectilineo æquale quadratum constituimus:
 Quod facere oportebat.



EUCLIDIS

ELEMENTUM

TERTIUM.

DEFINITIO. I.

Æquales circuli sunt, quorum diametri sunt æquales; vel quorum, quæ ex centris, rectæ lineæ sunt æquales.

Quoniam Euclides hoc 3. lib. varias circuli proprietates demonstrat, idcirco explicat prius terminos quosdam, quorum frequens in eo futurus est usus. Primum itaque docet, eos circulos esse æquales, quorum diametri, vel semidiametri æquales sunt. Cum enim circulus describitur ex circumvolutione semidiametri circa alterum extremum fixum, & immobile, ut lib. I. diximus, perspicuum est, eos circulos esse æquales, quorum semidiametri, seu recta ex centris ducta, sunt æquales; vel etiam quorum tota diametri æquales sunt. Ut si diametri AB , BC , vel recta DF , EG , TAB. IX. è centris D , & E , ducta sint æquales, æquales fig. 10. 11. erunt circuli AFB , & BGC . Sic etiam e contrario, si circuli sint æquales, erunt diametri, vel recta è centris ducta æquales. Ex his liquet, circulos,

100 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

los, quorum diametri, vel recta ducta ex centris sunt inaequales, inaequales esse; ut si diametri BC, HI, vel recta EG, KL, è centris E, & K, ducta sint inaequales; inaequales erunt circuli BGC, & HLI; atque adeo illum, cujus diameter, vel semidiameter major, majorem. Et contra, circulum inaequalium diametros, semidiametrosve inaequales esse, majoris quidem majorem, & minoris minorem.

DEFINITIO. II.

Recta linea circulum tangere dicitur, quæ cum circulum tangat, si producat, circulum non fecat.

TAB. IX. *UT recta AB, si ita circulum BFD, tangat in*
 fig. 13. *B, ut producta ad C, nulla ratione circulum secet, sed tota jaceat extra ipsum, dicetur tangere circulum. At vero recta EF, quia ita eundem circulum tangit in F, ut producta ad G, secet circulum, cadatque intra ipsum, non dicetur circulum tangere, sed secare.*

DEFINITIO. III.

Circuli se se mutuo tangere dicuntur, qui sese mutuo tangentes, se se mutuo non secant.

TAB. IX. *Eodem modo duo circuli AC, BC, se mutuo*
 fig. 14. 15. *dicuntur tangere in C, si ita sese contingant in C, ut neuter alterum secet. Est autem hic contactus circulorum duplex. Aut enim exterius se se circuli tangunt, ut quando unus extra alterum est positus; aut interius, quando unus intra alterum constituitur. Quod si duo circuli ita se mutuo tangant, ut unus alterum*

alterum quoque secet, dicentur circuli illi se mutuo TAB. IX.
secare, & non tangere. Uti circuli ED, & FD. fig. 16.
FD.

DEFINITIO. IV.

In circulo æqualiter distare à centro rectæ
lineæ dicuntur, cum perpendiculares, quæ à
centro in ipsas ducuntur, sunt æquales. Lon-
gius autem abesse illa dicitur, in quam major
perpendicularis cadit.

Quoniam inter omnes lineas rectas, quæ ab aliquo
puncto ad quamlibet lineam rectam ducuntur,
brevissima est perpendicularis, & semper eadem;
alia vero infinitis modis variari possunt, recte distan-
tia illius puncti à linea illa recta accipitur penes lineam
perpendicularem. Uti distantia puncti A, à recta TAB. X.
BC, dicitur esse perpendicularis AD, non autem fig. 1.
AE, vel AF, vel alia quavis, quæ non perpendi-
cularis est; quia AD, omnibus est brevior, ex
coroll. propof. 19. lib. 1. Immo non solum AE,
AF, majores sunt, quam AD, sed etiam ipsa
inter se inæquales sunt. Est enim AF, a major, a 19. primi
quam AE, cum angulus AEF, sit obtusus, &
AFE, acutus, & sic de aliis lineis non perpendicu-
laribus. Quod enim AFE, acutus sit, constat ex
eo; quod in triangulo ADF, duo anguli ADF,
AFD, b minores sunt duobus rectis. Hinc enim b 17. primi
fit, cum ADF, rectus sit, angulum AFB, recto
esse minorem. Eadem ratione angulus AED, osten-
detur acutus. Propterea quod in triangulo ADE,
c duo anguli ADE, AED, minores sunt duobus c 17. primi
rectis, & ADE, rectus est, ac proinde, cum angulo
AED, AEF, d æquales sint duobus rectis, erit d 13. primi
AEF, obtusus. Hinc factum est, ut Euclides æ-
qualem

qualem distantiam retharum in circulo ab
 ero definitis per aequales perpendiculares, &
 TAB. X. lem distantiam per inaequales. Ut dua re
 fig. 2. CD, in circulo ABCD, aequaliter dicent
 à centro E, si perpendiculares EF, EG
 fuerint. At linea CD, longius abesse
 centro E, quam linea HI, si perpendicu
 maior fuerit perpendiculari EK.

DEFINITIO. V

Segmentum circuli est figura, quæ
 linea, & circuli peripheria compren

TAB. X. UT si ducatur in circulo ABCD, ut
 fig. 3. utcumque, dicatur tam figura BAD,
 circumferentia BAD, & recta BD; tam
 BCD, comprehensa recta BD, & arcus
 BCD, circuli segmentum. Ex his caligat
 circuli segmentum. Semicirculus, tam
 BD, per centrum E, incitat: Segmentum
 circulo majus, quando recta BD, non
 centrum, in ipso autem centro erit,
 segmentum BAD; Et Segmentum circuli
 minus, extra quod centrum circuli incidit
 modo est segmentum BCD. Tamen
 Geometri recta BD, circuli, & arcus
 BAD, vel BCD, arcus.

DEFINITION

Segmentum circuli est
 linea, & circuli peripheria

DEFINITION
 Segmentum circuli est
 et circuli peripheria

102 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

TAB. X. *qualem distantiam reſtarum in circulo ab ipſius cen-*
tro definiſeris per aequales perpendiculares, & inaequa-
 ſg. 2. *lem diſtantiã per inaequales. Ut dua recta AB,*
CD, in circulo ABCD, aequaliter dicentur diſtare
à centro E, ſi perpendiculares EF, EG, aequales
ſuerint. At linea CD, longius abeſſe dicitur à
centro E, quam linea HI, ſi perpendicularis EG,
major fuerit perpendiculari EK.

DEFINITIO. V.









Segmentum circuli eſt figura, quæ ſub recta
 linea, & circuli periphèria comprehenditur.

TAB. X. *UT ſi ducatur in circulo ABCD, recta BD,*
 ſg. 3. *uicunque, dicitur tam figura BAD, contenta*
circumferentiã BAD, & recta BD; quam figura
BCD, comprehenſa recta BD, & circumferentiã
BCD, circuli ſegmentum. Ex his colligitur triplex
circuli ſegmentum. Semicirculus, quando recta
BD, per centrum E, incedit; Segmentum ſemi-
circulo majus, quando recta BD, non tranſiſ per
centrum, in ipſo tamen centrum exiſtit, quale eſt
ſegmentum BAD; Et Segmentum ſemicirculo mi-
nus, extra quod centrum circuli conſtituitur, cujuſ-
modi eſt ſegmentum BCD. Vocatur à plerique
Geometris recta BD, chorda, & circumferentiã
BAD, vel BCD, arcus.

DEFINITIO. VI.

Segmenti autem angulus eſt, qui ſub recta
 linea, & circuli periphèria comprehenditur.

Definit jam Euclides tria genera angulorum, qui
 in circulis conſiderantur. Primo loco angulum
 ſegmen-





segmenti, dicens angulum mixtum ABD , vel ADB , TAB. X. contentum sub recta linea BD , & circumferentia $fg. 3.$ BAD , appellari angulum segmenti. Quod si segmentum circuli fuerit semicirculus, dicetur angulus BAC , semicirculi: Si vero segmentum majus semicirculo extiterit, vocabitur angulus ABD , segmenti majoris: Si denique segmentum minus fuerit semicirculo, angulus CBD , segmenti minoris nuncupabitur.

D E F I N I T I O. VII.

In segmento autem angulus est, cum in segmenti peripheria sumptum fuerit quodpiam punctum, & ab illo in terminos rectæ ejus lineæ, quæ segmenti basis est, adjunctæ fuerint rectæ lineæ: Is, inquam, angulus ab adjunctis illis lineis comprehensus angulus est in segmento.

Si segmentum circuli quodcumque ABC , cujus TAB. X. basis recta AC . Ex suscepto quolibet puncto, $fg. 5.$ B , in circumferentia, ducantur ad puncta A , & C , extrema basis, recta linea BA , BC . Angulus igitur retilineus ABC , dicitur existere in segmento ABC .

D E F I N I T I O. VIII.

Cum vero comprehendentes angulum rectæ lineæ aliquam assumunt peripheriam, illi angulus insistere dicitur.

EX puncto A , quolibet suscepto in circumferentia TAB. X. circuli $ABCD$, ducantur recta dua linea AB , $fg. 6.$ AD , ad duo extrema B , & D , circumferentia BCD , cujusque, quam quidem dua recta AB , AD ,
G 4.

AD, assumunt. Angulus itaque rectilineus *BAD*, insistere dicitur circumferentia *BCD*.

Præter tres dictos angulos consideratur etiam à Geometris angulus contingentiæ, qui continetur linea recta tangente circumferentiam, & circumferentia circuli; vel certe duabus circumferentiis se mutuo tangentibus, sive hoc exterius fiat, sive interius. Exemplum.

TAB. X. Si recta *AB*, tangat circumferentiam *CDE*, in *C*; angulus mixtus *ACD*, vel *BCE*, dicitur angulus contingentiæ, sive contactus: Rursus, si circulus *CED*, tangat circumferentiam *EFG*, exterius in *E*; Item circulus *HFI*, circumferentiam *EFG*, interius in *F*; appellabitur tam angulus curvilineus *CEF*, quam *EFH*, vel *GFI*, angulus contactus, seu contingentiæ. Sicut itaque, ut vides, tres anguli contingentiæ, unus quidem mixtus, reliqui vero duo curvilinei.

D E F I N I T I O. IX.

Sector autem circuli est, cum ad ipsius circuli centrum constitutus fuerit angulus, comprehensa nimirum figura & à rectis lineis angulum continentibus, & à peripheria ab illis assumpta.

TAB. X. Si in circulo *ABCD*, cujus centrum *E*, rectæ *AE*, *CE*, constituent angulum *AEC*, ad centrum *E*; nominabitur figura *AECD*, contenta rectis *AE*, *EC*, & circumferentia *ADC*, quam prædicta linea assumunt, Sector circuli.

D E F I N I T I O. X.

Similia circuli segmenta sunt, quæ angulos capiunt æquales: Aut in quibus anguli inter se sunt æquales.

TAB. X. Segmenta videlicet *ABDF*, *DCAE*, ejusdem circuli *ABCDEF*, quæ capiunt hos duos angulos *ABF*.

ABF, DCE, aequales: vel, quod idem est, in quibus iidem anguli aequales existunt, juxta 7. definitionem, similia dicuntur, & ipsa circumferentia quoque ABDF, DCAE, similes.

PROBL. I. PROPOS. I.

Dati circuli centrum reperire.

Si circulus datus ABCD, cujus centrum oportet invenire. Ducatur in eo linea utcuque AC, & quæ bifariam dividatur in E, & per E, ad AC, perpendicularis agatur BD, utrinque in periphæria terminata in punctis B, D. Hac igitur bifariam secta in F; dico F, esse centrum circuli propositi. In ipsa enim recta BD, aliud punctum, præter F, non erit centrum, cum omne aliud punctum ipsam dividat inæqualiter, quandoquidem in F, divisa fuit æqualiter. Si igitur F, non est centrum, sit punctum G, extra rectam BD, centrum, à quo ducantur lineæ GA, GE, GC. Quoniam ergo latera AE, EG, trianguli AEG, æqualia sunt lateribus CE, EG, trianguli CEG; & basis AG, basi CG; (à centro enim duci dicuntur) erunt anguli AEG, CEG, æquales; & ideoque recti: Erat autem & angulus AEF, rectus, ex constructione. Igitur recti AEF, AEG, æquales sunt, pars & totum, quod est absurdum. Non est ergo punctum G, centrum; eademque est ratio de omni alio. Quare F, centrum erit. Itaque dati circuli centrum reperimus. Quod erat faciendum.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, si in circulo recta aliqua linea aliquam rectam lineam bifariam, & ad angulos rectos secet, in secante esse centrum circuli. Nam ex eo, quod BD, recta, rectam AC, bifariam secat in E, & ad angulos rectos, ostensum fuit, punctum ejus medium F, necessario esse circuli centrum.

THEOR.

ij. THEOR. I. PROPOS. 2.

Si in circuli peripheria duo quælibet puncta accepta fuerint; Recta linea, quæ ad ipsa puncta adjungitur, intra circulum cadet.

TAB. X. **IN** circulo ABC, fumantur quælibet duo puncta
fig. 11. ex A, & C, in ejus circumferentia. Dico rectam
 ita ut ipsum fecet. Si enim non cadit intra, ca-
 dat extra, qualis est linea ADC, recta, ut vult
a 1. tertii. adversarius. Invenio *a* igitur centro E, ducan-
 tur ab eo ad puncta assumpta A, & C, nec non
 ad quodvis punctum D, in recta ADC, lineæ
 rectæ EA, EC, ED, secetque ED, circumfe-
 rentiam in B. Quoniam ergo duo latera EA,
 EC, trianguli, cujus basis ponitur recta ADC,
 æqualia sunt, (è centro enim ducuntur) *b* erunt
b 5. primi anguli EAD, ECD, æquales: Est autem angu-
 lus EDA, *c* angulo ECD, major externus
c 16. primi interno opposito, cum latus CD, in triangulo
 ECD, sit productum ad A. Igitur & angulo
 EAD, major erit idem angulus EDA. Quare
 recta EA, majori angulo ADE, opposita, (hoc
 est, recta EB, sibi æqualis;) *d* major erit, quam
d 19. primi recta ED, minori angulo DAE, opposita, pars
 quam totum. Quod est absurdum. Non igitur
 recta ex A, in C, ducta extra circulum cadet,
 sed intra. Eodem enim modo demonstrabitur,
 rectam ductam ex A, in C, non posse cadere
 super arcum ABC, ita ut eadem sit, quæ cir-
 cumferentia ABC. Esset enim recta EA, ma-
 jor, quam recta EB. Quod etiam ex definitione
 rectæ lineæ patet, cum ABC, arcus sit linea
 curva, non autem recta. Itaque si in circuli
 peripheria duo quælibet puncta, &c. Quod erat
 ostendendum.

COROLLARIUM.

Hinc est manifestum, lineam rectam, quæ circumulum tangit, ita ut eum non secet, in uno tantum puncto ipsum tangere. Si enim in duobus punctis eum tangeret, *g* caderet pars rectæ inter ea duo puncta posita, intra *g* 2. *tertii*. circumulum. Quare circumulum secaret, quod est contra hypothesein.

THEOR. 2. PROPOS. 3. ij.

Si in circulo recta quædam linea per centrum extensâ quandam non per centrum extensâ bifariam secet; & ad angulos rectos ipsam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet, bifariam quoque eam secabit.

PER centrum *A*, circuli *BCD*, recta *CE*, *ex-TAB. X.* extensâ dividat rectam *BD*, non per centrum *fig. 12.* extensâ, bifariam in *F*. Dico rectam *AF*, esse ad angulos rectos ipsi *BD*. Ductis enim rectis *AB*, *AD*, erunt duo latera *AF*, *FB*, trianguli *AFB*, duobus *AF*, *FD*, trianguli *AFD*, æqualia; & bases *AB*, *AD*, æquales. *a* Igitur anguli *a* 8. *primi* *AFB*, *AFD*, æquales erunt, hoc est, *d* recti. Quod *d* 10. *def.* erat primo propositum.

Sit jam *AF* ad angulos rectos ipsi *BD*. Dico rectam *BD*, bifariam secari in *F*, à recta *CE*. Ductis enim iterum rectis *AB*, *AD*; cum latera *AB*, *AD*, trianguli *ABD*, sint æqualia, *b* erunt *b* 5. *primi* anguli *ABD*, *ADB*, æquales. Quoniam igitur duo anguli *AFB*, *ABF*, trianguli *ABF*, æquales sunt duobus angulis *AFD*, *ADF*, trianguli *ADF*; & latera *AB*, *AD*, quæ rectis angulis æqualibus opponuntur, æqualia quoque: *c* erunt latera *FB*, *c* 16. *primi* *FD*, æqualia. Quod secundo proponebatur. Si igitur in circulo recta quædam linea per centrum extensâ, &c. Quod demonstrandum erat.

COROLLARIUM.

Ex hac demonstratione facile inferemus, in quovis triangulo duorum laterum æqualium, five æquilaterum illud sit, five isosceles, lineam; quæ basim bifariam fecit, perpendiculararem esse ad basim. Et contra, lineam, quæ ad basim sit perpendicularis, basim secare bitariam. Nam in triangulo ABD, cujus duo latera AB, AD, æqualia sunt, atque adeo ex centro A, per B, D, circulus describi potest: ex eo, quod recta AF, secat basim BD, bifariam, ostensum est, angulos ad F, esse rectos: Et ex eo, quod anguli ad F, recti sunt, demonstratum est, basim BD, à recta AF, bifariam secari.

TAB. X.
fig. 12.

IV. THEOR. 3. PROPOS. 4.

Si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secent, non per centrum extensæ; se se mutuo bifariam non secabunt.

TAB. X.
fig. 13.

DUæ rectæ AB, CD, se mutuo in E, secent in circulo ACBD, non per centrum extensæ. Dico fieri non posse, ut mutuo sese bifariam secent. Si enim una earum per centrum transit, certum, est, eam bifariam non secari: solum enim in centro, per quod altera ponitur non transire, bifariam dividitur: Si vero neutra per centrum extenditur, quamvis una earum nunquam bifariam ab altera dividatur, tamen altera minime secabitur bifariam. Divisa enim sit & AB, & CD, si fieri potest, bifariam in E. *a* Invento igitur centro circuli F, ducatur ab eo ad E, recta EF. Quoniam ergo FE, ponitur secare rectam AB, bifariam in E, *b* secabit ipsam ad angulos rectos. Eadem ratione secabitur CD, ad angulos rectos; cum ponatur bifariam dividi in E. Quare rectus angulus FED, recto angulo FEB, æqualis est, pars toti, quod est absurdum. Itaque si in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuo secent, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR.

THEOR. 4. PROPOS. 5. vi.

Si duo circuli sese mutuo secent, non erit illorum idem centrum.

DUO circuli ABD, EBD, se mutuo secent in TAB. X, B, & D. Dico ipsos non habere idem centrum. *fig. 14.* Sit enim, si fieri potest, idem centrum utriusque, C, à quo duæ rectæ ducantur; CB, quidem ad sectionem B; CA, vero secans utramque circumferentiam in A, & E. Quoniam igitur C, centrum ponitur circuli EBD, erit recta EC, rectæ CB, *b* æqualis. Rursus quia C, centrum quoque ponitur circuli ABD, erit & recta AC, eidem rectæ BC, æqualis. Quare rectæ EC, AC, *a* æquales inter se erunt, pars, & totum, *a* *1. prin.* quod est absurdum. Si igitur duo circuli se se mutuo secent, &c. Quod ostendendum erat.

THEOR. 5. PROPOS. 6. vi.

Si duo circuli sese mutuo interius tangant; eorum non erit idem centrum.

DUO circuli AB, BC, se interius tangant in TAB. X, B. Dico eos non habere idem centrum. *fig. 15.* Habeant enim, si fieri potest, idem centrum D, à quo duæ rectæ ducantur; DB, quidem ad tangentem B. At DC, secans utramque circumferentiam in A, & C. Quoniam igitur D, ponitur centrum circuli AB, erit recta AD, rectæ BD, *b* æqualis. Rursus quia D, ponitur centrum circuli BC, erit recta CD, eidem rectæ BD, æqualis. Quare rectæ AD, & CD, *a* inter se erunt æquales, pars & totum, quod est absurdum. Si igitur duo circuli se se mutuo interius tangant, &c. Quod demonstrandum erat. *a* *1. prin.*

THEOR.

vij.] THEOR. 6. PROPOS. 7.

Si in diametro circuli quodpiam sumatur punctum, quod circuli centrum non sit, ab eoque puncto in circulum quædam rectæ lineæ cadant: Maxima quidem erit ea, in qua centrum, minima vero reliqua; aliarum vero propinquior illi, quæ per centrum ducitur, remotiore semper major est: Duæ autem solum rectæ lineæ æquales ab eodem puncto in circulum cadunt, ad utrasque partes minimæ, vel maximæ.

FAB. X. **fig. 16.** IN diametro AB, circuli ACDEB, cujus centrum F, punctum assumatur quodcunque G, præter centrum, & ex G, cadant in circulum quocunque lineæ GC, GD, GE. Dico omnium, quæ ex G, ad circumferentiam ducuntur, maximam esse GA, in qua est centrum, minimam vero reliquam GB, quæ diametrum perficit: Deinde rectam GC, quæ rectæ GA, per centrum ductæ propinquior est, majorem recta GD, quæ ab eadem GA, plus distat; & eadem ratione GD, majorem recta GE, atque ita de aliis lineis, si ducerentur, in infinitum. Denique ex G, ad utrasque partes minimæ lineæ GB, vel maximæ GA, duci posse tantummodo duas lineas inter se æquales. Ducantur è centro F, ad C, D, & E, rectæ lineæ FC, FD, FE. Quoniam igitur duo latera GF, FC, trianguli GFC, & majora sunt latere GC. Sunt autem rectæ GF, FC, æquales rectis GF, FA, hoc est, toti rectæ GA; erit & GA, major, quam GC. Eadem ratione major erit recta GA, quam GD, & quam GE. Quare GA, maxima est omnium, quæ ex G, in circulum cadunt.

Deinde, quoniam in triangulo EFG, latus EF, minus est duobus lateribus FG, GE. Est autem EF,

LIBERTERTIUS. 111

EF, ipsi FB, æqualis; erit & FB, minor duabus rectis FG, GE. Dempta ergo communi recta FG, remanebit adhuc GB, minor, quam GE. Eadem ratione minor erit GB, quam GD, & quam GC. Quare GB, minima est omnium, quæ ex G, in circuli circumferentiam cadunt.

Rurfus, quia duo latera GF, FC, trianguli GFC, æqualia sunt duobus lateribus GF, FD, trianguli GFD; & angulus totus GFC, major est angulo GFD; erit basis GC, major base GD. Eadem ratione major erit GC, quam GE; Item major erit GD, quam GE. Quare linea propinquior ei, quæ per centrum ducitur, major est ea, quæ remotior.

Fiat jam angulo BFE, ex altera parte æqualis angulus BFH, & ducatur recta GH. Quoniam igitur latera EF, FG, trianguli EFG, æqualia sunt lateribus HF, FG, trianguli HFG, & anguli his lateribus contenti EFG, HFG, æquales; erunt rectæ GE, GH, ex utraque parte ipsius lineæ minimæ GB, vel maximæ GA, æquales inter se. Quod autem nulla alia his duabus possit esse æqualis, constat. Nam si ex G, ducatur alia, quæ cadat supra punctum H, erit ea, cum sit ei, quæ per centrum ducitur, propinquior, major quam GH: si vero cadat infra H, erit ea, cum sit remotior ab eadem GA, per centrum ducta, minor quam GH, ut ostensum fuit. Duæ igitur duntaxat rectæ lineæ æquales ad utrasque partes minimæ GB, vel maximæ GA, cadunt. Itaque si in diametro circuli quodpiam sumatur punctum, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 7. PROPOS. 8.

Si extra circulum sumatur punctum quodpiam, ab eoque puncto ad circulum deducantur rectæ quædam lineæ, quarum una quidem per centrum protendatur, reliquæ vero ut libet:

112 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

libet : In cavam peripheriam cadentium rectarum linearum maxima quidem est illa, quæ per centrum ducitur; aliarum autem propinquior ei, quæ per centrum transit, remotiore semper major est; In convexam vero peripheriam cadentium rectarum linearum minima quidem est illa, quæ inter punctum, & diametrum interponitur; aliarum autem ea, quæ propinquior est minimæ, remotiore semper minor est. Duæ autem tantum rectæ lineæ æquales ab eo puncto in ipsum circulum cadunt, ad utrasque partes minimæ, vel maximæ.

TAB. X.
fig. 17.

EX puncto A, extra circulum BCDEFI, cujus centrum K, lineæ secantes circulum ducantur, quarum AI, per centrum transeat, aliæ vero AH, AG, AF, utcunque. Dico omnium esse maximam AI, quæ per centrum incedit: Deinde rectam AH, quæ rectæ AI, quæ per centrum ducitur, propinquior existit, majorem rectam AG, quæ remotior est ab eadem AI: Et eadem ratione AG, majorem quam AF. E contrario autem, rectam AB, omnium, quæ extra circulum sunt, minimam esse: Deinde rectam AC, quæ vicinior est minimæ AB, minorem esse rectam AD, remotiore; Et eadem ratione, ipsam AD, minorem quam AE. Denique ex A, ad utrasque partes minimæ lineæ AB; vel maximæ AI, duci posse tantummodo duas lineas rectas inter se æquales. Ducantur ex centro K, ad puncta C, D, E, F, G, H, rectæ KC, KD, KE, KF, KG, KH. Quoniam igitur duo latera AK, KH, trianguli AKH, & majora sunt recta AH; Sunt autem rectæ AK, KH, æquales rectæ AK, KI, hoc est, toti rectæ AI; erit & AI, major, quam AH. Eadem ratione erit AI, major, quam AG, & quam AF. Quare AI, est omnium, quæ ex A, in circulum cadunt, maxima. Deinde,

Deinde, quoniam latera AK, KH , trianguli AKH , æqualia sunt lateribus AK, KG , trianguli AKG ; Et angulus totus AKH , major est angulo AKG ; *b* erit basis AH , base AG , major. Eadem ratione major erit AH , quam AF : Item AG , major, quam AF . Quare linea propinquior ei, quæ per centrum ducitur, major est linea remotiore.

Rursus, quia in triangulo ACK , recta AK , minor est duabus AC, CK ; si auferantur æquales BK, CK : remanebit adhuc AB , minor, quam AC . Simili ratione erit AB , minor, quam AD , & quam AE . Quare AB , omnium linearum extra circulum, quæ ex A , ducuntur, minima est.

Rursus, cum intra triangulum ADK , cadant duæ rectæ AC, CK , ab extremitatibus lateris AK ; *d* erunt AC, CK , minores, quam AD, DK . Sublatis igitur æqualibus CK, DK , remanebit adhuc AC , minor, quam AD . Pari ratione erit AC , minor, quam AE , item AD , minor quam AE . Quare linea propinquior minimæ lineæ AB , minor est, quam remotior ab eadem.

Postremo fiat angulus AKC , angulus AKL , æqualis, & ducatur recta AL . Quoniam igitur latera AK, KC , trianguli AKC , æqualia sunt lateribus AK, KL , trianguli AKL ; Sunt autem & anguli AKC, AKL , dictis lateribus contenti æquales; *e* erunt rectæ AC, AL , ex utraque parte minimæ AB , vel maximæ AI , inter se æquales. Quod autem nulla alia his possit esse æqualis, constat. Nam si ex A , ducatur recta cadens ultra L , erit ipsa, cum sit remotior à minima major quam AL . Quod si cadat inter B , & L , erit ea, cum sit minimæ propinquior, minor quam AL , ut ostensum est. Duæ igitur solum rectæ lineæ æquales, ad utrasque partes minimæ, vel maximæ cadunt. Si igitur extra circulum sumatur punctum quodpiam, ab eoque puncto ad circulum deducantur rectæ quædam lineæ, quarum una quidem per centrum protendatur, &c. Quod erat demonstrandum.

H

THEOR.









THEOR. 8. PROPOS. 9.

Si in circulo acceptum fuerit punctum aliquod, & ab eo puncto ad circumulum cadant plures, quam duæ, rectæ lineæ æquales; acceptum punctum centrum est ipsius circuli.

TAB. X.
fig. 12. **A** puncto assumpto A, in circulo BCD, cadant plures rectæ, quam duæ, AB, AC, AD, inter se æquales. Dico A, punctum esse centrum circuli. Connectantur enim puncta B, C, D, rectis BC, CD; quibus divisis bifariam in E, & F, *b* ducantur ex A, rectæ AE, AF. Quoniam igitur latera AE, EB, trianguli AEB, æqualia sunt lateribus AE, EC, trianguli AEC; & bases AB, AC, ponuntur etiam æquales; *a* erunt anguli AEB, AEC, æquales, ideoque recti. Eodem modo ostendemus, angulos ad F, esse rectos. Quare cum rectæ AE, AF, dividant rectas BC, CD, bifariam, & ad angulos rectos, transibit utraque producta per centrum circuli, per corollarium propos. 1. hujus lib. Punctum igitur A, in quo se mutuo secant, centrum erit circuli. Si enim esset aliud punctum centrum, non transiret utraque per centrum. Si itaque in circulo acceptum fuerit punctum, &c. Quod demonstrandum erat.

TAB. XI.
fig. 1. Aliter. Si punctum A, non est centrum circuli, *b* sit centrum inventum E, ex quo per *a* agatur diameter FG. Quoniam igitur in diametro FG, præter centrum acceptum est punctum A, à quo in circumferentiam cadunt rectæ AD, AC; *c* erit recta AD, quæ propinquior est rectæ AG, per centrum E, ductæ major, quam recta AC, remotior ab AG, quod est absurdum. Positæ sunt enim æquales rectæ AD, AC. Idem absurdum sequetur, si aliud punctum præter, A, centrum ponatur.

Quod si quando recta per centrum E, & punctum A, ducta coincidat cum una trium æqualium





lium datarum, ut si dicantur æquales tres AB, AF, AC, ubi EA, coincidit cum AF; *d' erit d 7. servit.* AF, omnium à puncto A, cadentium minima, atque adeo minor, quam AB, & AC, quod est absurdum. Ponitur enim utrique æqualis.

THEOR. 9. PROPOS. 10.

Circulus circulum in pluribus, quam duobus, punctis non secat.

SEcet enim, si fieri potest, circulus ABCDEF, *TAB. XI. fig. 2.* circulum AGBDHE, in pluribus, quam duobus, punctis A, B, & D, quæ jungantur rectis AB, BD: quibus *a* bifariam divisus in I, & K, *a 10. primæ b* educantur ex I, & K, ad AB, & BD, perpendicularares IL, KL. Quoniam igitur rectæ IL, KL, secant rectas AB, BD, in circulo AGBDHE, bifariam, & ad angulos rectos; transibit utraque, ex corollarjo propos. 1. hujus lib. per centrum ipsius. Quare punctum L, in quo se dividunt, erit centrum dicti circuli. Eodem modo demonstrabimus, punctum K, esse centrum circuli ABCDEF. Duo igitur circuli se mutuo secantes idem possident centrum, *c quod c 5. servit.* quod est absurdum. Circulus ergo circulum in pluribus, quam duobus, punctis non secat. Quod erat demonstrandum.

Aliter. Secent se iidem duo circuli, si fieri potest, in tribus punctis A, B, & D. *TAB. XI. fig. 3.* Inventum autem sit I, centrum circuli AGBDHE, *d 1. servit.* à quo ad dicta tria puncta ducantur rectæ IA, IB, ID, quæ per defin. circuli æquales erunt inter se. Quoniam igitur intra circulum ABCDEF, assumptum est punctum I, à quo cadunt in circumferentiam plures, quam duæ rectæ æquales, *e erit e 9. servit.* I, centrum circuli ABCDEF. Erat autem idem punctum I, centrum circuli AGBDHE. Duo ergo circuli se mutuo secantes habent idem centrum. *f Quod est absurdum.*

H 2

THEOR.

THEOR. 10. PROPOS. 11.

Si duo circuli se se intus contingant, atque accepta fuerint eorum centra; ad eorum centra adjuncta recta linea, & producta, in contactum circulorum cadet.

TAB. XI. **Fig. 4.** Tangat circulus ABC, circulum ADE, intus in A, & sit F, centrum circuli ABC, & G, centrum circuli ADE, quod necessario ab illo diversum erit, cum duo circuli interius & a 6. tertii. tangentes; & non possint idem centrum habere. Dico rectam extentam per G, & F, cadere in contactum A. Si enim non cadit fecet utrumque circulum in punctis D, B, C, E, & ex contactu A, ad centra F, G, rectæ ducantur AF, AG. Quoniam igitur in triangulo AFG, duo latera GF, FA, b majora sunt latere GA; Est autem GA, recta recte GD, æqualis; (quod G, positum sit centrum circuli ADE) erunt & GF, FA, rectæ majores recta GD. Dempta igitur communi GF, remanebit FA, major, quam FD. Quare cum FA, æqualis sit ipsi FB; (quod F, positum fuerit centrum circuli ABC,) erit & FB, major, quam FD, pars quam totum, quod est absurdum.

Quod si quis velit contendere F, esse centrum circuli ADE, & G, centrum circuli ABC, instituetur argumentatio hac ratione. In triangulo AFG, duo latera FG, GA, c majora sunt latere FA: Est autem recta FA, rectæ FE, æqualis, (cum F, ponatur centrum circuli ADE.) Igitur rectæ FG, GA, majores sunt recta FE. Dempta ergo communi FG, remanebit GA, major, quam GE. Quia igitur GA, æqualis est ipsi GC: (propterea quod G, ponitur esse centrum circuli ABC,) erit quoque GC, major, quam GE, pars quam totum, quod est absurdum. Idem absurdum sequetur, si centrum majoris circuli extra minorem ponatur. Non ergo recta FG,

lib. 1. tertii. necesse est b cadere in contactus A , & C . Itaque cum G , sit centrum, & recta $AGHC$, diameter, dividetur $AGHC$, bifariam in puncto G . Simili ratione dividetur eadem AC , bifariam in H , quod est absurdum. Una enim recta in uno duntaxat puncto dividitur bifariam. Si namque GC , est dimidium totius AC , erit necessario HC , dimidio minor, cum sit pars dimidii GC .

TAB. XI. Quod si quis dicat rectam GH , extensam ad partes quidem G , cadere in contactum A ; At vero ad partes H , minime perungere ad contactum C , sed secare utrumque circulum in I , & K , ut in 7ma figura perspicuum est: (Dicere enim quis possit, in præcedenti propos. ostensum esse, rectam per duo centra circulorum sese intus tangentium ductam cadere in unum duntaxat contactum, non autem in alterum, quod tamen nemo recte affirmare poterit, cum demonstratio præcedentis propos. utrique contactui conveniat. Sed quicquid dicat aliquis, ostendemus, absurdum illud esse:) ducendæ erunt ex centrīs G , H , ad contactum C , rectæ GC , HC . Ponatur igitur primo G , centrum circuli $ABCD$: & H , centrum circuli $AECF$. Et quia in triangulo GHC , duo latera GH , HC , & majora sunt latere GC : Sunt autem rectæ GH , HC , æquales ipsi GK : (quod HC , HK , ex centro H , sint æquales, & GH , communis) & recta GC , rectæ GI ; (quod sint ex G , centro,) erit quoque recta GK , major quam GI , pars quam totum, quod est absurdum. Ponatur secundo G , centrum circuli $AECF$; & H , centrum circuli $ABCD$. Quoniam igitur rectæ HG , GC , & majores sunt recta HC ; Est autem HC , æqualis rectæ HA : (cum utraque ducta sit ex centro H ,) erunt quoque HG , GC , majores recta HA . Quare dempra communi HG , erit GC , major, quam GA , quod est absurdum, cum utraque ex centro G , ducatur. Non igitur circuli intus se tangent in pluribus punctis, quam uno.

TAB. XI. Tangant se jam circuli AB , CB , exterius in pluribus

pluribus punctis, quam uno prope F. Ducatur ex D, centro circuli AB, ad E, centrum circuli CB, recta DE, & quæ per contactum F, necessario transibit. Si igitur etiam in alio puncto præter F, se tangunt, tangant sese in B. Ductis igitur rectis DB, EB, erunt rectæ DB, EB, æquales rectis DF, EF, hoc est ipsi DE: *f* Sunt autem & majores, quod est absurdum. Non ergo se tangent circuli exterius in pluribus punctis, quam uno. c 12. tertii

Aliter. Si circuli AB, CB, exterius se tangant in duobus punctis B, & F; ducta recta BF, cadet ipsa intra unum circulorum, per 2. propos. hujus tertii lib. & ideo extra alium, quod est contra eandem propos. Quare circulus circulum non tangit, &c. Quod erat demonstrandum. f 10. primi

THEOR. 13. PROPOS. 14. xiv.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter distant à centro. Et quæ æqualiter distant à centro, æquales sunt inter se.

Sint in circulo ABCD, cujus centrum E, duæ rectæ æquales AB, CD. Dico ipsas æqualiter distare à centro E. Ducantur enim ex E, centro ad rectas AB, CD, duæ perpendiculares EF, EG, & jungantur rectæ EA, ED. Secabunt rectæ EF, EG, rectas AB, CD, bifariam. Quare cum totæ AB, CD, æquales ponantur, erunt & dimidia earum, rectæ videlicet AF, DG, æqualia. Quoniam igitur quadrata rectorum EA, ED, æqualium, inter se sunt æqualia; Quadratum autem rectæ EA, *b* æquale est quadratis rectorum AF, FE; & quadratum rectæ ED, quadratis rectorum DG, GE: Erunt quoque quadrata rectorum AF, FE, æqualia quadratis rectorum DG, GE. Ablatis ergo quadratis æqualibus æqualium rectorum AF, DG, remanebunt quadrata rectorum FE, GE, æqualia, ideoque & rectæ EF, EG, æquales erunt. Distant igitur TAB. XL
fig. 9.
a 3. tertii.
b 47. primi

per 4. defin. hujus lib. rectæ AB, CD, æqualiter à centro E.

Rursus distant rectæ AB, CD, æqualiter à centro E. Dico eas inter se esse æquales. Ducantur enim iterum ex centro E, ad AB, CD, perpendiculares EF, EG, quæ per 4. defin. hujus lib. æquales erunt; & dividuntque rectas AB, CD, bifariam. Ductis igitur rectis EA, ED, erunt earum quadrata æqualia: Est autem quadratum rectæ EA, *a* æquale quadratis rectarum AF, FE; & quadratum rectæ ED, æquale quadratis rectarum DG, GE. Igitur & quadrata rectarum AF, FE, æqualia sunt quadratis rectarum DG, GE; ideoque ablatis æqualibus quadratis æqualium rectarum EF, EG, remanebunt quadrata rectarum AF, DG, æqualia; atque adeo rectæ AF, DG, ac propterea earum duplæ AB, CD, æquales quoque erunt. Itaque in circulo æquales rectæ lineæ æqualiter distant à centro &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 14. PROPOS. 15.

In circulo maxima quidem linea est diameter; aliarum autem propinquior centro, remotiore semper major.

TAB. XI.
fig. 10. IN circulo ABCDEF, ejus centrum G, diameter sit AF; & rectæ ei propinquior HI, remotior autem CD. Dico omnium esse maximam AF, & HI, majorem, quam CD. Ducantur enim ex G, centro rectæ GK, GL, perpendiculares ad CD, HI. Et quia remotior est CD, à centro, quam HI, erit GK, major quam GL, per 4. defin. hujus lib. Abscindatur ex GK, recta GM, ipsi GL, æqualis, atque per M, educatur BME, perpendicularis ad GK, & connectantur rectæ GB, GC, GD, GE. Quoniam igitur rectæ perpendiculares GM, GL, æquales sunt, æqualiter distabunt rectæ BE, HI, à centro, per 4. defin. hujus lib. & ideo inter se æquales erunt. Rursus quia rectæ GB, GE, *b* majores quidem sunt

sunt recta BE, æquales autem diametro AF; erit
 & diameter AF, major, quam BE. Eadem ra-
 tione ostendetur AF, major omnibus aliis lineis.
 Deinde quia latera GB, GE, trianguli BGE;
 æqualia sunt lateribus GC, GD, trianguli CGD;
 & angulus BGE, major est angulo CGD; erit
 recta BE, major quam CD; atque adeo HI,
 quæ æqualis ostensa fuit ipsi BE, major quoque
 erit quam CD. In circulo igitur maxima quidem
 linea est diameter, &c. Quod erat demonst-
 randum.

THEOR. 15. PROPOS. 16. xvi.

Quæ ab extremitate diametri cujusque cir-
 culi ad angulos rectos ducitur; extra ipsum
 circumulum cadet; & in locum inter ipsam re-
 ctam lineam, & peripheriam comprehensum,
 altera recta linea non cadet: & semicirculi
 quidem angulus, quovis angulo acuto recti-
 lino major est; reliquus autem minor.

IN circulo ABC, cujus centrum D, diameter TAB. XI.
 sit AC, ad quam ex A, puncto extremo per- fig. 11.
 pendicularis ducatur. Dico hanc lineam perpen-
 dicularem necessario extra circumulum cadere. Si
 enim cadit intra ipsum, qualis est AB; ducta
 DB, erunt duo anguli DAB, DBA, æquales, a 5. primæ
 sed DAB, rectus est, per constructionem: Igitur
 & DBA, rectus erit, quod est absurdum. Duo
 enim anguli in triangulo b minores sunt duobus b 17. primæ
 rectis. Non igitur cadet perpendicularis intra cir-
 culum; neque eandem ob causam in ipsam cir-
 cumferentiam, sed extra, quatis est EF. Dico
 jam ex A, inter AE, rectam, & circumferenti-
 am AB, non posse cadere alteram rectam. Cadat
 enim, si fieri potest, recta AG, ad quam ex D,
 ducatur perpendicularis DH, secans circumferen-
 tiam in I, quæ necessario ad partem anguli acuti
 DAG, cadet, ex coroll. 2. propos. 17. lib. 1.

H 5

Quo-

17. *primus* Quoniam igitur in triangulo DAH, duo anguli
 DHA, DAH, minores sunt duobus rectis; &
 DHA, rectus est, per constructionem, erit angu-
 lus DAH, recto minor, ideoque recta DA, hoc
 19. *primus* est, recta illi æqualis DI, major erit, quam
 DH, pars quam totum, quod est absurdum. Non
 igitur intercipiatur recta inter AE, & circumfe-
 rentiam AB: sed quæcunque ex A, ducatur infra
 AE, ea secabit circulum. Dico denique angulum se-
 micirculi, contentum diametro AC, & circumfere-
 tia AB, majorem esse omni acuto angulo rectilineo;
 reliquum vero angulum contingentia, qui continetur
 recta AE, & circumferentia AB, minorem esse
 omni acuto angulo rectilineo. Quoniam enim
 ostensum est, omnem rectam ex A, ductam,
 infra perpendicularem AE, cadere intra circulum,
 faciet necessario ea linea cum AC, angulum re-
 ctilineum acutum minorem angulo semicirculi,
 at vero cum AE, angulum rectilineum acutum
 majorem angulo contingentia, cum ille sit pars
 anguli semicirculi, hic vero totum quoddam
 respectu anguli contingentia. Id quod liquido
 constat, ducta recta AB, quomodocunque infra
 AE. Nam cum hæc linea AB, intra circulum
 cadat, ut demonstratum est, erit angulus rectili-
 neus acutus CAB, minor angulo semicirculi
 contento sub diametro AC, & circumferentia
 ABC, cum ille hujus sit pars: Angulus vero
 contingentia contentus sub tangente linea AE,
 & circumferentia ABC, minor angulo rectilineo
 acuto BAE, quod ille hujus pars sit. Eademque
 ratio est de omnibus aliis angulis acutis rectili-
 neis, cum omnes contineantur à diametro AC,
 vel tangente AE, & rectis ex A, sub AE, du-
 ctis, quæ omnes intra circulum cadent; ut de-
 monstravimus. Angulus igitur semicirculi major
 est omni acuto angulo rectilineo, reliquus autem
 angulus contingentia, minor. Itaque quæ ab ex-
 tremitate diametri cujusque circuli ad angulos
 sectos ducitur, &c. Quod erat ostendendum.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, rectam à diametri circuli extremitate ad angulos rectos ductam, ipsum circumulum tangere. Ostensum enim est, ipsam cadere extra circumulum. Quare solum in puncto illo diametri extremo circumulum attingit.

Quare si jubeamur per datum punctum A, in circumferentia circuli AB, rectam lineam ducere, quæ circumulum tangat in A, duccmus ex A, ad centrum C, rectam AC, & ad eam excicabimus perpendicularam DAE. Hæc enim circumulum tanget in A, ut demonstratum est. TAB. XI.
fig. 12.

PROBL. 2. PROPOS. 17.

xvii.

A dato puncto rectam lineam ducere,
quæ datum tangat circumulum.

EX puncto A, ducenda sit linea, quæ tangat circumulum BC, cujus centrum D. Ducatur recta AD, secans circumulum BC, in B. Deinde centro D, intervallo autem DA, describatur circumulus AE, & ex B, educatur BE, perpendicularis ad AD, secans circumulum AE, in E. Ducta denique recta ED, secante circumulum BC, in C, connectatur recta AC: quam dico tangere circumulum BC, in C. Cum enim duo latera DE, DB, trianguli BDE, æqualia sint duobus lateribus DA, DC, trianguli CDA, utrumque utriusque, ut constat ex circuli definitione; angulusque D, contentus dictis lateribus sit communis: Erunt & bases BE, CA, & anguli DBE, DCA, super ipsas, æquales. Est autem DBE, rectus ex constructione. Igitur & DCA, rectus erit. Itaque CA, cum sit perpendicularis ducta ad C, extremum semidiametri CD, tangat circumulum, per corollarium præcedentis propositionis. A dato ergo puncto A, ducta est AC, recta tangens circumulum BC, in C, quod faciendum erat. TAB. XI.
fig. 13.

THEOR.

xvii. THEOR. 16. PROPOS. 18.

Si circulum tangat recta quæpiam linea, à centro autem ad contactum adjungatur recta quædem linea; quæ adjuncta fuerit, ad ipsam contingentem perpendicularis erit.

TAB. XI.
fig. 14.

Recta linea AB, tangat in C, circulum CD, cujus centrum E, & ex E, ad C, recta ducatur EC. Dico EC, perpendicularem esse ad AB. Si enim non est, ducatur EF, perpendicularis ad AB, secans circumferentiam in D. Quoniam igitur in triangulo CEF, duo anguli ECF, EFC, minores sunt duobus rectis; Et est EFC, rectus, ex constructione: erit ECF, minor. Quare major erit recta EC, hoc est, ED, quam EF, pars quam totum, quod est absurdum. Est igitur EC, perpendicularis ad AB. Quare si circulum tangat recta quæpiam linea, &c. Quod demonstrandum erat.

117. primi

119. primi

22

2

116. tertii

Aliter. Si EC, non est perpendicularis ad AB, erit alter angulorum ad C, obtusus, & alter acutus. Sit ergo ECB, acutus, qui cum major sit angulo semicirculi ECD, erit angulus semicirculi minor angulo aliquo acuto: quod est absurdum. Omnis siquidem angulus semicirculi major est omni acuto.

xviii. THEOR. 17. PROPOS. 19.

Si circulum tetigerit recta quæpiam linea, à contactu autem recta linea ad angulos rectos ipsi tangenti excitetur: In excitata erit centrum circuli.

TAB. XI.
fig. 15.

Tangat recta AB, circulum CDE, in C; & ex C, ducatur CE, perpendicularis ad AB. Dico in CE, esse centrum circuli. Si enim est extra

LIBERTERTIUS. 17

extra CE, sit F, centrum; à quo ad C, ducatur
 recta FC, quæ perpendicularis erit ad AB. Quare a 18. tertij
 rectus angulus FCB, recto angulo ECB, æ-
 qualis erit, pars toti: quod est absurdum. Non
 igitur extra CE, centrum circuli existet. Itaque
 si circumum tetigerit recta quæpiam linea, &c.
 Quod erat demonstrandum.

THEOR. 18. PROPOS. 20. 22.

In circulo, angulus ad centrum duplex est
 anguli ad peripheriam, cum fuerit eadem
 peripheria basis angulorum.

IN circulo ABC, cujus centrum D, super ba- TAB. XI.
 sin BC, constituatur angulus BDC, ad cen- fig. 16.
 trum; & super eandem basin angulus BAC, ad
 peripheriam. Dico angulum BDC, duplum esse
 anguli BAC. Includant enim primùm duæ AB,
 AC, duas DB, DC; & per centrum D, recta
 extendatur AE. Quoniam igitur rectæ DA, DB,
 æquales sunt, ærunt anguli DAB, DBA, æqua- a 5. primi
 les: Est autem externus angulus BDE, b æqualis b 32. primi
 duobus angulis internis DAB, DBA: Quare
 BDE, duplus erit alterius eorum, ut anguli
 DAB. Eodem modo duplus ostendetur angulus
 CDE, anguli DAC. Quapropter totus BDC,
 duplus erit totius BAC. Quando enim duæ mag-
 nitudines duarum sunt duplæ, singulæ singula-
 rum, est quoque aggregatum ex illis aggregati
 ex his duplum. Constat ergo propositum.

Deinde non includant rectæ AB, AC, rectas TAB. XI.
 DB, DC, sed AB, per centrum extendatur. fig. 17.
 Quoniam igitur externus angulus BDC. c æqualis c 32. primi
 est duobus internis DAC, DCA: Hi autem duo
 d inter se sunt æquales, quod latera DA, DC, d 5. primi
 sint æqualia; erit angulus BDC, duplus alterius
 eorum, nempe anguli BAC. Quod est proposi-
 tum.

Tertio recta AB, secet rectam DC, & per TAB. XII.
 centrum D, extendatur recta AE. Quoniam fig. 17.
 igitur

126 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.








igitur angulus EDC, ad centrum, & angulus EAC, ad peripheriam, habent eandem basin EC, & recta AE, extenditur per centrum; erit angulus EDC, duplus anguli EAC, ut ostensum est in secunda parte. Simili modo erit angulus EDB, duplus anguli EAB; habent enim hi anguli eandem basin EB. Reliquus igitur angulus BDC, *e 10. prop.* duplus erit reliqui anguli BAC *e.* Quando enim totum totius est duplum, & ablatum ablati; est & reliquum reliqui duplum. In circulo igitur angulus ad centrum duplex est, &c. Quod erat demonstrandum.

xxi. T H E O R. 19. P R O P O S. 21.

In circulo, qui in eodem segmento sunt anguli, sunt inter se æquales.

TAB. XII. *Fig. 2.* IN circulo ABCD, cujus centrum E, existant anguli A, & B, in segmento DABC. Dico eos esse æquales. Sit enim segmentum DABC, primum semicirculo majus; & ducantur rectæ DE, CE, ad centrum E. Quoniam igitur angulus DEC, ad centrum, *e 10. tertii.* duplus est tam anguli DAC, quam DBC, ad peripheriam, cum omnes habeant eandem basin DC; erunt anguli *b 7. prop.* A, & B, dimidiatæ partes anguli E. Quare inter se æquales erunt. Eademque ratione omnes alii anguli existentes in segmento DABC, ostenduntur esse æquales.

TAB. XII. *Fig. 3. 4.* Sit deinde segmentum DABC, vel semicirculus, vel semicirculo minus. Ducantur per centrum E, rectæ AF, BG, & in segmento minori connectantur rectæ DE, CE. Quoniam igitur angulus DEF, ad centrum, *e 10. tertii.* duplus est anguli DAF, ad peripheriam: Similiter angulus CEF, anguli CAF; ac proinde duo anguli simul DEF, CEF, duorum angulorum simul DAF, CAF, dupi erunt, hoc est, totius anguli DAC: Sunt autem anguli DEG, GEF, æquales angulo DEF:





DEF: erunt quoque tres anguli DEG, GEF, FEC, simul dupli anguli DAC. Eadem ratione erunt iidem tres anguli dupli anguli DBC. Quare *fig. 7. prim.* æquales erunt anguli DAC, DBC.

Aliter. Secent sese rectæ AC, BD, in F, & TAB. XII. connectatur recta AB. Quoniam igitur tres anguli trianguli AFD, æquales sunt tribus angulis trianguli BFC; quoniam tam illi, quam hi *fig. 5. 6.* æquales sunt duobus rectis: Si auferantur anguli AFD, BFC, qui æquales sunt; erunt reliqui *fig. 15. prim.* ADF, DAF, reliquis BCF, CBF, æquales. Atqui & anguli ADF, BCF, æquales sunt ostensi in segmento majori ADCB. Ergo & anguli reliqui DAC, DBC, æquales sunt.

Aliter. Ductis rectis DF, CF, ad punctum in circumferentia quodvis F, includentibus centrum E, ita ut tam DABCF, quam FDABC, sit segmentum majus; jungantur quoque rectæ AF, BF. Quia igitur anguli DAF, DBF, in eodem segmento majori DABCF, æquales sunt; nec non & anguli FAC, FBC, in segmento etiam majori FDABC, existentes: si hi illis addantur, fiet totus angulus DAC, toti angulo DBC, æqualis. Itaque in circulo, qui in eodem segmento sunt, &c. Quod erat ostendendum. TAB. XII. *fig. 7. 8.*

THEOR. 20. PROPOS. 22. XIII.

Quadrilaterorum in circulis descriptorum anguli, qui ex adverso, duobus rectis sunt æquales.

IN circulo, cujus centrum E, inscriptum sit TAB. XII. quadrilaterum ABCD. Dico duos angulos oppositos ABC, CDA: Item BCD, DAB, æquales esse duobus rectis. Ductis enim diametris duabus quadrilateri AC, BD, erunt duo anguli ABD, ACD, in eodem segmento ABCD, æquales. Similiter erunt duo anguli CBD, CAD, in eodem segmento CBAD, æquales. Quare duo anguli ABD, CBD, hoc est, totus angulus ABC, *fig. 9. 10.* *fig. 21. prim.*

128 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ABC, æqualis est duobus angulis ACD, CAD. Addito igitur communi angulo CDA, erunt duo anguli ABC, CDA, æquales tribus angulis ACD, CAD, CDA. *b* Sed hi tres æquales sunt duobus rectis. Igitur & duo ABC, CDA, duobus erunt rectis æquales. Eodem modo ostendemus, angulos BCD, DAB, duobus esse rectis æquales. Nam rursus duo anguli ABD, ACD, sunt æquales: Item duo BCA, BDA; ac propterea totus angulus BCD, duobus angulis ABD, BDA, æqualis erit. Addito igitur communi angulo BAD; erunt duo anguli BCD, BAD, æquales tribus angulis ABD, BDA, DAB. *c* Sed hi tres sunt æquales duobus rectis. Igitur & duo BCD, DAB, duobus rectis æquales erunt. Quadrilaterorum igitur in circulis descriptorum, &c. Quod demonstrandum erat.

S C H O L I U M.

Anguli insistentes arcibus circularum similibus sive ad centra, sive ad circumferentias, sunt inter se æquales. Et contra, arcus, quibus anguli æquales sive ad centra, sive ad circumferentias insistent, similes sunt.

TAB. XII. *Sint in circulis ABCD, EFGH, quorum centra*
fig. 11. I, K, primum arcus similes BCD, FGH, quibus ad centra insistant anguli I, K, ad circumferentias vero anguli A, E. Dico tam illos, quam hos inter se æquales esse. Constituuntur enim in illis arcibus anguli C, G, qui ex defn. segmentorum similibus, æquales erunt. k Sunt autem tam duo anguli C, A, quam duo G, E, duobus rectis æquales. Ablati igitur æqualibus C, G, erant quoque reliqui anguli A, E, æquales. Quorum licum dupli sunt anguli I, K, merunt hi quoque æquales. Quod est propositum.
Deinde sint tam anguli I, K, quam A, E, insistentes arcibus BCD, FGH, inter se æquales. Dico arcus BCD, FGH, esse similes. Nam si A, & E, sint

sunt aequales: sunt n autem tam duo anguli A, C, ^{naa. terrib.} quam duo E, G, duobus rectis aequales, erunt & reliqui C, G, aequales; ac propterea, ex defn. similiarum segmentorum, arcus BCD, FGH, quibus anguli aequales A, E, ad circumferentias insistant, similes. Si vero anguli I, K, ad centra sint aequales, oerunt quoque eorum dimidia aequalia, hoc est, ^{o 7. prim.} anguli A, E. Quare ut prius, arcus BCD, FGH, similes sunt. Quod erat ostendendum.

THEOR. 21. PROPOS. 23. ^{xxij.}

Super eadem recta linea, duo segmenta circulorum similia, & inæqualia, non constituentur ad easdem partes.

SI enim fieri potest, super recta AB, constitu- ^{TAB. XII.}
antur ad easdem partes duo segmenta similia, ^{fg. 12.}
& inæqualia ACB, ADB. Perspicuum est autem, quod se solum interfecent in punctis A, & B;
a Circulus enim circulum non fecat in pluribus ^{a 10. terrib.}
punctis, quam duobus. Unde peripheria unius segmenti tota erit extra peripheriam alterius. Ducatur igitur recta AD, secans circumferentias in C, & D, & connectantur rectæ CB, DB. Quoniam igitur segmenta ponuntur similia, erit per 10. defn. hujus lib. angulus ACB, æqualis angulo ADB, externus interno: b quod est ab- ^{b 16. prim.}
surdum. Non igitur segmenta sunt similia: Quare super eadem recta linea, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 22. PROPOS. 24. ^{xxiv.}

Super æqualibus rectis lineis, similia circulorum segmenta sunt inter se æqualia.

Super rectis lineis æqualibus AB, CD, consti- ^{TAB. XII.}
tuta sint segmenta similia AEB, CFD. Dico ^{fg. 13.}
ea inter se esse æqualia. Lineæ enim AB, CD,
I
curs

cum sint æquales, congruent inter se, si altera alteri superponatur. Dico igitur & segmentum AEB, segmento CFD, congruere. Si enim non congruit, cadet aut extra, aut intra, aut partim extra, partim intra. Quod si extra cadat, aut intra, constituentur super eadem recta CD, duo segmenta AEB, AFB, similia, & inæqualia, quorum unum totum extra aliud cadit, quod est absurdum. *a* Demonstratum enim est contrarium. Quod si partim extra cadat, partim intra, secabunt sese in pluribus punctis, quam duobus nimirum in A, B, G. Quod est absurdum. *b* Circuli enim non se secant in pluribus punctis, quam duobus. Congruet igitur segmentum AEB, segmento CFD, atque adeo ipsa inter se æqualia erunt. Quocirca super æqualibus rectis lineis, &c. Quod erat demonstrandum.

xxv. PROBL. 3. PROPOS. 25.

Circuli segmento dato, describere circulum, cujus est segmentum.

TAB. XII. fig. 14. Sit segmentum circuli ABC, quod perficere oporteat. Subtendatur recta AC, quæ bifariam secetur in D, puncto, per quod perpendicularis ducatur DB, connectaturque AB. Angulus igitur DBA, vel major est angulo DAB, vel æqualis, vel minor. Sit primum major, (quod quidem continget, quando segmentum ABC, minus fuerit semicirculo: Tunc enim, quia BD, transit per centrum, ex corollario propof. 1. hujus lib. quod est extra segmentum, cum ponatur esse minus; erit DA, major, quam DB, cum DB, perficiens diametrum *a* sit omnium minima, quæ ex puncto D, in circumferentiam cadunt. *a* 7. *tertiu.* Quare angulus DBA, *b* major erit angulo DAB) fiatque angulus BAE, æqualis angulo DBA, & secet recta AE, rectam BD, productam in E. Dico E, esse centrum circuli, cujus segmentum ABC.

ABC. Ducta enim recta EC, erunt latera AD, DE, trianguli ADE, æqualia lateribus CD, DE, trianguli CDE, & anguli contenti, recti. Quare bases EA, EC, æquales erunt; c 4. primæ
 Est autem & EA, æqualis ipsi EB, quod anguli d 6. primæ
 EAB, EBA, æquales sint. Igitur tres lineæ EA, EB, EC, æquales erunt, e ac propterea E, e 9. tertii,
 centrum erit circuli ABC, quandoquidem ex E, plures quam duæ rectæ æquales cadunt in circumferentiam.

Sit deinde angulus DBA, angulo DAB, æqualis: (Quod demum continget, quando segmentum ABC, semicirculus fuerit. Tunc enim erit AC, diameter, & D, centrum, atque adeo rectæ DA, DB, æquales; quare f & anguli DAB, DBA, æquales erunt.) g Erunt igitur rectæ DA, DB, æquales: Erat autem & DC, æqualis ipsi DA, quod recta AC, secta sit bisariam. Quapropter cum tres rectæ DA, DB, DC, cadant ex D, in circumferentiam, h erit D, centrum. h 9. tertii.

Sit tertio angulus DBA, angulo DAB, minor, (quod quidem eveniet, si segmentum ABC, semicirculo majus existerit. Tunc enim, quoniam BD, transit per centrum, ex corollario propos. 1. hujus lib. quod quidem intra segmentum, cum majus esse ponatur, existit; i erit DB, omnium, i 7. tertii.
 quæ ex D; in circumferentiam cadunt, maxima; major igitur erit quam DA, k ideoque angulus DAB, major angulo DBA,) fiatque angulus BAE, æqualis angulo DBA, & secet recta AE, rectam BD, in E, puncto, quod ostendetur esse centrum eodem modo, quo id ipsum ostendimus, quando angulus DBA, major erat angulo DAB, ut constat, si recta ducatur EC. Circuli igitur segmento dato, descripsimus circumulum, cujus est segmentum. Quod facere oportebat. k 18. primæ

xxvi. THEOR. 23. PROPOS. 26.

In æqualibus circulis, æquales anguli æqualibus peripheriis insistant, sive ad centra, sive ad peripherias constituti insistant.

TAB. XII.
fig. 17.

IN circulis æqualibus ABC, DEF, quorum centra G, H, constituti sint primum ad centra anguli æquales AGC, DHF. Dico peripherias AC, DF, quibus insistant, sive super quas ascenderunt, esse æquales. Sumantur enim in peripheriis ABC, DEF, duo puncta B, E, ad quæ rectæ ducantur AB, CB, DE, FE, connectanturque rectæ AC, DF. Quoniam igitur a20.tertiæ anguli B, & E, dimidii sunt æqualium angulorum G, & H; erunt & ipsi æquales inter se. Quare ex definitione segmenta ABC, DEF, similia erunt. Et quia latera AG, GC, trianguli AGC, æqualia sunt lateribus DH, HF, trianguli DHF, propter circulorum æqualitatem; & anguli, quos continent, G, H, æquales, ex hypothesi; b4. primi erunt bases AC, DF, æquales. Cum igitur segmenta similia ABC, DEF, sint c24.tertiæ super lineas æquales AC, DF, erunt ipsa inter se æqualia. Quare si à circulis æqualibus demantur, remanebunt & segmenta AC, DF, inter se æqualia; atque adeo peripheriæ AC, DF. Quod est propositum.

Sint deinde ad peripherias constituti duo anguli æquales B, & E; Dico rursus, peripherias AC, DF, super quas ascenderunt, esse æquales. Erunt enim, ut prius, segmenta ABC, DEF, similia. Cum igitur sint super æquales lineas AC, DF: d20.tertiæ (cum enim anguli G, H, æquales sint, quod sunt dupli angulorum æqualium B, & E; erunt, c24.tertiæ ut prius rectæ AC, DF, æquales) erunt ipsa inter se æqualia. Si igitur à circulis æqualibus detrahantur, remanebunt & segmenta AC, DF, æqualia. In æqualibus itaque circulis, æquales anguli, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 11






Fig. 14.





Fig. 17





T H E O R. 24. P R O P O S. 27. xxvii

In æqualibus circulis, anguli, qui æqualibus peripheriis insistant, sunt inter se æquales, sive ad centra, sive ad peripherias constituti insistant.

IN circulis æqualibus ABC, DEF, quorum *TAB. XIII*
centra G, H, insistant primum anguli ad centra *fig. 2.*
tra AGC, & DHF, æqualibus peripheriis
AC, DF. Dico angulos AGC, & DHF,
æquales esse. Si enim non sunt æquales, sit an-
gulus G, major, fiatque angulus AGI, æqualis
angulo DHF. Erunt igitur peripheriæ AI, DF, *aa 6. tertii;*
æquales. Cum igitur peripheria AC, æqualis
ponatur peripheriæ DF, erunt peripheriæ AI,
AC, inter se æquales, pars, & totum; quod est
absurdum. Sunt ergo anguli AGC, DHF, æ-
quales.

Insistant deinde eisdem peripheriis æqualibus
AC, DF, anguli B, & E, ad peripherias: quos
rursus dico æquales esse. Nam si alter, ut ABC,
major est; fiat angulo E, æqualis angulus ABI,
eruntque peripheriæ AI, DF, æquales. Quare, *ba 6. tertii*
ut prius, erunt peripheriæ AI, AC, æquales,
pars & totum; quod est absurdum. Sunt ergo
anguli ABC, DEF, æquales. In æqualibus
igitur circulis, anguli, qui æqualibus peri-
pheriis insistant, &c. Quod demonstrandum
erat.

S C H O L I U M.

*Si vero peripheriæ fuerint inæquales, insistet majori
major angulus: sive ad centrum, sive ad circumferentiam,
quam minori. Sit peripheria AC, major, quam periphe-
ria DF. Dico angulum AGC, majorem esse angulo
DHF, & angulum ABC, majorem angulo DEF,
Si enim fiat peripheria CI, æqualis peripheriæ DF,
I 3 ducan-*

134 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ducanturque recta IG , IB , erunt ut ostensum est, tam anguli ad centrum CGI , DHF , quam anguli ad circumferentiam CBI , DEF , æquales. Quare & angulus AGC , angulo DHF , & angulus ABC , angulo DEF , erit major.

Linea recta, qua ex medio puncto peripheria alicujus ducitur tangens circulum, parallela est recta linea, qua peripheriam illam subtendit.

TAB. XIII In circulo ABC , cujus centrum D , ducatur ex
 fig. 3. A , puncto medio peripheria BAC , linea EF , tangens circulum. Dico EF , parallelam esse recta BC , arcum BAC , subtendenti. Ducta enim ex centro D , ad punctum contactus A , recta DA , secante rectam
 h 27. versu, BC , in G , connexisque rectis DB , DC , h erunt anguli ADB , ADC , circumferentis equalibus AB , AC , insistentes, æquales: Sunt autem & latera BD , DC , trianguli BDG , lateribus CD , DG ,
 i 4. primi trianguli CDG , æqualia, utrumque utriusque. i Igitur & anguli ad G , æquales sunt super bases GB , GC , ac propterea recti. Igitur & AGB , AGC , illis deinceps recti sunt: Sunt autem & anguli
 k 13. primi GAE , GAF , recti. k quod DA , perpendicularis sit
 l 28. primi ad EF . l Ergo EF , BC , parallele sunt. Quod est propositum.

Angulus rectus in centro insistit quadranti; acutus vero arcui quadrante minori; & obtusus arcui quadrante majori. Et contra, angulus in centro quadranti insistens, rectus est; insistens vero arcui quadrante minori, acutus; & arcui quadrante majori, obtusus.

TAB. XIII Rectus angulus ABC , insistet arcui AC , in cen-
 fig. 4. tro B , circuli $ACDE$. Dico arcum AC , quadranteum esse, &c. Productis enim rectis AB , CB , ad D , E , erunt quoque anguli ABE , CBD , recto ABC , deinceps, recti, ex defn. 10. lib. I. nec non
 m 15. primi & angulus DBE , rectus; m cum equalis sit recto angulo

angulo ABC , ad verticem. Omnes ergo quatuor anguli ad centrum B , æquales sunt, utpote recti: ac propterea nactus AC , CD , DE , EA , quibus insistant, æquales erunt. Quilibet igitur eorum quadrans est. Et quoniam recta cum AB , in B , constituens angulum acutum, cadit in arcum AC : recta vero cum eadem AB , in B , continens angulum obtusum, cadit in arcum CD ; liquido constat, angulum acutum insistere arcui quadrante minori, obtusum vero majori.

Sed insistas jam quadranti AC , angulus ABC , in centro B . Dico angulum ABC , esse rectum, &c. Producis enim rursus rectis AB , CB , ad D , E ; quoniam tam CAE , quam ACD , & AED , semicirculus est, estque AC , quadrans; erit tam AE , quam CD , quadrans quoque, ac proinde & DE , in semicirculo AED , quadrans erit: Sunt ergo quatuor arcus AC , CD , DE , EA , æquales, & ac proinde anguli ad centrum B , illis insistentes, æquales erunt. Quare cum omnes quatuor sint quatuor rectis æquales, erit eorum quilibet rectus. Et quia recta cum AB , auferens minorem arcum quadrantis AC , facit in centro B , cum AB , minorem angulum recto angulo ABC ; recta vero cum eadem AB , auferens majorem arcum quadrantis AC , constituit in centro B , angulum recto angulo ABC , majorem; perspicuum est, angulum minori arcui quadrante insistentem, esse acutum; majori vero, obtusum. Quod est propositum.

THEOR. 25. PROPOS. 28. xxviii.

In æqualibus circulis, æquales rectæ lineæ æquales peripherias auferunt, majorem quidem majori, minorem autem minori.

IN circulis æqualibus ABC , DEF , quorum centra G , & H , sint rectæ æquales AC , DF . Dico majorem peripheriam ABC , æqualem esse majori DEF , & minorem AC , minori DF . Ductis enim rectis AG , GC , DH , HF ; erunt latera

latera AG , GC , trianguli AGC , æqualia lateribus DH , HF , trianguli DHF . Ponuntur autem
a. 8. primi & bases AC , DF , æquales. Igitur *a* anguli G ,
b. 6. primi & H , æquales erunt: Ac propterea periphætiæ
 AC , DF , quibus insunt, *b* æquales erunt; quæ
 ablatæ ex totis æqualibus, relinquent etiam æqua-
 les ABC , DEF . In æqualibus ergo circulis
 æquales rectæ linæ, &c. Quod erat demon-
 strandum.

S C H O L I U M.

Quod si fuerint linæ inæquales in circulis æquali-
 bus, auferet major linæ, majorem peripheriam,
 quam minor, si loquamur de segmentis circuli mix-
 turibus semicirculo. Nam si de segmentis circuli ma-
 joribus sermo habeatur, major linæ auferet minorem
 peripheriam, quam minor. In circulis enim æquali-
 bus ABC , DEF , quorum centra G , & H , sit
 recta AC , major, quam DF . Dico peripheriam AC ,
 semicirculo minorem, majorem esse peripheriam DF :
 At peripheriam ABC , minorem peripheriam DEF .
 Ductis enim rectis AG , GC , DH , HF , erunt la-
 tera AG , GC , trianguli AGC , æqualia lateribus
 DH , HF , trianguli DHF . Ponitur autem basis
c. 25. primi AC , major base DF . Igitur *c* angulus AGC , ma-
 jor erit angulo DHF . Fiat angulus CGI , angulo
c. 6. tertii DHF , æqualis; eritque propterea *d* peripheria CI ,
 peripheria DF , æqualis; Ac proinde peripheria AIC ,
 major, quam peripheria DF : Ideoque reliqua ABC ,
 minor, quam reliqua DEF .

xxix. T H E O R. 26. P R O P O S. 29.

In æqualibus circulis, æquales peripheri-
 as, æquales rectæ linæ subtendunt.

TAB. XIII. IN circulis eisdem æqualibus ponantur æquales
Æ. 5. peripheriæ ABC , DEF ; Item AC , & DF .
 Dico rectas AC , DF , quæ eas subtendunt, esse
 æquales.

æquales. Ductis enim lineis, ut prius, erunt latera AG, GC, trianguli AGC, æqualia lateribus DH, HF, trianguli DHF: Sunt autem & anguli G, H, æquales, quod æqualibus peripheriis AC, DF, insistant. Igitur b bases AC, DF, æquales erunt. In æqualibus ergo circulis, æquales peripherias, &c. Quod erat ostendendum. a 27. tertii.
b 4. primi

SCHOLIUM.

Si autem fuerint peripheriæ inæquales, subtendet majorem major lineæ, quam minorem, & de segmentis semicirculo minoribus fiat sermo. Nam si de segmentis majoribus semicirculo loquamur, subtendet majorem minor lineæ, quam minorem. In circulis enim æqualibus ABC, DEF, quorum centra G, H, sicut peripheriæ semicirculo minores AC, DF, sitque AC, major, quam DF; At proinde ABC minor, quam DEF. Dico lineam AC, majorem esse, quam DF. Ductis enim rectis AG, GC, DH, HF; erit angulus AGC, major angulo DHF, ex scholio propof. 27. hujus lib. Cum igitur latera AG, GC, trianguli AGC, æqualia sint lateribus DH, HF, trianguli DHF, erit basis AC, major base DF, &c. TAB XIII.
fig. 6.
c 24. primi

PROBL. 4. PROPOS. 30. xxx.

Datam peripheriam bifariam secare.

Si peripheria ABC, secanda bifariam. Ducatur recta subtendens AC, qua divisa bifariam in D, erigatur perpendicularis DB, quæ peripheriam ABC, bifariam secabit in B. Ductis enim rectis AB, CB, erunt latera AD, DB, trianguli ADB, æqualia lateribus CD, DB, trianguli CDB: Sunt autem & anguli ad D, æquales, nempe recti. Igitur a & bases AB, CB, æquales erunt; Ac propterea b peripheriæ AB, CB, erunt æquales. Datam ergo peripheriam bifariam secimus. Quod erat faciendum. TAB XIII.
fig. 7.
a 4. primi
b 28. tertii.

xxi. THEOR. 27. PROPOS. 31.

In circulo angulus, qui in semicirculo, rectus est: qui autem in majore segmento, minor recto: qui vero in minore segmento, major est recto. Et insuper angulus majoris segmenti, recto quidem major est: minoris autem segmenti angulus minor est recto.

TAB. XIII. **fig. 8.** Circuli enim ABC, cujus centrum D, diameter sit AC, constituaturque in semicirculo angulus ABC, existetque angulus BAC, in majore segmento CAB. Constituatur quoque in CEB, minori segmento angulus BEC. Dico angulum ABC, in semicirculo rectum esse; angulum vero BAC, in majore segmento, minorem recto, & angulum BEC, in minori segmento, majorem recto. Item angulum majoris segmenti comprehensum recta BC, & peripheria BAC, esse recto majorem. At angulum minoris segmenti comprehensum recta BC, & peripheria BEC, recto minorem. Ducatur enim recta BD, ad centrum, & extendatur AB, in F. Quoniam igitur *a 5. primi* rectæ DA, DB, æquales sunt, *a* erit angulus DBA, angulo DAB, æqualis. Eadem ratione erit angulus DBC, angulo DCB, æqualis, ideoque totus angulus ABC, duobus angulis BAC, BCA, æqualis erit. *b 32. primi* Est autem & angulus FBC, externus eisdem duobus internis angulis BAC, BCA, in triangulo ABC, æqualis. Quare æquales erunt inter se anguli ABC, FBC; ac propterea uterque rectus. Rectus igitur est angulus ABC; quod est primum.

c 17. primi Quoniam vero in triangulo ABC, duo anguli ABC, & BAC, sunt duobus rectis minores; Et est angulus ABC, ostensus rectus: Erit angulus BAC, in segmento majore, recto minor; quod est secundum.

Rursus quia in quadrilatero ABEC, intra circulum

culum descripto, ad duo anguli oppositi BAC , & $daa.tertii$
 BEC , sunt duobus rectis æquales; Et angulus
 BAC , ostensus est recto minor: Erit BEC , an-
 gulus in segmento minore, recto major; quod est
 tertium.

Amplius cum angulus rectus ABC , pars sit
 anguli segmenti majoris ABC , qui comprehendi-
 tur recta BC , & peripheria BAC ; erit angulus
 segmenti majoris, recto major, quod est quartum.

Postremo, cum angulus segmenti minoris,
 comprehensus recta BC , & peripheria BEC , pars
 sit quoque anguli recti PBC ; Erit angulus seg-
 menti minoris, recto minor; quod est quintum.
 In circulo igitur angulus, qui in semicirculo,
 rectus est, &c. Quod erat demonstrandum.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, quod angulus trianguli, qui re-
 liquis duobus æqualis existit, rectus est, eo quod illi
 contiguus (qui producto latere extra triangulum fit) eis-
 dem sit æqualis.

THEOR. 28. PROPOS. 32. xxxii.

Si circulum tetigerit aliqua recta linea, &
 contactu autem producat quædam recta li-
 nea circulum secans: Anguli, quos ad con-
 tingentem facit, æquales sunt iis, qui in
 alternis circuli segmentis consistunt, angulis.

TANGAT recta AB , circulum CDE , in C , pun- *TAB. XIII*
 cto, à quo ducatur recta CE , dividens cir- *fig. 9.*
 culum in duo segmenta, in quibus fiant anguli
 CGE , CDE . Dico angulum ACE , æqualem
 esse angulo CGE , in alterno segmento; & angu-
 lum BCE , angulo CDE , in alterno quoque seg-
 mento. Transcat enim primum, recta CE , per
 centrum. * Erit igitur uterque angulus ACE , *a18. tertii.*
 BCE , rectus; † Sunt autem & anguli CGE , *b31. tertii.*
 CDE , in semicirculis recti, Igitur angulus ACE ,
 angulo

140 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

angulo CGE; & angulus BCE, angulo CDE, æqualis est.

TAB. XIII. Non transeat jam CE, recta per centrum. Du-
fig. 10. cta igitur recta CF, per centrum, connectatur
c18. tertii. recta EF: eritque CF, perpendicularis ad AB,
d32. tertii. & angulus CEF, rectus; ac propterea reliqui
 anguli ECF, EFC, æquales erunt uni recto, ut
 angulo recto ACF. Dempto ergo communi an-
 gulo ECF, erit reliquus ACE, reliquo CFE,
e21. tertii. æqualis: Est autem angulo CFE, æqualis quo-
 que angulus CGE, cum uterque sit in segmento
 CGE. Quare angulus ACE, angulo CGE, æ-
 qualis erit. Quoniam vero in quadrilatero CDEG,
f22. tertii. duo anguli CDE, CGE, duobus sunt rectis æ-
g13. primi. quales: Sunt autem & duo anguli ACE, BCE,
 duobus rectis æquales; si auferantur æquales an-
 guli ACE, CGE, remanebit angulus BCE, an-
 gulo CDE, æqualis. Si circulum igitur tetigerit
 aliqua recta linea, à contactu autem, &c. Quod
 erat ostendendum.

xxxiiij. P R O B L. 5. P R O P O S. 33.

Super data recta linea describere segmen-
 tum circuli, quod capiat angulum æqualem
 dato angulo rectilineo.

TAB. XIII. **R**ecta data sit AB, & datus angulus primum
fig. 11. rectus C. Oportet igitur super AB, seg-
 mentum describere, in quo angulus existens sit
 æqualis angulo recto dato C. Divisa AB, bifa-
 riam in D, describatur centro D, intervallo au-
 tem DA, vel DB, semicirculus AEB; factumque
a32. tertii. erit, quod proponitur. Nam angulus AEB,
 in descripto semicirculo rectus est, ideoque æ-
 qualis angulo C, recto.

TAB. XIII. Sit deinde angulus datus acutus C. Ad pun-
fig. 12. ctum A, fiat angulus DAB, æqualis angulo C,
 acuto; & agatur ad DA, perpendicularis AE,
 quæ cadet supra AB. Fiat deinde angulo FAB,
 æqualis angulus FBA, secetque BF, rectam AE,
 in

in F. *b* Erunt igitur rectæ FA, FB, æquales. *b 6 primæ*
 Quare in centro F, & intervallo FA, circulus
 describatur AGB, transibit is per B. Dico igitur
 angulum in segmento AGB, quod descriptum
 est super AB, esse æqualem angulo C. Fiat
 enim angulus in dicto segmento AGB. Quia
 igitur AE, per centrum F, transit, & ei perpen-
 dicularis est DA, tanget DA, recta circulum in
 A, per coroll. propos. 16. hujus lib. Quapro-
 pter angulus DAB, hoc est, angulus datus C, *c 31. tertii.*
 æqualis erit angulo G, in segmento alterno
 AGB.

Sit tertio angulus datus H, obtusus. Fiat rursus
 angulo H, æqualis angulus IAB, & agatur ad IA,
 perpendicularis AE, quæ supra AB, cadet. Re-
 liqua omnia fiant, ut prius, descriptumque erit
 super AB, segmentum AKB, in quo angulus
 K, æqualis est angulo dato obtuso H. Nam
 angulus IAB, hoc est, angulus datus H, *d 31. tertii.*
 æqualis est angulo K, in alterno segmento AKB.
 Eadem enim est demonstratio. Itaque super data
 recta linea descripsimus segmentum, &c. Quod
 efficiendum erat.

PROBL. 6. PROPOS. 34. xxxiv.

A dato circulo segmentum abscindere ca-
 piens angulum æqualem dato angulo rectili-
 neo.

Datus circulus sit ABC, à quo auferre oportet *TAB. III.*
 segmentum, in quo angulus existens *fig. 13.*
 æqualis sit dato angulo D. Ducatur recta EF, *a 17. tertii.*
 tangens circulum in A. Fiat deinde angulus
 FAB, æqualis angulo dato D. Dico igitur an-
 gulum ACB, in segmento ablati ACB, æqua-
 lem esse dato angulo D. Est enim *b 31. tertii.*
 b angulus FAB, æqualis angulo C, in alterno segmento
 ACB. Cum ergo angulo dato D, factus sit
 æqualis angulus FAB, erit quoque angulus C,
 angulo D, æqualis. A dato ergo circulo absci-
 dimus

143. EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

dimus segmentum ACB, &c. Quod erat faciendum.

XXXV. THEOR. 29. PROPOS. 35.

Si in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuo secuerint, rectangulum comprehensum sub segmentis unius, æquale est ei, quod sub segmentis alterius comprehenditur, rectangulo.

TAB. XIX.

fig. 1.

In circulo ACBD, secent se mutuo rectæ AB, CD, in E. Dico rectangulum comprehensum sub segmentis AE, EB, æquale esse rectangulo comprehenso sub segmentis CE, ED. Aut enim utraque linea transit per centrum, aut una tantum, aut neutra. Trauseat primum utraque per centrum. Quoniam igitur omnia quatuor segmenta inter se æqualia sunt, perspicuum est, rectangulum comprehensum sub duobus unius lineæ æquale esse ei, quod sub duobus alterius lineæ comprehenditur, rectangulo, ex iis, quæ ad initium lib. 2. scripsimus.

fig. 2.

a 3. versu.

Trauseat deinde CD, sola per centrum F, dividatque primum rectam AB, bitariam, ac propterea ad angulos rectos, jungaturque recta BF. Quoniam igitur CD, divisa est per æqualia in F, & per inæqualia in E, b erit rectangulum sub CE, ED, una cum quadrato rectæ EF, æquale quadrato rectæ FD, ideoque quadrato rectæ FB, cum rectæ FD, FB, sint æquales: Est autem quadratum rectæ FB, c æquale quadratis rectarum FE, EB. Igitur rectangulum sub CE, ED, una cum quadrato rectæ EF, æquale quoque erit quadratis rectarum FE, EB. Quare ablato communi quadrato rectæ FE, EB, remanebit rectangulum sub CE, ED, æquale quadrato rectæ EB, hoc est, rectangulo sub AE, EB, cum AE, EB, rectæ sint æquales: ac proinde rectangulum sub eis comprehensum, sit quadratum, ex iis, quæ ad defn. 1. lib. 2. scripsimus. Divi-

b 5. versu.

c 47. primi




Fig. 2.





Fig. 5.





Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 11.





Fig. 13.



Dividat jam CD, transiens per centrum rectam *fig. 3, 4*
 AB, non bifariam. Secetur ergo AB, bifariam
 in G, ducanturque rectæ FG, FB, & eritque FG, d *3. terii.*
 perpendicularis ad AB. Quoniam vero rectangu-
 lum sub CE, ED, una cum quadrato rectæ FE,
 æquale est quadrato rectæ FD, hoc est, qua- *e 5. sec.*
 drato rectæ FB: Est autem quadratum rectæ FE,
 f æquale quadratis rectarum FG, GE, & quadra- *f 47. primi*
 tum rectæ FB, æquale quadratis rectarum FG,
 GB: erit quoque rectangulum sub CE, ED,
 una cum quadratis rectarum FG, GE, æquale
 quadratis rectarum FG, GB. Dempto ergo
 communi quadrato rectæ FG, remanebit rectan-
 gulum sub CE, ED, una cum quadrato rectæ
 GE, æquale quadrato rectæ GB. Atqui etiam
 rectangulum sub AE, EB, una cum quadrato
 rectæ GE, g æquale est eidem quadrato rectæ *g 5. sec.*
 GB: propterea quod recta AB, secta est bifariam
 in G, & non bifariam in E. Igitur rectangulum
 sub CE, ED, una cum quadrato rectæ GE, æ-
 quale est rectangulo sub AE, EB, una cum
 quadrato ejusdem rectæ GE: Quare ablato com-
 muni quadrato rectæ GE, remanebit rectangulum
 sub CE, ED, æquale rectangulo sub AE, EB.
 Quod est propositum.

Tertio neutra per centrum transeat, sive una *fig. 5, 6:*
 illarum bifariam dividatur, sive neutra. Ducatur
 per centrum F, & punctum sectionis E, recta
 GH. Quoniam itaque ostensum est, rectangulum
 sub AE, EB, æquale esse rectangulo sub GE,
 EH: sive AB, dividatur bifariam, sive non: Item
 rectangulum sub CE, ED, æquale esse quoque
 eidem rectangulo sub GE, EH; sive CD, secta
 sit bifariam, sive non; Erit rectangulum sub
 AE, EB, æquale rectangulo sub CE, ED, quod
 est propositum. Si in circulo igitur duæ rectæ
 lineæ sese mutuo secent, &c. Quod demon-
 strandum erat.

THEOR.

xxvi. THEOR. 30. PROPOS. 36.

Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ab eoque in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera quidem circulum fecet, altera vero tangat: Quod sub tota secante, & exterius inter punctum & convexam peripheriam assumpta comprehenditur rectangulum, æquale erit ei, quod à tangente describitur, quadrato.

TAB. XIV. Extra circulum ABC, punctum sumatur D, *fig. 7.*
a 17. tertii. à quo linea ducatur DA, secans circulum in C, *a* & linea DB, circulum tangens in B. Dico rectangulum sub DA, DC, æquale esse quadrato rectæ DB. Transeat enim primum recta *b 18. tertii.* DA, per centrum E, & jungatur recta EB, *b* quæ perpendicularis erit ad DB. Quoniam igitur CA, divisa est per æqualia in E, & ei addita in rectum *c 6. sec.* & continuum CD, *c* erit rectangulum sub DA, DC, una cum quadrato rectæ EC, hoc est, cum quadrato rectæ EB, æquale quadrato rectæ DE: *d 47. primi.* Est autem quadratum rectæ DE, *d* æquale quadratis rectarum EB, BD. Quare rectangulum sub DA, DC, una cum quadrato rectæ EB, æquale erit quadratis rectarum DB, BE. Ablato igitur communi quadrato rectæ BE, remanebit rectangulum sub DA, DC, quadrato rectæ DB, æquale. Quod est propositum.

TAB. XIV. Non transeat jam DA, secans per centrum E. *fig. 8, 9.*
e 18. tertii Divisa ergo AC, bifariam in F, ducantur rectæ EB, EC, ED, EF; *e* eritque EB, ad BD, perpendicularis; *f* & EF, ad AC. Quoniam igitur CA, divisa est per æqualia in F, & ei addita recta *g 6. sec.* CD, *g* erit rectangulum sub DA, DC, una cum quadrato rectæ CF, æquale quadrato rectæ DF. Addito igitur communi quadrato rectæ FE, erit rectangulum sub DA, DC, una cum quadratis rectarum CF, FE, æquale quadratis rectarum DF, *DF,*

DF, FE: Est autem quadratis rectorum CF, FE, *b*æquale quadratum rectorum EC, ideoque & quadratum rectorum EB; Et quadratis rectorum DF, FE, æquale est quadratum rectorum DE. Quare rectorum sub DA, DC, una cum quadrato rectorum EB, æquale erit quadrato rectorum DE. Cum igitur quadratum rectorum DE, æquale sit quadratis rectorum DB, BE; erit & rectorum sub DA, DC, una cum quadrato rectorum EB, æquale quadratis rectorum DB, BE. Ablato ergo communi quadrato rectorum BE, remanebit rectorum sub DA, DC, quadrato rectorum DB, æquale: quod est propositum. Si igitur extra circum sumatur punctum aliquod, &c. Quod erat demonstrandum.

b47. primi
i 47. primi

k 47. primi

COROLLARIUM I.

Hinc manifestum est, si à puncto quovis extra circum assumpto plurimæ lineæ rectorum circum secantes ducantur, rectorum comprehensa sub totis lineis, & partibus exterioribus, inter se esse æqualia. Ut si ex A, ducantur rectorum AC, AD, AE, secantes circum in F, G, H, erunt rectorum sub AC, AF; Item sub AD, AG; & sub AE, AH, æqualia inter se. Nam ducta AB, tangente circum, erunt quadrato rectorum AB, æqualia singula illa rectorum; quare & inter se omnia æqualia erunt.

TAB. XIV.
fig. 10.

136. tertii.

COROLLARIUM II.

Constat etiam, duas rectorum ab eodem puncto ductas, quæ circum tangant, inter se esse æquales. Ducantur enim ex A, rectorum AB, AC, tangentes circum: quas dico esse æquales inter se. Ducta enim rectorum AD, quæ circum secet in E, erit tam quadratum rectorum AB, quam quadratum rectorum AC, æquale rectorum sub AD, AE. Quare quadrata rectorum AB, AC, inter se æqualia erunt, ac propterea rectorum AB, AC, æquales quoque erunt.

TAB. XIV.
fig. 11.

m 36. tertii

COROLLARIUM. III.

Perpicuum quoque est, ab eodem puncto extra circum assumpto, duci tantum posse duas lineas, quæ circum tangant. Si enim præter duas AB, AC, duci possit tertia AD, circum eundem tangens; ductis rectis EB, ED, ex centro E, erunt anguli ABE, ADE, recti, ideoque æquales; quod est absurdum. Nam si ducatur recta AE, erit angulus ADE, major angulo ABE.

TAB. XIV. fig. 12.
n. 18. tertii.
o. 21. primi

Aliter. Si tertia AD, circum etiam tangat; erunt duæ tangentibus AB, AD, æquales, ut ostensum est; quod est absurdum. Ducta namque recta AE, ad centrum E, quæ circum secet in F, perit AD, cum sit propinquior minimæ AF, minor, quam AB, quæ à minima AF, remotior est. Vel sic. Si AB, AD, sunt æquales; additis æqualibus EB, ED, erunt quoque AB, BE, ipsi AD, DE, æquales, quod est absurdum.

p. 8. tertii.
q. 11. primi

Sunt enim majores AB, BE. Solum igitur duæ rectæ ducentur à puncto A, quæ circum tangant: Quod est propositum.

COROLLARIUM. IV.

Illud denique constat etiam, si duæ rectæ æquales ex puncto quopiam in convexam peripheriam inciant, & earum una circum tangat, alteram quoque circum tangere. Ut si duæ rectæ AB, AC, sint æquales, & AC, tangat circum in C, tanget quoque AB, eundem circum in B. Si enim non tangat, ducatur AD, tangens, eruntque ex 2. coroll. AC, AD, æquales. Cum ergo & AB, ipsi AC, æqualis ponatur, ducentur tres rectæ æquales AB, AC, AD, quod est absurdum.

TAB. XIV. fig. 12.
r. 8. tertii.

Duæ enim tantum duci possunt.

Aliter. Ponantur duæ rectæ æquales DB, DF, & DB, circum tangat, in B. Dico & DF, eundem tangere in F. Ductis enim rectis EB, EF, ex centro, erunt duo latera DB, BE, duobus lateribus DF, FE, æqualia, & basis DE, communis. Igitur anguli B, F, æquales erunt: Sed B, rectus est. Igitur & F, rectus erit, atque idcirco DF, circum tanget in F, ex coroll. propof. 16. hujus lib.

TAB. XIV. fig. 13.
s. 8. primi
t. 18. tertii.

THEOR.

THEOR. 31. PROPOS. 37. xxxvii.

Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ab eoque puncto in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera circulum secet., altera in eum incidat; sit autem, quod sub tota secante, & exterius inter punctum, & convexam peripheriam assumpta, comprehenditur rectangulum, æquale ei, quod ab incidente describitur, quadrato; Incidens ipsa circulum tanget.

EXtra circulum ABC, cujus centrum E, punctum sumatur D, a quo ducatur recta DA, circulum secans in C, & recta DB, incidens in circulum ejusque punctum B; sitque rectangulum sub DA, DC, æquale quadrato rectæ DB. Dico DB, circulum tangere in B. *a* Ducatur enim DF, tangens circulum, & jungantur rectæ EB, EF. Quod si DA, secans non transeat per centrum E, jungatur quoque recta DE. Quoniam igitur rectangulo sub DA, DC, æquale est quadratum rectæ tangentis DF: Et eidem rectangulo sub DA, DC, æquale ponitur quadratum rectæ DB: erunt quadrata rectarum DF, DB, inter se æqualia, ideoque & rectæ DF, DB, æquales inter se erunt. Itaque quia latera DF, FE, trianguli DFE, æqualia sunt lateribus DB, BE, trianguli DBE; & basis DE, communis, erunt anguli DFE, DBE, æquales. Atqui angulus DFE, rectus est, quod DF, circulum tangat. Igitur & angulus DBE, rectus erit. Quapropter per coroll. propos. 16. hujus lib. DB, circulum tanget; quod est propositum. Si ergo extra circulum sumatur punctum aliquod, &c. Quod erat demonstrandum.

TABLIV.
fig. 13.

a 17. tertii.

fig. 14.

b 36. tertii.

c 8. primi
d 18. tertii.



EUCLIDIS ELEMENTUM QUARTUM.

DEFINITIO. I.

Figura rectilinea in figura rectilinea inscribi dicitur, cum singuli ejus figuræ, quæ inscribitur, anguli singula latera ejus, in qua inscribitur, tangunt.



Gens Euclides quarto hoc libro de variis inscriptionibus figurarum rectilinearum in circulo, & earundem circa circulum descriptionibus: Item de inscriptionibus circuli in eisdem figuris, & circuli descriptionibus circa easdem: exponit paucis definitionibus, quid sit figuram in figura inscribi, aut circa figuram describi, incipiens à rectilineis figuris: Si igitur anguli

*TAB. XIV. D, E, F, trianguli interni DEF, tangant latera
fig. 15. AB, AC, BC, trianguli externi ABC; dicitur
fig. 16. triangulum DEF, in triangulo ABC, esse inscrip-
tum. At quoniam angulus M, trianguli KLM,
non tangit latus HI, trianguli GHI, non dicitur
triangulum KLM, inscribi in triangulo GHI,
quamvis totum illud sit intra hoc, duoque anguli
K, L, tangant duo latera GH, GI.*

DEFI-

DEFINITIO. II.

Similiter & figura circum figuram describi dicitur, cum singula ejus, quæ circumscribitur, latera singulos ejus figuræ angulos tetigerint, circum quam illa describitur.

E Contrario dicitur triangulum ABC , describi **TAB. XV.** circa triangulum DEF ; quoniam singula latera illius singulos hujus angulos tangunt; At triangulum GHI , non dicitur descriptum esse circa triangulum KLM , propterea quod latus illius HI , angulum hujus M , non tangit. Idem intelligendum est de inscriptionibus, ac circumscriptionibus aliarum figurarum rectilinearum.

DEFINITIO. III.

Figura rectilinea in circulo inscribi dicitur, cum singuli ejus figuræ, quæ inscribitur, anguli tetigerint circuli peripheriam.

UT si tangant anguli A, B, C , trianguli ABC , **TAB. XV.** peripheriam circuli ABC , dicitur triangulum **fig. 1.** in circulo esse inscriptum. Quod si vel unus tantum angulorum non tangeret peripheriam, non diceretur triangulum esse inscriptum in circulo.

DEFINITIO. IV.

Figura vero rectilinea circa circum descripta dicitur, cum singula latera ejus, quæ circumscribitur, circuli peripheriam tangunt.

AT vero si latera trianguli ABC , singula tangant **TAB. XV.** peripheriam circuli DEF ; dicitur triangulum **fig. 2.** circa circum esse descriptum.

DEFINITIO. V.

Similiter & circulus in figura rectilinea inscribi dicitur, cum circuli peripheria singula latera tangit ejus figuræ, cui inscribitur.

DEFINITIO. VI.

Circulus autem circum figuram describi dicitur, cum circuli peripheria singulos tangit ejus figuræ, quam circum scribit, angulos.

TAB. XV.
fig. 2. 1.

Vicissim dicitur circulus DEF, inscriptus esse in triangulo ABC: At vero circulus ABC, descriptus esse circa triangulum ABC. Idem judicium habet de aliis figuris rectilineis, quæ in circulo dicuntur inscribi, vel circa eundem describi; Aut in quibus circulus dicitur inscribi, vel circa quas describi circulus dicitur.









DEFINITIO. VII.

Recta linea in circulo accommodari, seu coaptari dicitur, cum ejus extrema in circuli peripheria fuerint.

TAB. XV.
fig. 3.

UT recta linea AB, quoniam ejus extrema A, & B, in peripheria circuli ABC, existunt, ceaptata, seu accommodata in dicto circulo esse dicitur: Non autem recta E, vel CD; quia hæc alterum duntaxat extremorum, nempe C, habet in peripheria circuli; Illa vero neutrum.

PROBL.





PROBL. I. PROPOS. I.

i

In dato circulo rectam lineam accommodare æqualem datæ rectæ lineæ, quæ circuli diametro non sit major.

IN circulo ABC, coaptanda sit recta linea æ- *TAB. XV.*
 qualis rectæ lineæ datæ D, quæ tamen major *fig. 4.*
 non sit diametro circuli dati. Cum enim diame-
 ter a sit omnium rectarum in circulo maxima, si a *15. servii*
 data recta diametro major foret, non posset in
 circulo aptari illi una æqualis. Ducatur ergo
 diameter BC. Itaque si data recta D, æqualis
 fuerit diametro, aptata erit BC, illi æqualis: Si
 vero D, minor fuerit diametro, b abscindatur BE, *b 3. primus*
 æqualis ipsi D, & centro B, intervallo autem
 BE, circulus describatur EA, secans circum-
 lum ABC, in A, ducta igitur recta BA, erit ea ap-
 data in circulo ABC, æqualis datæ rectæ D.
 Est enim BA, æqualis ipsi BE, & D, æqualis *c 15. def.*
 eidem BE, per constructionem. Quare AB, & *primus.*
 D, inter se æquales quoque erunt. In dato er-
 go circulo rectam lineam accommodavimus, &c.
 Quod faciendum erat.

PROBL. 2. PROPOS. 2.

ii

In dato circulo triangulum describere
 dato triangulo æquiangulum.

SIt in circulo ABC, dato describendum trian- *TAB. XV.*
 gulum æquiangulum triangulo dato cuicun- *fig. 5.*
 que DEF. Ducatur recta GH, tangens circum-
 lum in A, fiatque angulus GAB, angulo F, æqua-
 lis, & angulus HAC, angulo E, atque exten-
 dantur rectæ AB, AC, ad circumferentiam us-
 que in puncta B, & C, conjungaturque recta
 BC. (Non cadet autem recta AC, in rectam
 AB, vel inter rectas AB, AG: propterea quod
 K 4 anguli

152 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

a 17. *primi* anguli GAB, HAC, hoc est anguli F, E, & minores sunt duobus rectis. b Essent autem duobus rectis æquales, si AC, in AB, caderet; vel majores duobus rectis, si inter AB, AG, caderet.) Dico triangulum ABC, circulo dato inscriptum, esse æquiangulum dato triangulo DEF. Est enim c 32. *tertiū.* angulus C, & æqualis angulo GAB; & eidem angulo GAB, æqualis est angulus F, ex constructione. Quare anguli C, & F, inter se quoque erunt æquales. Similiter quia angulus B, d 32. *tertiū* æqualis est angulo HAC; & eidem angulo HAC, æqualis est, per constructionem, angulus E, erunt etiam anguli B, & E, inter se æquales. Cum igitur duo anguli B, & C, trianguli ABC, æquales sint duobus angulis E, & F, trianguli e 32. *primi* DEF, & erunt quoque reliqui anguli A, & D, æquales. Æquiangulum est ergo triangulum ABC, triangulo DEF. Quare in dato circulo triangulum descripsimus, &c. Quod faciendum erat.

ij;

PROBL. 3. PROPOS. 3.

Circa datum circulum triangulum describere dato triangulo æquiangulum.

TAB. XV. *fig. 9. 10.* Circa circulum datum ABC, describendum fit triangulum æquiangulum dato triangulo DEF. Producto latere EF, utrinque ad G, & H, sumptoque centro circuli I, ducatur recta utcumque AI, & fiat angulus AIB, æqualis angulo DEG, & angulus BIC, angulo DFH. Deinde ex A, B, C, educantur ad AI, BI, CI, perpendiculares KL, LM, MK, quæ circulum tangent in punctis A, B, C, per coroll. propof. 16. lib. 3. coibuntque in punctis K, L, M. Si enim duceretur recta AC, fierent duo anguli KAC, KCA, duobus rectis minores, ac proinde AK, CK, d 13. *primi.* coibunt, & c. Nam recta hæc ducta AC, caderet supra rectas AI, CI, quod hæc angulum constituent in I. Cum enim spatium circa I, æquale

æquale sit quatuor rectis ex coroll. 2. propos. 15. lib. 1. hoc est, quatuor angulis ad E, & F, sint- b 13. primi
 que duo anguli AIB, CIB, duobus angulis DEG, DFH, æquales; erit reliquum spatium AIC, reliquis duobus angulis DEF, DFE, æquale: Sed *a*hi minores sunt duobus rectis. Igitur & spatium AIC, minus erit duobus rectis, a 17. primi
 ac proinde angulus erit AIC. Alias spatium illud esset vel æquale duobus rectis, si nimirum AI, CI, unam rectam lineam constituerent; vel majus duobus rectis, si recta AI, producta, caderet supra IC. Cadit igitur necessario AI, producta intra CI, atque idcirco angulus fiet AIC, ad partes K, & ducta recta AC, faciet cum AK, CK, duos angulos minores duobus rectis, g 13. primi.
 & ideoque rectæ AK, CK, coibunt in K. Non secus ostendemus, AL, BL, coire in L, & CM, BM, in M: quia ductæ rectæ AB, BC, facient cum AL, BL, CM, BM, angulos minores duobus rectis. Descriptum est igitur circa circulum triangulum KLM, quod dico esse æquiangulum triangulo DEF. Quoniam enim omnes anguli in quadrilatero AIBL, æquales sunt quatuor rectis, ut ad 32. propos. lib. 1. ostensum fuit, & anguli IAL, IBL, sunt duo recti, erunt reliqui AIB, & L, duobus rectis æquales. Cum igitur *b* & anguli DEG, DEF, sint duobus rectis b 13. primi
 æquales; si auferantur æquales AIB, DEG, remanebit angulus L, angulo DEF, æqualis. Pari ratione ostendemus angulum M, æqualem esse angulo DFE. *c* Reliquus igitur angulus K, reliquo angulo D, æqualis erit; atque idcirco triangulum KLM, æquiangulum triangulo DEF. Circa datum ergo circulum, &c. Quod efficiendum erat. c 32. primi

P R O B L. 4. P R O P O S. 4. iv;

In dato triangulo circulum inscribere.

Sit describendus circulus in dato triangulo ABC, TAB. XV;
 Divisis duobus angulis ABC, ACB, bisariam fig. 11.
K 5 rectis

- b 9. *primi* rectis BD, CD *b*, quæ intra triangulum coeant in D, ducantur ex D, ad tria latera, perpendiculareres DE, DF, DG *c*. Quoniam igitur duo anguli DBE, DEB, trianguli DBE, æquales sunt duobus angulis, DBF, DFB, trianguli DBF, uterque utrique; & latus BD, commune; ærunt quoque latera DE, DF, æqualia. Eademque ratione æqualia erunt latera DF, DG, in triangulis DCF, DCG. Cum igitur tres rectæ DE, DF, DG, sint æquales; circulus ex D, ad intervallum DE, descriptus transibit per reliqua puncta F, & G *d*; tangetque latera trianguli in E, F, G, per coroll. propos. 16. lib. 3. quod latera perpendicularia sunt ad semidiametros DE, DF, DG. In dato ergo triangulo circulum descripsimus. Quod erat efficiendum.
- d 15. *def. primi.*

v. P R O B L. 5. P R O P O S. 5.

Circa datum triangulum circulum describere.

- TAB. XV. *fig. 12, 13, 14.* Sit circulus describendus circa datum triangulum ABC. Dividantur duo latera AC, AB, (quæ in triangulo rectangulo, vel obtusangulo sumenda sunt facilitatis gratia, circa rectum, vel obtusum angulum, quamvis hoc non sit omnino necessarium, sed duo quævis latera bitariam possint fecari) bitariam in D, & E *e*, punctis, ex quibus educantur DF, EF, perpendiculareres ad dicta latera, coeutes in F. (Quod enim coeant, patet. Nam si ducta esset recta DE, fierent anguli FDE, FED, duobus rectis minores) eritque F, vel intra triangulum, vel in latere BC, vel extra triangulum. Ducantur rectæ FA, FB, FC. Quoniam igitur latera AD, DF, trianguli ADF, æqualia sunt lateribus BD, DF, trianguli BDF, & anguli ad D, recti; ærunt bases FA, FB, æquales. Eodem modo erunt FA, FC, æquales. Cum ergo tres rectæ FA, FB, FC, sint æquales, circulus descriptus ex F, ad intervallum FA, transibit quoque per puncta B, & C. Circa
- a 4. *primi*

Circa datum ergo triangulum circulum descripsimus. Quod erat faciendum.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, si centrum intra triangulum cadat, omnes angulos esse acutos, quoniam omnes sunt in majori segmento circuli: si vero sit in latere BC, angulum BAC, ei lateri oppositum, esse rectum quod sit in semicirculo: Si denique cadat extra triangulum, angulum oppositum BAC, obtusum esse, cum sit in minori segmento circuli.

Contra vero perspicuum est, si triangulum fuerit acutangulum, centrum cadere intra triangulum: si rectangulum, in latus recto angulo oppositum: si denique obtusangulum fuerit, extra triangulum. Quod quidem facile ostendetur, ducendo ad incommodum aliquod, sive absurdum. Quia si in acutangulo caderet centrum in unum latus, esset angulus ei oppositus rectus: si vero extra, esset idem angulus obtusus. Item si in rectangulo centrum caderet intra, essent omnes anguli acuti, si vero extra, esset angulus oppositus obtusus. Denique si in obtusangulo caderet in unum latus, esset angulus ei oppositus, rectus, si vero intra, omnes anguli essent acuti. Quæ omnia ex priori parte hujus coroll. colliguntur, & pugnant cum hypothesis.

PROBL. 6. PROPOS. 6.

vi.

In dato circulo quadratum describere.

Si in dato circulo ABCD, cujus centrum E, inscribendum quadratum. Ducantur duæ diametri AC, BD, secantes se se ad angulos rectos in centro E, & jungantur rectæ AB, BC, CD, DA. Dico ABCD, esse quadratum inscriptum in dato circulo. Nam quia latera EA, EB, trianguli AEB; æqualia sunt lateribus EC, EB, trianguli CEB, cum omnia sint ex centro; & anguli contenti sunt recti; erunt bases AB, BC, æquales. Eadem ratione æquales erunt rectæ BC, CD: Item rectæ CD, DA, & rectæ DA, AB.

TAB. XV
fig. 15.

a 4. primi

156 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

AB. Omnia igitur latera quadrilateri ABCD, æqualia inter se sunt. Quod brevius ita concludemus. Quoniam quatuor anguli ad E, æquales sunt, nimirum recti; *b* erunt quatuor arcus, quibus insistant, æquales: *c* ac proinde & rectæ quatuor subtensæ æquales erunt. Omnia ergo latera quadrilateri ABCD, inter se æqualia sunt. Sunt autem *d* & anguli recti, cum omnes in semicirculis existant. Quare quadratum erit ABCDE, proptereaque in dato circulo quadratum descripsimus. Quod erat faciendum.

vij. PROBL. 7. PROPOS. 7.

Circa datum circulum quadratum describere.

TAB. XV. FIG. 16. Sit circa datum circulum ABCD, cujus centrum E, describendum quadratum. Ducantur duæ diametri AC, BD, secantes se in E, centro ad angulos rectos; & per A, B, C, & D, educantur ad diametros lineæ perpendiculares FG, FH, HI, IG, cocentes in punctis F, H, I, G. Quod enim cocant AF, BF, patet ex eo, quod ducta recta AB, faciat cum AF, BF, duos angulos duobus rectis minores; atque ita de reliquis. Dico FHIG, esse quadratum circa circulum datum descriptum. Cum enim anguli AEB, FBE, sint recti, erunt FH, AC, parallelæ; similiterque erunt GI, AC, parallelæ. Quare & FH, GI, parallelæ erunt. Eodem modo parallelæ erunt FG, HI. Quoniam igitur parallelogrammum est ACHF, erunt latera opposita AC, FH, æqualia, & anguli oppositi ACH, AFH, æquales: Sed ACH, est rectus. Igitur AFH, rectus erit. Eadem ratione ostendemus angulos H, I, G, rectos esse: & latera HI, IG, GF, æqualia esse diametris BD, AC. Quare cum diametri sint æquales, erunt & quatuor latera FG, FH, HI, IG, æqualia, ideoque FGIH,

FGIH, quadratum erit; cujus quidem latera circulum tangunt, per corollarium propof. 16. lib. 3. Circa datum igitur circulum quadratum descripsimus. Quod erat efficiendum.

PROBL. 8. PROPOS. 8. viij.

In dato quadrato circulum describere.

It in dato quadrato ABCD, inscribendus circulus. Divisis lateribus bifariam in E, F, G, H, ducantur rectæ EG, FH, secantes se in I. Quoniam igitur AD, BC, rectæ æquales sunt, & parallelæ; erunt & dimidiæ earum AH, BF, æquales & parallelæ. Quare & AB, parallela est, & æqualis ipsi FH. Eadem ratione erit DC, parallela, & æqualis eidem FH: Itemque rectæ AD, BC, parallelæ erunt, & æquales ipsi EG. Sunt igitur parallelogramma AI, IB, CI, ID, ideoque rectæ IE, IF, IG, IH, æquales erunt rectis AH, EB, DH, AE: Sunt autem hæ inter se æquales, cum sint semisses æqualium AD, AB, &c. Quare & rectæ IE, IF, IG, IH, æquales erunt, ac propterea circulus descriptus ex I, ad intervallum IE, transibit quoque per puncta F, G, H, qui cum contingat latera AB, BC, CD, DA, per coroll. propof. 16. lib. 3. quod anguli ad E, F, G, H, sint recti, descriptus erit in quadrato AC. In dato ergo quadrato circulum descripsimus. Quod efficiendum erat.

PROBL. 9. PROPOS. 9. ix.

Circa datum quadratum circulum describere.

It describendus circulus circa quadratum ABCD. Ducantur diametri AC, BD, secantes se in E. Quoniam igitur latera AB, AD, trianguli ABD; æqualia sunt & erunt anguli ABD, ADB, æquales:

158 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

b32. primus les : Est autem angulus BAD, rectus. Quare ABD, ADB, semirecti erunt. Similiter ostendemus, reliquos omnes angulos ad A, B, C, D, esse semirectos, & idcirco inter se æquales. Cum ergo anguli EAD, EDA, sint æquales; *c 6. primus* erunt rectæ EA, ED, æquales. Eadem ratione EA, EB, æquales erunt; nec non EB, EC. Item EC, ED. Quare circulus ex E, descriptus, intervallo EA, transibit per reliqua puncta B, C, D. Circa datum ergo quadratum circulum descripsimus. Quod erat faciendum.











S C H O L I U M.

TAB. XVI. Quod si circa datum circulum EFGH, describatur *fig. 1.* quadratum ABCD, & in eodem circulo aliud quadratum EFGH, inscribatur, erit quadratum circumscriptum ABCD, quadrati inscripti HEFG, duplum. Quoniam enim latus AB, quadrati circumscripti æquale est diametro HF, circuli, ut ex 7. propos. hujus lib. constat, hoc est, diametro HF, quadrati inscripti HEFG: quadratum vero diametri HF, duplum est quadrati HEFG, cuius est diameter, ut ad 47. propos. lib. 1. ostendimus; Constat proposuimus.

2. P R O B L. 10. P R O P O S. 10.

Isoceles triangulum constituere; quod habeat utrumque eorum, qui ad basin sunt, angulorum duplum reliqui.

TAB. XVI. Sumatur quævis recta linea, AB, quæ *fig. 2.* dividatur in C, ita ut rectangulum sub AB, BC, æquale sit quadrato rectæ AC. Deinde *a 11. sec.* centro A, intervallo vero AB, circulus describatur, in quo accommodetur recta BD, æqualis ipsi AC, jungaturque recta AD. Quoniam autem rectæ AB, AD, æquales sunt, erit triangulum ABD, Isoceles. Dico utrumque angulorum ABD, ADB, duplum esse reliqui anguli *b1. quart.* A.





LIBER QUARTUS. 159

A. Ducta enim recta CD, *e* describatur circulo *e* *g*. *quinto*.
 triangulum ACD, circulus DCA. Quoniam
 igitur rectangulum sub AB, BC, æquale est
 quadrato rectæ BD, & recta AB, fecat circulum
 DCA, *d* tanget recta BD, eundem circulum *d* *g*. *tertio*.
 DCA, in D. Quare angulus BDC, *e* æqualis *e* *g*. *tertio*
 est angulo A, in alterno segmento CAD. Ad-
 ditio igitur communi CDA, erit totus angulus
 ADB, æqualis duobus angulis CAD, CDA :
 Sed his eidem *f* æqualis est etiam angulus exter- *f* *g*. *primo*
 nus BCD. Angulus ergo BCD, æqualis erit
 angulo ADB, hoc est, angulo ABD, *g* cum *g*. *primo*
 ABD, ADB, æquales sint; ac propterea *b* rectæ *h* *g*. *primo*
 CD, BD, æquales erunt: Est autem BD, æ-
 qualis posita rectæ AC. Igitur & CD, ipsi CA,
 æqualis erit; *i* ac propterea anguli CAD, CDA, *i* *g*. *primo*
 æquales. Angulus igitur ADB, qui æqualis
 ostensus est duobus angulis CAD, CDA, duplus
 erit alterius eorum, anguli nimirum A. Quare
 & angulus ABD, duplus erit ejusdem anguli A.
 Isosceles ergo Triangulum constituimus, habens,
 &c. quod erat efficiendum.

COROLLARIUM.

Quoniam vero tres anguli trianguli ABD, *k* æquales *k* *g*. *primo*
 sunt duobus rectis, hoc est, quinque quintis duorum
 rectorum: perspicuum est, angulum A, esse quintam
 partem duorum rectorum; utrumlibet autem B, D, duas
 quintas partes. Item A, esse duas quintas partes unius
 recti, & utrumvis B, D, quatuor quintas partes; quan-
 doquidem omnes tres *l* æquales sunt duobus rectis, hoc *l* *g*. *primo*
 est, decem quintis unius recti.

PROBL. II. PROPOS. II. xi

In dato circulo, pentagonum æquilaterum,
 & æquiangulum inscribere.

§ It in dato circulo ABCDE, inscribendum pen- *TAB XVI*
 tagonum æquilaterum, & æquiangulum. *§ 3.*
 ¶ Con-

20. quart. *a* Construat^r triangulum Iſofceles, FGH, ita ut
 uterque angulorum G, H, duplus ſit reliqui F,
21. quart. & in circulo *b* inſcribatur triangulum ACD, æ-
 quiangulum triangulo FGH, & uterque angulo-
22. prim. rum ACD, ADC, *c* bifariam dividatur rectis CE,
 DB; atque rectæ jungantur AB, BC, CD, DE,
 EA. Dico pentagonum ABCDE, in circulo
 dato inſcriptum, eſſe æquilaterum, & æquiangu-
 lum. Cum enim uterque angulorum ACD,
 ADC, duplus ſit anguli CAD, & diviſus bifa-
 riam; erunt quinque anguli ADB, BDC, CAD,
23. tertii. DCE, ECA, æquales. *d* Quare arcus AB, BC,
 CD, DE, EA, ſuper quos aſcenderunt, atque
24. tertii. idcirco *e* & rectæ AB, BC, CD, DE, EA, æ-
 quales erunt, æquilaterum eſt igitur pentagonum
 ABCDE. Rurſus quia arcus AB, ED, æqua-
 les ſunt; addito communi BCD, ſient æquales
27. tertii. ABCD, EDCB. *f* Anguli ergo AED, BAE,
 dictis arcibus inſiſtentes, æquales erunt. Eodem
 modo æquales erunt cuilibet horum angulorum
 reliqui anguli. Inſiſtunt enim æqualibus arcibus,
 quorum ſinguli ex ternis arcibus æqualibus com-
 ponuntur. Æquiangulum eſt ergo pentagonum
 ABCDE. Quare cum & æquilaterum eſſe ſit
 oſtenſum, inſcriptum erit dato circulo pentago-
 num æquilaterum, & æquiangulum. Quod ſaci-
 endum erat.

C O R O L L A R I U M.

Sequitur hinc, angulum Pentagoni æquilateri, &
 æquianguli complecti tres quintas partes duorum rectorum,
27. tertii. vel ſex quintas unius recti. *g* Cum enim tres anguli
 EAC, CAD, DAE, æquales ſint, utpote qui æqualibus
 arcibus BC, CD, DE, inſiſtant, ſit autem CAD, per
 coroll. præcedentis propoſ. quinta pars, duorum rectorum,
 vel duæ quintæ unius recti: erit totus BAE, tres quintæ
 duorum rectorum, vel ſex quintæ unius recti.

PROBL.

Circa datum circulum, pentagonum æquilaterum, & æquiangulum describere.

It circa datum circulum ABCDE, describen- *TAB. XVI.*
 dum pentagonum æquilaterum, & æquiangu- *fig. 4*
 lum. *a* Inscribatur in eo pentagonum æquilate- *a 11. quart.*
 rum, & æquiangulum ABCDE, & ex centro
 F, ducantur rectæ FA, FB, FC, FD, FE, ad
 quas ducantur perpendiculares GH, HI, IK,
 KL, LG, cocuntes in G, H, I, K, L. Cum
 enim anguli GAE, GEA, duobus sint rectis
 minores, partes nimirum angulorum rectorum
 FAG, FEG; *b* coibunt rectæ AG, EG, ad par- *b 13. prim.*
 tes G, & sic de aliis. Et quia ipsæ tangunt
 circulum, per coroll. propof. 16. lib. 3. erit de-
 scriptum pentagonum GHIKL, circa circulum;
 quod dico esse æquilaterum atque æquiangulum.
 Ductis enim rectis FG, FH, FI, FK, FL,
 erunt quadrato rectæ FH, & æqualia tam quadrata *c 47. prim.*
 rectorum FA, AH, quam rectorum FB, BH.
 Quare quadrata rectorum FA, AH, æqualia
 erunt quadratis rectorum FB, BH. Demptis
 igitur quadratis æqualibus rectorum æqualium
 FA, FB, remanebunt quadrata rectorum AH,
 BH, æqualia; ideoque & rectæ AH, BH, æqua-
 les erunt. Quod etiam constat ex coroll. 2.
 propof. 36. lib. 3. cum AH, BH, ex eodem
 puncto H, ducantur circulum tangentes in A,
 & B. Quoniam ergo latera AF, FH, trianguli
 AFH, æqualia sunt lateribus BF, FH, trianguli
 BFH. Est autem & basis AH, basi BH, æqua-
 lis, ut ostensum est; *d* erunt anguli AFH, BFH, *d 8. prim.*
 æquales. Igitur *e* & anguli AHF, BHF: Du- *e 14. prim.*
 plus igitur est angulus AFB, anguli BFH, &
 angulus AHB, anguli BHF. Eodem modo
 ostendemus, angulum BFC, duplum esse anguli
 BFI, & angulum BIC, anguli BIF. Cum igitur
 anguli AFB, BFC, sint æquales, quod in- *f 27. tert.*
 L *fistant*

28. *tert.* *h. 26. prim.* fistant circumferentiis AB, BC, & quæ æquales sunt, cum à rectis æqualibus subendantur AB, BC; erunt & dimidii eorum BFH, BFI, æquales. Quocirca cum duo anguli BFH, HBF, trianguli BFH, æquales sint duobus angulis BFI, IBF, trianguli IFB, & latus illis adjacens commune BF, erunt & latera BH, BI, æqualia, & anguli BHF, BIF, æquales. Dupla est ergo recta HI, rectæ HB. Eademque ratione ostendemus GH, rectam duplam esse rectæ AH. Sunt autem ostensæ æquales HB, HA. Igitur & earum duplæ HI, HG, æquales erunt. Similiter demonstrabimus, rectas IK, KL, LG, æquales esse cuilibet rectarum HI, HG. Æquilaterum ergo est pentagonum GHIKL. Rursus quoniam ostensum est, angulos BHF, BIF, æquales esse, ac semisses angulorum BHA, BIC; erunt & eorum dupli BHA, BIC, æquales. Eademque ratione anguli IKL, KLG, LGH, æquales erunt cuilibet angulorum BHA, BIC. Æquiangulum igitur est pentagonum GHIKL. Quapropter cum & æquilaterum sit ostensam, descriptum erit circa datum circulum pentagonum æquilaterum, & æquiangulum. Quod efficiendum erat.

C O R O L L A R I U M.

Sequitur ex hujus problematis demonstratione; si in circulo quæcunque figura æquilatera, & æquiangula describatur, & ad extrema semidiametrorum ex centro ad angulos ductarum excidentur lineæ perpendiculares: has perpendiculares constituere aliam figuram totidem laterum, & angulorum æqualium circulo circumscriptam. Eadem enim semper ratione demonstrabitur, illas perpendiculares concurrere, angulosque conficere æquales, si nimirum ab illis ad centrum ducantur rectæ, ut in pentagono factum est: quæ quidem ipsos angulos bisariam secabunt, quemadmodum in pentagono hic probatum est, &c.

S C H O L I U M.

In figura æquilatera, & æquiangula, si quidem angulorum numerus impar est, recta linea ex quovis angulo demissa secans oppositum latus bisariam, dividit quoque angulum bisariam; Et contra, recta linea dividens angulum bisariam, secat quoque latus oppositum bisariam: Si vero numerus angulorum est par, recta linea ex quovis angulo ad oppositum angulum ducta secat utrumque angulum bisariam: Et contra, recta linea secans quovis angulum bisariam cadit in oppositum angulum, eumque bisariam quoque dividit.

Sit primam figura æquilatera, æquiangulaque imparium laterum ABCDEFG, & ex angulo A, demissa LABXVL recta AH, secet latus oppositum DE, bisariam. fig. 5.
Dico angulum quoque BAG, sectum esse bisariam. Ductis enim ex A, rectis ad omnes angulos non proximos; quoniam duo latera BA, BC, duobus lateribus GA, GF, equalia sunt angulosque continent æquales, ex hypothesis; erunt & bases AC, AF, i 4. primæ æquales; & tam anguli BAC, GAF, quam BCA, GFA: ac proinde cum toti anguli BCD, GFE, ponantur æquales; erunt quoque reliqui ACD, AFE, æquales. Quia igitur rursus duo latera CA, CD, duobus lateribus FA, FE, equalia sunt; continentque angulos æquales, ut ostensum est; erunt & k 4. primæ bases AD, AE, æquales, & tam anguli CAD, FAE, quam CDA, FEA. Atque ita procedendum erit, donec ad latus oppositum perventum sit. Ubi quia rursus toti anguli CDE, FED, æquales sunt; erunt quoque reliqui ADH, AEH, æquales. Quare cum duo latera DA, DH, duobus lateribus EA, EH, equalia sint, angulosque æquales contineant, erunt etiam anguli DAH, EAH, æquales. Quo- l 4. primæ circa cum quovis anguli BAC, CAD, DAH, totidem angulis GAF, FAE, EAH, sint æquales, singuli singulis; erit quoque totus angulus BAH, toti

164 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

toti angulo GAH equalis; ac proinde angulus BAG , secus erit bifariam. Quod est propositum.

Sed jam recta AH , secet angulum BAG , bifariam. Dico eam secare quoque latus oppositum DE , bifariam. Si enim dicatur latus DE , non secari bifariam, si ex A , ducatur alia recta secans DE , bifariam, secabit eadem & angulum BAG , bifariam, ut jam ostendimus. Dua igitur recta eundem angulum BAG , secabunt bifariam, quod est absurdum, cum una medietas major esset quam altera. Recta ergo AH , secans angulum BAG , bifariam, secat quoque latus DE , bifariam. Quod est propositum.

Sit deinde figura æquilatera, & æquiangula pentagonum laterum $ABCDEFGH$, & ex angulo A , ad angulum oppositum E , ducatur recta AE . Dico rectam AE , secare tam angulum BAH , quam DEF , bifariam. Ductis enim ex A , ad omnes angulos non proximos rectis, demonstrabimus, ut in antecedente figura, quovis angulus BAC , CAD , DAE , totidem angulis HAG , GAF , FAE , esse æquales singulos singulis; ideoque totum angulum BAE , toti angulo HAE , æqualem esse, nec non & angulum DEA , FEA , esse æqualem. Uterque igitur angulus BAH , DEF , secatur bifariam. Quod est propositum.

Sed jam recta EA , secet angulum BAH , bifariam. Dico eam cadere in angulum oppositum E , eumque dividere bifariam. Si enim non dicatur cadere in E , si ex A , ad E , ducatur alia recta, secabit ea angulum BAH , bifariam, ut jam ostendimus. Dua igitur recta eundem angulum BAH , bifariam secabunt, quod est absurdum. Recta ergo AE , secans angulum BAH , bifariam, cadit in E , secatque propterea, ut demonstratum est proxime, angulum DEF , bifariam quoque. Quod est propositum.

xij.

P R O B L. 13. P R O P O S. 13.

In dato pentagono æquilatero & æqui-
angulo circulum inscribere.

TAB. XVI.
fig. 7.

It inscribendus circulus in dato pentagono
 $ABCDE$. Dividantur duo ejus anguli BAE ,
 ABC ,

ABC, proximi bifariam a rectis AF, BF, quæ a 9. primi
 coeant in F. Cum enim ex scholio præcedentis
 propositionis rectæ AF, BF, secent opposita latera
 CD, DE, bitariam, necesse est, duas rectas AF,
 BF, se mutuo intra pentagonum secare, prius-
 quam rectis CD, DE, occurrant. Connectan-
 tur deinde rectæ FC, FD, FE. Quoniam igitur
 latera AB, BF, trianguli ABF, æqualia sunt la-
 teribus CB, BF, trianguli CBF: Sunt autem ex
 constructione, & anguli ipsis contenti æquales
 ABF, CBF; erunt bases AF, CF, & anguli b 4. primi
 BAF, BCF, æquales. Cum igitur anguli BAE,
 BCD, ponantur æquales, & BAF, dimidium sit
 anguli BAE, per constructionem; erit & BCF,
 dimidium anguli BCD. Divisus est ergo angu-
 lus BCD, bifariam. Simili modo ostendemus,
 reliquos duos angulos CDE, DEA, divisos esse
 bifariam. Ducantur jam ex F, ad singula Pen-
 tagoni latera perpendiculares FG, FH, FI, FK,
 FL. Quoniam igitur duo anguli FGA, FAG,
 trianguli FAG, æquales sunt duobus angulis,
 FLA, FAL, trianguli FAL; estque latus AF,
 subtensum uni æqualium angulorum commune
 erunt & rectæ FG, FL, æquales. Similiterque c a 6. primi
 ostendentur reliquæ perpendiculares FH, FI, FK,
 æquales cuilibet istarum. Circulus igitur de-
 scriptus ex centro F, & intervallo FG, transibit
 per puncta quoque H, I, K, L. Quoniam vero
 latera pentagoni circulum hunc tangunt; per
 coroll. propof. 16. lib. 3. eo quod angulos re-
 ctos faciant cum semidiametris FG, FH, &c.
 erit circulus in dato pentagono inscriptus. Quod
 faciendum erat.

T H E O R. 14. P R O P O S. 14. xiv.

Circa datum pentagonum æquilaterum,
 & æquiangulum circulum describere.

Sit circa pentagonum ABCDE, æquilaterum, TAB. XVI.
 & æquiangulum, circulus describendus. Di-
 fig. 8.
 L 3 visis

b 9. primus visis duobus angulis BAE, ABC, bifariam *b* rectis AF, BF, quæ coeant in F, intra pentagonum, ut in antecedente propos. demonstratum est; & conjunctis rectis FC, FD, FE, ostendemus, ut in præcedenti problemate, reliquos etiam angulos BCD, CDE, DEA. sectos esse bifariam. Erunt ergo omnes anguli dimidii inter se æquales, quod toti anguli æquales ponantur. Quoniam igitur in triangulo AFB, duo anguli æquales sunt *a 6. primus* FAB, FBA; *a* erunt rectæ FA, FB, æquales. Eademque ratione erunt reliquæ FC, FD, FE, cuilibet istarum æquales. Quare circulus describitur ex centro F, intervallo autem FA, transibit quoque per puncta B, C, D, E. Circa datum ergo pentagonum, &c. Quod faciendum erat.

xx. PROBL. 15. PROPOS. 15.

In dato circulo, hexagonum & æquilaterum & æquiangulum inscribere.

TAB. XL
fig. 9. **S**It in dato circulo ABCDEF, cujus centrum G, inscribendum hexagonum æquilaterum, & æquiangulum. Ducta diametro AD, describatur circulus ex centro D, intervallo vero DG, qui secet circumulum datum in punctis C, & E, è quibus per centrum G, rectæ extendantur CF, EB. Si igitur connectantur rectæ AB, BC, CD, DE, EF, FA, inscriptum erit in dato circulo hexagonum ABCDEF; quod dico esse & æquilaterum & æquiangulum. Cum enim recta GC, æqualis sit rectæ GD, & recta DC, æqualis eidem rectæ DG, ex definitione circuli: erunt & rectæ GC, DC, æquales inter se: Ideoque triangulum CDG, erit æquilaterum. Quare *a* tres anguli CGD, GDC, DCG, æquales inter se *b 31. primus* erunt: qui cum *b* æquales sint duobus rectis, erit quilibet illorum, nempe CGD, tertia pars duorum rectorum. Eodem modo erit angulus DGE, tertia pars duorum rectorum: Sunt autem tres

tres anguli CGD, DGE, EGF, & æquales duobus rectis. Reliquus igitur angulus EGF, tertia quoque pars erit duorum rectorum. Sunt ergo tres anguli CGD, DGE, EGF, inter se æquales; quibus cum etiam æquales sint ad verticem anguli FGA, AGB, BGC; erunt sex anguli ad centrum G, æquales. Quare circumferentiarum quibus insistent, fac propterea rectorum AB, BC, CD, DE, EF, FA, æquales erunt. Quapropter æquilaterum est hexagonum ABCDEF. Rursus quia circumferentia BC, æqualis est circumferentiarum AF; si addatur communis CDEF, erunt circumferentiarum BCDEF, AFEDC, æquales. Anguli igitur ipsis insistentes BAF, ABC, æquales erunt. Similiterque ostendemus, reliquos angulos BCD, CDE, DEF, EFA, æquales esse cuilibet istorum, quia nimirum quilibet insitit arcui composito ex quatuor arcubus æqualibus, nimirum ex tot, quot latera continet figura inscripta, demptis duobus. Ex quo fit, angulos omnes æqualibus arcubus insistere. Quare æquiangulum quoque est hexagonum ABCDEF. In dato ergo circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum descripsimus. Quod faciendum erat.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, Hexagoni latus æquale esse semidiametro circuli. Nam DC, latus hexagoni, æquale est semidiametro DG, ex definitione circuli.

PROBL. 16. PROPOS. 16. xvi.

In dato circulo, quintidecagonum & æquilaterum, & æquiangulum describere.

Si in dato circulo ABC, inscribendum Quintidecagonum æquilaterum, & æquiangulum. Constituto triangulo æquilatere D, quod ex coroll. propos. 5. lib. 1. erit etiam æquiangulum; & inscribatur ei æquiangulum triangulum ABC.

TAB. XVI.
fig. 10.

22. quart.

in dato circulo, quod etiam erit æquilaterum, ex coroll. propof. 6. lib. 1. *b 26. vel a8. tertii.* beruntque tres arcus AB, BC, CA, æquales, vel propter tres rectas AB, BC, CA, æquales, vel propter tres æquales angulos A, B, C, trianguli ABC. Qualium igitur partium æqualium quindecim est circumferentia tota ABC, talium quinque erit arcus AB, qui tertia pars est totius circumferentiæ. *c 11. quart.* Inscrí-
 batur rursus in dato circulo pentagonum æquila-
 terum, & æquiangulum AEF GH; applicans un-
 dum angulorum ad punctum A, *d 18. tertii.* deruntque quin-
 que arcus AE, EF, FG, GH, HA, æquales. Qualium igitur partium æqualium quindecim est tota circumferentia ABC, talium trium erit arcus AE, quinta pars existens totius circumferentiæ. Itaque cum arcus AB, contineat tales partes quinque, & arcus AE, tres; continebit reliquus
e 30. tertii. arcus EB, duas. *e* Diviso ergo arcu EB, bifariam in I, erit arcus BI, pars decima quinta totius circumferentiæ. Quare ducta recta BI, subtendet decimam quintam partem totius circumferentiæ; cui si aliæ quatuordecim, *f 1. quart.* f æquales in circulo accommodentur, inscriptum erit in circulo quin-
g 17. tertii. tidedecagonum æquilaterum, quod *g* & æquiangu-
 lum est, cum ejus anguli subtendant arcus æqua-
 les, compositos videlicet ex 13. arcibus æqualibus omnes, ut perspicuum est, In dato igitur circulo quintidecagonum, &c. Quod faciendum erat.
 Similiter autem per ea, quæ dicta sunt de pen-
 tagono supra, propof. 12. 13. & 14. describemus circa datum circulum quintidecagonum æquilate-
 rum, & æquiangulum. Item in dato quintideca-
 gono æquilatere, & æquiangulo circulum inscri-
 bebimus; & tandem circa datum quintidecagonum describemus circulum.



EUCLIDIS ELEMENTUM QUINTUM.

Bgit in antecedentibus quatuor libris Euclides de quantitate continua absolute considerata; Nunc vero duobus sequentibus de eadem disputat non absolute, sed prout una ad aliam refertur, hoc est, quatenus comparata cum alia proportionem aliquam habet. Hoc quidem quinto libro docet proportiones quantitatum continuarum in genere, non descendendo ad ullam quantitatis speciem, ut ad lineam, superficiem, vel corpus aliquod. Sexto vero libro ostendit in specie, quamnam proportionem habeant inter se linea, anguli, circumferentia circulorum, triangula, & alia figura plana. Ut igitur institutum suum servet, definit prius vocabula, qua ad demonstrationes proportionum adhibentur.

DEFINITIO. I.

Pars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, cum minor metitur majorem.

ITaque ait magnitudinem illam minorem, qua majorem quampiam magnitudinem metitur, appellari *partem*. Ut quoniam magnitudo *A*, ter sumpta, metitur

metitur magnitudinem B , sexies autem sumpta, magnitudinem C , dicitur magnitudo A , pars magnitudinum B , & C . At vero quia magnitudo D , non metitur magnitudines E , & F , sed sumpta bis, excedit magnitudinem E , & sumpta ter, deficit à magnitudine F , sumpta autem quater, eandem superat; non appellabitur magnitudo D , pars magnitudinum E , & F .

D E F I N I T I O. II.

Multiplex autem est major minoris, cum minor metitur majorem.






TAB. XVI. **UT** in superiori exemplo tam magnitudo B , quam magnitudo C , multiplex est magnitudinis A , quoniam hæc utramque illam metitur. At vero neque magnitudo E , neque magnitudo F , multiplex est dicenda magnitudinis D , propterea quod hæc neutram illarum metitur. Itaque pars ad multiplex refertur, & multiplex ad partem, ita ut minor quantitas mensurans majorem, dicatur pars majoris; Major vero mensurata à minori, dicatur minoris multiplex.

Ceterum quando due magnitudines minores duas alias majores aequè metiuntur, hoc est, una minor in una majore toties continetur, quoties altera minor in altera majore; dicuntur due hæc majores duarum illarum minorum aequè multiplices. Quod idem dices, si plures minores aequè metiantur plures majores.

D E F I N I T I O. III.

Ratio est duarum magnitudinum ejusdem generis mutua quædam secundum quantitatem, habitudo.

Quando due quantitates ejusdem generis, ut duo numeri, dua lineæ, dua superficies, dua solida,





da, &c. inter se comparantur secundum quantitatem, hoc est, secundum quod una major est, quam altera, vel minor, vel equalis; appellatur hujusmodi comparatio, seu habitus mutua, Ratio; seu (ut aliis placet) Proportio. Itaque si compararetur linea aliqua cum superficie quapiam, vel numerus cum linea, non diceretur ea comparatio proportio, quod neque linea, & superficies; neque numerus, & linea sint ejusdem generis quantitatis. Similiter si conferatur linea aliqua cum alia linea secundum qualitatem, hoc est secundum quod una est alba, & altera nigra; aut quod una est calida, & altera frigida, &c. quamvis ambae sint ejusdem generis, non diceretur ea comparatio proportio, quia non fit secundum quantitatem.

Quamquam autem in solis quantitibus proprie reperitur proportio, tamen omnia alia, quae aliquo modo naturam sapiunt quantitatis, cujusmodi sunt tempora, soni, voces, loca, motus, pondera, & potentia, proportionem quoque dicuntur habere, si eorum habitudo consideretur secundum quantitatem. Ut cum dicimus, tempus tempore esse majus, vel minus, vel duo tempora esse aequalia, &c. appellabitur ejusmodi habitudo, proportio; quoniam tempora tunc considerantur, veluti quantitates quaedam.

Ceterum in omni proportionem ea quantitas, quae ad aliam refertur, dicitur ab Euclide, & Geometris aliis antecedens proportionis; Ea vero, ad quam alia refertur, consequens proportionis dici solet. Ut in proportionem linea 6. palmorum ad lineam 3. palmorum, linea 6. palmorum dicitur antecedens proportionis, at linea 3. palmorum, proportionis consequens. Quod si e contrario consideretur proportio linea 3. palmorum ad lineam 6. palmorum, appellabitur antecedens linea 3. palmorum, consequens vero linea 6. palmorum, & sic in ceteris.

DEFI.

DEFINITIO. IV.

Proportio vero est rationum similitudo.

Quod hoc loco interpretis proportionem appellat, illud Græcis ἀναλογία, plerisque autem Latinis proportionalitas dicitur. Quemadmodum igitur comparatio duarum quantitatum inter se, dicitur proportio; Ita comparatio duarum, vel plurium proportionum inter se, proportionalitas solet nuncupari. Ut si proportio quantitatis A , ad quantitatem B , similis fuerit proportioni quantitatis C , ad quantitatem D , dicetur habitudo inter has proportiones, proportionalitas. Eodem modo, si similis fuerit proportio E , ad F , proportioni, F , ad G , appellabitur hæc similitudo proportionalitas.

TAB.
XVII.
fig. 1.
fig. 2.

fig. 2.

fig. 1.

Euclides de sola Geometrica agit hoc libro; qua quidem duplex est, continua altera, in qua singula quantitates intermedia bis sumuntur, ita ut nulla fiat proportionum interruptio, sed qualibet quantitas intermedia sit & antecedens, & consequens; Antecedens quidem quantitatis subsequens, consequens vero quantitatis antecedentis. Ut si dicatur, qua est proportio E , ad F , ea est F , ad G , vocabitur hæc proportionalitas, continua. Altera vero discreta, seu non continua, in qua singula quantitates intermedia semel tantum accipiuntur, ita ut fiat proportionum interruptio, nullaque quantitas sit & antecedens, & consequens, sed vel antecedens tantum, vel consequens tantum. Ut si dicatur, qua proportio A , ad B , ea est C , ad D , appellabitur proportionalitas hæc, discreta, sive non continua.

DEFINITIO. V.

Rationem habere inter se magnitudines dicuntur, quæ possunt multiplicatæ se se mutuo superare.

Quoniam Euclides in tertia definitione habitudinem duarum magnitudinum ejusdem generis, vocaverat rationem, quam nos cum aliis auctoribus proportionem dicimus; explicat nunc definitione hac; quidnam requirant dua quantitates ejusdem generis, ut proportionem dicantur habere. Ait igitur, illas magnitudines dici proportionem habere inter se, quarum utraque multiplicata ita augetur, ut alteram tandem superet, adeo ut si alterutra quantumvis multiplicata nunquam alteram excedat, nulla ratione proportionem habere dicantur.

DEFINITIO. VI.

In eadem ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam, cum primæ & tertiæ æque multiplicata, à secundæ & quartæ æque multiplicata, qualiscunque sit hæc multiplicatio, utrumque ab utroque vel una deficiunt, vel una æqualia sunt, vel una excedunt; si ea sumantur, quæ inter se respondent.

Explicat hoc loco Euclides, quasnam condiciones requirant, apud Geometras, magnitudines, ut eandem dicantur habere proportionem. Quod ut exequatur, cogitur confugere ad earum æquemultiplicita, ut complectatur omnes proportionēs magnitudinum;

474 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

TAB.
XVII.
fig. 3.

tam rationales, quam irrationales. Sint igitur quatuor magnitudines A , prima; B , secunda; C , tertia; $\&$ D , quarta: sumanturque prima, $\&$ tertia aequemultiplicia quaecunque; E , quidem ipsius A ; $\&$ F , ipsius C : Item sumantur secunda, $\&$ quarta alia quaecunque aequemultiplicia; G , quidem ipsius B ; $\&$ H , ipsius D , sive hac duo posteriora sint ita multiplicia secunda, $\&$ quarta, sicut priora duo multiplicia sunt prima, $\&$ tertia, sive non. Quod si jam inter se conferantur sumpta aequemultiplicia ea, que inter se respondent, ut multiplex prima, $\&$ multiplex secunda inter se, hoc est, E , $\&$ G ; Item multiplex tertia, $\&$ multiplex quarta inter se, hoc est, F , $\&$ H ; deprehensumque fuerit perpetuo, ea ita inter se habere, ut si E , multiplex prima magnitudinis A , minus fuerit, quam G , multiplex secunda magnitudinis B ; etiam F , multiplex tertia magnitudinis C , minus sit quam H , multiplex quarta magnitudinis D : Aut si E , aequale fuerit ipsi G ; etiam F , aequale sit ipsi H : Aut denique si E , majus fuerit quam G ; etiam F , majus sit quam H : (quod est utrumque ab utroque vel una deficere, vel una aequalia esse, vel una excedere) ita ut in nullo genere multiplicium contrarium possit reperiri, id est, ut nunquam E , minus sit quam G , quin $\&$ F , minus sit quam H ; $\&$ ut nunquam E , aequale sit ipsi G , quin $\&$ F , ipsi H , sit aequale. Denique ut nunquam E , majus sit quam G , quin $\&$ F , majus sit, quam H . Si inquam deprehensum fuerit, aequemultiplicia quævis accepta, perpetuo se se ita habere, ut dictum est; dicetur eadem esse proportio prima magnitudinis A , ad secundam magnitudinem B , qua est proportio tertia magnitudinis C , ad quartam magnitudinem D . Quod si deprehenderetur aliquando, etiam in solo uno genere multiplicium, multiplex

plex E, deficere à multiplici G, non autem multiplex F, deficere à multiplici H; Aut E, aequale esse ipsi G, ac F, non aequale ipsi H; Aut denique E, excedere ipsum G, ac F, non excedere ipsum H, quamvis in infinitis aliis multiplicibus conditio prædicta reperiat, nulla ratione dicentur quantitates propositæ eandem habere proportionem, sed diversas, ut ex defin. 8. fiet perspicuum.

Itaque ut demonstratione aliqua, per hanc 6. definitionem, concludantur quatuor quantitates eandem habere proportionem, ostendendum erit, (quod quidem diligenter ab Euclide & hoc 5. lib. & in aliis servatur) quacunque æque multiplicia prima, & tertia collata cum quibuscunque æque multiplicibus secunda, & quarta, habere semper conditionem prædictam defectus, æqualitatis, aut excessus; in a ut nunquam contrarium ejus inveniri possit. Similiter si quatuor quantitates concedantur eandem habere proportionem, concedatur quoque necesse est, qualibet æque multiplicia prima, & tertia collata cum quibuslibet æque multiplicibus secunda, & quarta, habere eandem defectus, æqualitatis, aut excessus conditionem.

DEFINITIO VII.

Eandem autem habentes rationem magnitudines; Proportionales vocentur.

UT si magnitudinum A, B, C, D, eadem sit proportio A, ad B, quæ C, ad D, dicentur ea magnitudines proportionales. Eadem ratione, si eadem sit proportio E, ad F, quæ F, ad G, dicentur magnitudines E, F, G, proportionales. Sicut autem quædam magnitudines proportionales continua inter quas reperitur proportionalitas continua, quales sunt magnitudines E, F, G: Quædam vero proportionales

T. A. B.
XVII.
fig. 1, 2.

tionales sunt non continue, sed discrete, cujusmodi sunt magnitudines A, B, C, D . In his enim interruptio fit proportionum; in illis vero nequaquam, ut dictum est in 4. definitione.

DEFINITIO. VIII.

Cum vero æque multiplicium multiplex primæ magnitudinis excefferit multiplicem secundæ; At multiplex tertiæ non excefferit multiplicem quartæ; tunc prima ad secundam majorem rationem habere dicitur, quam tertia ad quartam.

Declarat hic Euclides, quamnam conditionem habere debeant quatuor magnitudines, ut majorem dicatur habere proportionem prima ad secundam, quam tertia ad quartam, dicens. Si sumpta sint æque multiplicia prima & tertia; Item alia æque multiplicia secunda & quarta; deprehensumque fuerit aliquando, (licet non semper) multiplex prima majus esse multiplice secunda, multiplex autem tertia non esse majus multiplice quarta, sed vel minus, vel æquale; dicitur major esse proportio prima magnitudinis ad secundam, quam tertia ad quartam: ut perspicuum est in appposito exemplo, in quo primæ magnitudinis A , & tertia C , sumpta sunt triplicia E , & F ; secunda vero B , & quarta D , quadruplicia G , & H . Et quoniam E ; multiplex prima majus quidem est quam G , multiplex secunda; At F , multiplex tertia majus non est quam H , multiplex quarta, dicitur major esse proportio A , primæ magnitudinis, ad B , secundam; quam C , tertia, ad D , quartam.

TAB.
XVII.
fig. 4

Non est autem necesse, ut quatuor magnitudinum,
prima

prima ad secundam dicatur majorem habere proportionem quam tertia ad quartam, aequae multiplicia secundum quamvis multiplicationem sic se habere, ut multiplex quidem prima excedat multiplex secunda, at multiplex tertia non excedat multiplex quarta; sed satis est, ut secundum aliquam multiplicationem ita se habeant. Potest namque interdum fieri, ut tam multiplex prima majus sit multiplice secunda, quam multiplex tertia multiplice quarta. Item ut & multiplex prima minus sit multiplice secunda, & multiplex tertia multiplice quarta: Tamen quia hoc non contingit in omni multiplicatione, sed aliquando multiplex prima superat quidem multiplex secunda, at multiplex tertia vel minus est, vel aequale multiplici quarta: propterea majorem dicetur habere proportionem prima magnitudo ad secundam, quam tertia ad quartam, non autem eandem.

Itaque ut quatuor magnitudines dicantur proportionales, necesse est, ut aequae multiplicia earum, juxta quasvis multiplicationes accepta, vel una deficient, vel una aequalia sint, vel una excedant, ut in 6. def. fuit expositum: Ut autem majorem dicatur habere proportionem prima ad secundam, quam tertia ad quartam, satis est, ut secundum aliquam multiplicationem, multiplex prima excedat multiplex secunda, multiplex vero tertia non superet multiplex quarta quamvis juxta innumeras alias multiplicationes, aequae multiplicia prima, ac tertia una excedant aequae multiplicia secunda, & quarta.

Quod si quando è contrario multiplex prima deficiat à multiplice secunda, non autem multiplex tertia à multiplici quarta, dicetur prima magnitudo ad secundam minorem habere proportionem, quam tertia ad quartam: quamvis secundum plurimas alias multiplicationes, aequae multiplicia prima & tertia una

deficiant ab aque multiplicibus secunda, & quarta.

DEFINITIO. IX.

Proportio autem in tribus terminis paucissime consistit.

Quoniam omnis Analogia, seu proportionalitas, quam interpres, ut dictum est, proportionem nominat, similitudo est duarum; vel plurium proportionum; omnis autem proportio habet & antecedentem terminum, & consequentem, necesse est, in omni proportionalitate reperiri, ut minimum, duos terminos antecedentes, ac duos consequentes. Quare si proportionalitas fuerit non continua, requirerentur saltem quatuor termini, sive magnitudines; At vero si fuerit continua, erunt cum minimum tres termini; quoniam terminus medius bis sumitur, cum sit consequens terminus unius proportionis, & antecedens alterius: Atque hic est minimus numerus terminorum proportionalitatis. Nam in duobus terminis quibuscunque solum proportio, non autem proportionalitas reperitur.

DEFINITIO. X.

Cum autem tres magnitudines proportionales fuerint; Prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur ejus, quam habet ad secundam: At cum quatuor magnitudines proportionales fuerint; prima ad quartam triplicatam rationem habere dicitur ejus, quam habet ad secundam: Et semper deinceps, uno amplius, quam diu proportio extiterit.

TAB.
XVII.
fig. 5.

Veluti si sint magnitudines $A, B, C, D, E,$ continus proportionales, ita ut ea sit proportio $A,$

A, ad *B*, quæ *B*, ad *C*; & *C*, ad *D*: & *D*, ad *E*: proportio *A*, magnitudinis prima ad *C*, magnitudinem tertiam, dicitur duplicata ejus proportionis, quam habet *A*, magnitudo prima ad *B*, magnitudinem secundam: quoniam inter *A*, & *C*, due proportiones reponuntur, quæ æquales sunt proportioni *A*, ad *B*; nimirum proportio *A*, ad *B*, & *B*, ad *C*, ut propterea proportio *A*, ad *C*, interceptas quodammodo proportionem *A*, ad *B*, duplicatam, id est, bis ordine positam. At proportio *A*, magnitudinis prima ad *D*, magnitudinem quartam, dicitur triplicata ejus proportionis, quam habet *A*, magnitudo prima ad *B*, magnitudinem secundam: quia inter *A*, & *D*, reperiuntur tres proportionis, quæ æquales sunt proportioni *A*, ad *B*; nimirum proportio *A*, ad *B*; *B*, ad *C*; & *C*, ad *D*, atque idcirco proportio *A*, ad *D*, includit quodammodo proportionem *A*, ad *B*, triplicatam, id est, ter ordine positam: Sic quoque proportio *A*, ad *E*, dicitur quadruplicata proportionis *A*, ad *B*: propterea quod quatuor proportionis interjiciuntur inter *A*, & *E*, quæ æquales sunt proportioni *A*, ad *B*, &c.

Quod si è contrario ea sit proportio *E*, ad *D*, quæ *D*, ad *C*; & *C*, ad *B*; & *B*, ad *A*; dicitur proportio *E*, ad *C*, duplicata proportionis *E*, ad *D*; At vero proportio *E*, ad *B*, dicitur triplicata proportionis *E*, ad *D*; sic quoque proportio *E*, ad *A*, dicitur quadruplicata proportionis *E*, ad *D*, &c.

DEFINITIO. XI.

Homologæ, seu similes ratione magnitudines, dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

Definitio supra proportionalitatem, proportionum esse similitudinem. Docet jam, non solum in proportionalitate quovis proportiones dici similes; Verum etiam terminos ipsos, seu quantitates, similes dici, homologasve; dicens, antecedentes magnitudines appellari homologas, seu similes proportione inter se, nec non consequentes inter se, ut intelligeremus in quam plurimis demonstrationibus, quam latera figurarum inter se comparata, antecedentia debeant esse proportionum, & quam consequentia, ut in 6. lib. perspicuum fiet. Si igitur est proportio A , ad B , que C , ad D , dicitur quantitas A , similis quantitati C , & B , similis ipsi D . Propter similitudinem enim proportionum, necesse est, utramque magnitudinem antecedentem vel aequalem esse utrique consequenti, vel eodem modo majorem, aut minorem: Alias non haberet utraque antecedens ad utramque consequentem proportionem eandem. Exemplum habes in magnitudinibus propositis, in quibus antecedentes majores sunt eodem modo consequentibus. Aliud exemplum vides in magnitudinibus E , F , G , continue proportionalibus, ubi tam E , & F , homologa sunt, quam F , & G , ut constat. Atque hanc ob causam Euclides in defn. 6. & 8. jussit accipi aequa multiplicia prima & tertia magnitudinum, hoc est, antecedentium: Item alia aequa multiplicia secunda, & quarta magnitudinum, nimirum consequentium. Haec enim similes sunt in mag-

TAB.
XVII.
fig. 6.

LIBER QUINTUS. 181

magnitudinibus proportionalibus, ut ex hac definitione constat: in magnitudinibus vero non proportionalibus dissimiles.

DEFINITIO. XII.

Alterna ratio, est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Alterna igitur seu permutata proportio, inquit, est, cum propositis quatuor magnitudinibus proportionalibus, inferatur eandem esse proportionem antecedentis prioris proportionis ad antecedentem posterioris, quam habet consequens illius ad consequentem hujus. Ut si ponamus proportionem *A*, ad *B*, quam *C*, ad *D*, & propterea concludamus, eandem esse proportionem *A*, ad *C*, qua est *B*, ad *D*, dicemur ^{TAB. XVII.} *argumentari à permutata proportione*. Græci scriptores in hac argumentatione utuntur hoc fere modo loquendi: Ut est *A*, ad *B*, ita *C*, ad *D*; Igitur permittando, seu vicissim, erit quoque *A*, ad *C*, ut *B*, ad *D*. Firmam autem esse huiusmodi illationem, demonstrabitur propos. 16. libri hujus. Cæterum in hoc modo argumentandi, necesse est, omnes quatuor magnitudines esse ejusdem generis, ut inter binas ut ut assumptas proportio esse possit. ^{fig. 7.}

DEFINITIO. XIII.

Inversa ratio, est sumptio consequentis, ceu antecedentis, ad antecedentem, velut ad consequentem.

UT si ex eo, quod est *A*, ad *B*, ut *C*, ad *D*, inferamus, ita esse *B*, ad *A*, ut *D*, ad *C*, ^{TAB. XVII.} hoc ^{fig. 7.}

hoc est, consequentes ad antecedentes referamus; dicemur argumentari ab inversa proportionione. In hac argumentatione sic fere loquuntur auctores. Ut est A , ad B , ita C , ad D ; Igitur convertendo, vel è contrario, erit quoque B , ad A , ut D , ad C ; Quem quidem modum argumentandi certum esse, ostendetur in coroll. propos. 4. hujus lib. Porro duæ priores magnitudines possunt esse unius generis, & posteriores alterius.

D E F I N I T I O. XIV.

Compositio rationis, est sumptio antecedentis cum consequente, ceu unius, ad ipsam consequentem.

TAB. XVII. *fig. 8.* **S**it proportio AB , ad BC , qua DE , ad EF ; Si igitur ex hoc colligatur, eam quoque esse proportionem totius AC , nempe antecedentis cum consequente, ad BC , consequentem, quam habet tota DE , antecedens nimirum cum consequente, ad EF , consequentem; dicetur hujuscemodi argumentatio compositio rationis, eo quod ex antecedente, & consequente componatur aliud novum antecedens. Hunc autem modum dicendi apud Græcos scriptores reperies in hac argumentatione; Ut AB , ad BC , ita DE , ad EF , componendo ergo erit & AC , ad BC , ut DE , ad EF . Demonstrabitur hic modus argumentandi hoc lib. propos. 18.

D E F I N I T I O. XV.

Divisio rationis, est sumptio excessus, quo consequentem superat antecedens, ad ipsam consequentem.

TAB. XVII. *fig. 9.* **U**T si dicatur, quæ proportio est totius AB , ad CB , ea est totius DE , ad FE ; Igitur erit & AC ,

AC, excessus, quo antecedens consequentem superat; ad *CB*, consequentem, ut *DF*, excessus, quo consequentem excedit antecedens, ad *FE*, consequentem. In divisione autem hac rationis ita loquuntur auctores; ergo dividendo, &c. Hac porro illatio ostendetur propof. 17. hujus lib.

DEFINITIO. XVI.

Conversio rationis, est sumptio antecedentis ad excessum, quo superat antecedens ipsam consequentem.

Quod si colligamus hoc modo. Sicut est tota magnitudo *AB*, ad *CB*, ita tota *DE*, ad *FE*; TAB.
 Igitur ita etiam erit eadem *AB*, ad *AC*, excessum, XVII.
 quo consequentem superat antecedens, ut *DE*, ad fig. 9.
DF; Dicemur per conversionem rationis argumentari. Unde sic fere loquuntur scriptores. Igitur per conversionem rationis, &c. Confirmabitur autem hic argumentandi modus in coroll. propof. 19. hujus lib.

DEFINITIO. XVII.

Ex æqualitate ratio est, si plures duabus sint magnitudines, & his aliæ multitudine pares, quæ binæ sumantur, & in eadem ratione: cum ut in primis magnitudinibus prima ad ultimam, sic & in secundis magnitudinibus prima ad ultimam sese habuerit.

Vel aliter. Sumptio extremorum, per subductionem mediorum.

Sint plures magnitudines duabus *A, B, C*, & TAB.
 totidem *D, E, F*, sintque binæ ac binæ in e- XVII.
 dem proportione, hoc est, *A*, ad *B*, ut *D*, ad fig. 10.

M 4

E,

E, & B, ad C, ut E, ad F. Si igitur inferatur, propterea eam esse proportionem A, ad C, primam ad ultimam in primis magnitudinibus, quæ est D, ad F, prima magnitudinis ad ultimam in secundis magnitudinibus; dicitur huiusmodi argumentandi formula desumpta ex æquo, sive ex æqualitate, in qua scilicet extrema magnitudines, subductis mediis, colliguntur habere unam, eandemque inter se proportionem, ut in altera definitione exprimitur. Quoniam vero duobus modis ex æqualitate licet argumentari in proportionibus, uno quidem, quando sumimus binas ac binas magnitudines in eadem proportionem, ordinate procedendo, altero vero, cum ordo invertitur; explicat Euclides duabus sequentibus definitionibus, quid sit Ordinata proportio, & quid proportio Perturbata.

DEFINITIO. XVIII.

Ordinata proportio est, cum fuerit, quemadmodum antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem: fuerit etiam, ut consequens ad aliud quidpiam, ita consequens ad aliud quidpiam.

TAB. XVII. ff. 11. **U**T quando fuerit A, ad B, ut D, ad E; Rursus ut B, consequens ad aliud quidpiam, ut ad C, ita E, consequens ad F, aliud quidpiam; dicitur talis proportio, Ordinata: quia idem ordo tam in primis tribus magnitudinibus, quam in secundis servatur; cum utrobique conferatur primum prima cum secunda; deinde secunda cum tertia. Quando ergo in modo argumentandi ex æqualitate servatur Ordinata proportio, demonstratur propos. 22. hujus lib. eam argumentationem esse bonam.

DEFI-

DEFINITIO. XIX.

Perturbata autem proportio est, cum tribus positis magnitudinibus, & aliis, quæ sint his multitudine pares, ut in primis quidem magnitudinibus se habet antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem: Ut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliud quidpiam, sic in secundis magnitudinibus aliud quidpiam ad antecedentem.

SI autem sit, quemadmodum A, ad B, ita E, TAB. ad F; Deinde ut in primis magnitudinibus B, XVIII. consequens ad C, aliud quidpiam, ita in secundis magnitudinibus aliud quidpiam D, ad E, antecedentem magnitudinem, nuncupabitur hujuscemodis proportio, Perturbata: quod non servetur idem ordo in proportionibus magnitudinum; quippe cum in primis magnitudinibus conferatur prima cum secunda, at in secundis secunda cum tertia; deinde in primis secunda cum tertia, at in secundis prima cum secunda. Quando igitur in modo argumentandi ex æqualitate servatur Perturbata proportio, demonstratur eam argumentationem esse bonam, propos. 23. hujus lib.

THEOR. I. PROPOS. I. 1;

Si sint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum æqualium numero, singulæ singularum, æque multiplices; quam multiplex est unius una magnitudo, tam multiplices erunt & omnes omnium.

Sint quotcunque magnitudines AB, CD, totidem magnitudinum E, F, æque multiplices. XVIII.

M 5

Dico fig. 2;

Dico magnitudines AB, CD, simul, tam esse multiplices magnitudinum E, F, simul, quam est multiplex AB, ipsius E, vel CD, ipsius F. Cum enim AB, CD, sint æque multiplices ipsarum E, & F, si AB, dividatur in magnitudines AG, GH, HB, ipsi E, æquales, & CD, quoque in magnitudines CI, IK, KD, ipsi F, æquales; (Dividi autem poterit quælibet in partes omnino æquales, cum AB, CD, sint ipsarum E, F, æque multiplices, atque ideo toties E, in AB, perfecte contineatur, quoties F, in CD, ut ex iis, quæ in defn. 2. hujus lib. scripsimus, constat) erunt magnitudines AG, GH, HB, tot numero, quot sunt magnitudines CI, IK, KD. Quoniam vero AG, & E, æquales inter se sunt, si ipsis addantur æquales CI, & F, ærunt AG, CI, simul, æquales ipsi E, & F, simul. Eodem modo erunt GH, & IK, simul æquales ipsi E, & F, simul; Nec non HB, & KD, eisdem E, & F. Quoties igitur E, in AB, vel F, in CD, continetur, toties & E, F, simul, in AB, CD, simul comprehenduntur: Ideoque, quam multiplex est AB, ipsius E, tam sunt multiplices AB, CD, simul, ipsarum E, & F, simul, ut constat ex iis, quæ in defn. 2. lib. hujus scripsimus. Quare si sint quocunque magnitudinum, &c. Quod erat demonstrandum.

ii. THEOR. 2. PROPOS. 2.

Si prima secundæ æque fuerit multiplex, atque tertia quartæ; fuerit autem & quinta secundæ æque multiplex, atque sexta quartæ, erit & composita prima cum quinta, secundæ æque multiplex, atque tertia cum sexta, quartæ.

TAB. XVIII. **S**i magnitudo prima AB, tam multiplex secundæ C, quam est multiplex DE, tertia, quartæ

fig. 3.

TAB. XVII.




Fig. 2.





Fig. 7.




Fig. 9.




Fig. 11.



tæ F; Rursus tam fit multiplex BG, quinta ip-
 sius C, secundæ, quam multiplex est EH, sexta
 ipsius F, quartæ. Dico AB, primam cum BG,
 quinta compositam, tam multiplicem esse secun-
 dæ C, quam multiplex est, DE, tertia composi-
 ta cum sexta EH, ipsius F, quartæ. Cum enim
 AB, & DE, sint æque multiplices ipsarum C,
 F, erunt in AB, tot magnitudines ipsi C, æ-
 quales, quot sunt in DE, æquales ipsi F. Eadem
 ratione erunt & in BG, tot æquales ipsi C,
 quot sunt in EH, æquales ipsi F. Si igitur æ-
 qualibus multitudinibus AB, DE, addantur æ-
 quales multitudines BG, EH, erunt totæ multi-
 tudines AG, DH, æquales. Quare toties com-
 prehenditur C, in AG, quoties F, in DH: Ideo-
 que tam multiplex est AG, (prima composita
 cum quinta) ipsius C, secundæ, quam multiplex
 est DH, (tertia composita cum sexta) ipsius F,
 quartæ. Si prima itaque secundæ fuerit multiplex,
 &c. Quod erat ostendendum.

T H E O R. 3. P R O P O S. 3. ijj.

Si fit prima secundæ æque multiplex, at-
 que tertia quartæ, sumantur autem æque-
 multiplices primæ, & tertiæ: Erit & ex
 æquo, sumptarum utraque utriusque æque
 multiplex, altera quidem secundæ, altera
 autem quartæ.

SIt prima magnitudo A, tam multiplex secundæ **TAB.**
 B, quam multiplex est C, tertia quartæ D; **XVIII.**
 sumanturque E, F, æque multiplices primæ & **fig. 4.**
 tertiæ A, & C. Dico ex æquo tam multipli-
 cem esse E, ipsius B, secundæ, quam est F,
 ipsius D, quartæ. Nam cum E, & F, sint
 æque multiplices ipsarum A, & C; si distribu-
 tur E, & F, in magnitudines ipsis A, & C, æ-
 quales, ut in EG, GH, HI, & FK, KL, LM,
 erunt tot partes in E, æquales ipsi A, quot sunt
in

in F, æquales ipsi C. Quoniam vero EG, FK, æquales sunt ipsis A, & C; sunt autem A, & C, æque multiplices ipsarum B, & D, ex hypothesi; Erunt & EG, FK, earundem B, & D, æque multiplices. Pari ratione erunt GH, KL. Item HI, LM, æque multiplices earundem B, & D; Quoniam igitur EG, prima magnitudo, tam est multiplex secundæ B, quam est multiplex FK, tertia quartæ D; Item GH, quinta tam multiplex est ejusdem secundæ B, quam multiplex est KL, sexta ejusdem quartæ D, ^{a 2. quint.} Erit & EH, composita ex prima & quinta, tam multiplex secundæ B, quam est multiplex FL, composita ex tertia & sexta, quartæ D. Rursus cum sit EH, prima tam multiplex secundæ B, quam multiplex est FL, tertia quartæ D, ut proxime demonstratum est; sit autem & HI, quinta tam multiplex secundæ B, quam est LM, sexta multiplex quartæ D; ^{b 2. quint.} Erit & EI, composita ex prima & quinta, tam multiplex secundæ B, quam est FM, composita ex tertia ac sexta, multiplex quartæ D. Eademque est ratio, si plures fuerint partes in E, & F. Si sit ergo prima secundæ æque multiplex, atque tertia quartæ, &c. Quod ostendendum erat.

iv. THEOR. 4. PROPOS. 4.

Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, & tertia ad quartam: Etiam æque multiplices primæ & tertiæ, ad æque multiplices secundæ & quartæ; juxta quamvis multiplicationem, eandem habebunt rationem, si prout inter se respondent, ita sumptæ fuerint.

TAR. XVIII. **FIG. 5.** Sit proportio A, ad B, quæ C, ad D, sumanturque primæ A, & tertiæ C, æque multiplices E, & F; Item secundæ B, & quartæ D, æque multiplices G, & H, juxta quamvis mul-
 tipli-

multiplicationem : sive E, F, ita multiplices sint ip-
 sarum A, C, sicut G, H, ipsarum B, D, sive
 non. His positis constat ex defin. 6. hujus lib.
 si E, deficit à G, etiam F, deficere ab H; Et si
 E, æqualis est ipsi G, etiam F, æqualem esse
 ipsi H: Et denique si E, excedit G, etiam F,
 excedere H. Alioquin non esset, per defin. 6.
 eadem proportio A, ad B, quæ C, ad D, si
 earum æque multiplicia non semper ita se habe-
 rent. Dico jam, multiplicia primæ ac tertiæ non
 solum una deficere à multiplicibus secundæ ac
 quartæ, aut una æqualia esse, aut una excedere,
 ut diximus, sed eandem quoque inter se propor-
 tionem habere, nimirum ita esse E, multiplicem
 primæ A, ad G, multiplicem secundæ B, ut F,
 multiplicem tertiæ C, ad H, multiplicem quartæ
 D. Hoc est si rursus E, statuatur prima magni-
 tudo; G, secunda; F, tertia, & H, quarta;
 sumanturque ipsarum E, F, æque multiplicia
 qualiacunque; Item ipsarum G, H, quæcunque
 etiam æque multiplicia; Multiplicia ipsarum E,
 F, à multiplicibus ipsarum G, H, vel una defi-
 cere, vel una æqualia esse, vel una excedere, ut
 vult definitio 6. Idem namque est, quatuor
 magnitudines eandem habere proportionem, &
 earum æque multiplicia sumpta diximus, vel una
 deficere, vel una æqualia esse, vel una excedere.
 Capiantur enim rursus I, K, ipsarum E, F,
 æque multiplices; Item L, M, æque multiplices
 ipsarum G, H. Quoniam igitur tam multiplex
 est E, prima ipsius A, secundæ, quam F, tertia
 ipsius C, quartæ; sumptæ sunt autem & I, K,
 æque multiplices ipsarum E, F, primæ ac tertiæ;
 Erunt quoque ex æquo I, K, æque multipli-
 ces ipsarum A, C, secundæ & quartæ. Eadem
 ratione erunt L, M, ipsarum B, D, æque mul-
 tiplices. Et quia ponitur proportio A, primæ ad
 B, secundam, quæ C, tertiæ ad D, quartam,
 ostensæque sunt I, K, æque multiplices primæ
 & tertiæ A, C. Item L, M, æque multiplices
 secundæ & quartæ B, D, fit ut si I, multiplex

b 3. quins.

c 6. def.
primæ quins.

- primæ deficit ab *L*, multiplici secundæ, etiam *K*, multiplex tertiæ necessario deficiat ab *M*, multiplici quartæ: & si *I*, æqualis est ipsi *L*, etiam *K*, ipsi *M*, sit necessario æqualis: & denique si *I*, excedit ipsum *L*, etiam *K*, excedat necessario ipsum *M*: Idemque ostendetur in quibuscunque æque multiplicibus magnitudinum *E*, & *F*, nec non magnitudinum *G*, & *H*: quia semper hæc æque multiplicia, quæcunque sint, æque multiplicia quoque erunt magnitudinum *A*, *C*, & *B*, *D*. Itaque cum *I*, & *K*, sint æque multiplices primæ *E*, & tertiæ *F*; Item *L*, & *M*, æque multiplices secundæ *G*, & quartæ *H*; ostensumque sit, si *I*, multiplex primæ minor fuerit, quam *L*, multiplex secundæ, multiplicem tertiæ *K*, minorem quoque esse, quam *M*, multiplicem quartæ, &c. atque hoc contingere in quacunque multiplicatione; Erit, ut *E*, prima ad *G*, secundam, ita *F*, tertia ad *H*, quartam. Si prima igitur ad secundam eandem habuerit rationem, &c. Quod erat demonstrandum.
- d 3. *quint.*
- e 6. *def. quinti.*

C O R O L L A R I U M.

- Hinc facile demonstrabitur inversa ratio, quam Euclides defin. 13. explicavit; hoc est si quatuor magnitudines fuerint proportionales, easdem & contra, seu inversa ratione proportionales esse. Sit enim *A*, ad *B*, ut *C*, ad *D*. Dico esse convertendq, ut *B*, ad *A*, ita *D*, ad *C*. Sumptis enim *E*, *F*, æque multiplicibus ipsarum *A*, *C*, primæ ac tertiæ; Item *G*, *H*, æque multiplicibus ipsarum *B*, *D*, secundæ & quartæ: quoniam ex eo, quod *A*, prima ad *B*, secundam se habet, ut *C*, tertia ad *D*, quartam, necessario sequitur, si *E*, multiplex primæ minor fuerit quam *G*, multiplex secundæ, vel æqualis, vel major, etiam *F*, multiplicem tertiæ minorem esse, vel æqualem vel majorem, quam *H*, multiplicem quartæ; Perspicuum est, si è contrario *G*, major fuerit quam *E*, vel æqualis, vel minor, etiam *H*, majorem fore, vel æqualem, vel minorem, quam *F*, secundum quamcunque multiplicationem sint sumpta hæc æque multiplicia. Nam si utraque *E*, *F*, minor est, quam utraque *G*, *H*, erit contra utraque *G*, *H*, major quam utraque *E*, *F*, & si
 utraque
- T AB.
 XVIII.
 fig. 6.
- f 6. *def. quinti.*

utraque E, F, æqualis est utrique G, H, erit è contrario, utraque G, H, utrique E, F, quoque æqualis: Et denique si utraque E, F, major est, quam utraque G, H, erit vice versa, utraque G, H, minor, quam utraque E, F. Itaque quoniam primæ B, & tertix D, sumpta sunt, æque multiplicia G, H; Item secundæ A, & quartæ C, æque multiplicia E, F, ostensumque est, G, H, vel una excedere E, F, vel una æqualia esse vel una deficere, secundum quamcumque multiplicationem ea multiplicia sumantur; g erit ut B, prima ad A, se- g 6. def.
cundam, ita D, tertia ad C, quartam. Quod erat de- quinq.
monstrandum.

THEOR. 5. PROPOS. 5. v.

Si magnitudo magnitudinis æque fuerit multiplex, atque ablata ablatae; Etiam reliqua reliquæ ita multiplex erit, ut tota totius.

ITa multiplex sit tota AB, totius CD, ut est mul- TAB.
tiplex AE, ablata ablatae CF, sive AE, CF, XP III.
ablatae sint totis AB, CD, commensurabiles, ut in fig. 7, 8.
in 7ma figura, sive incommensurabiles, ut in 8va figura. Item sive AE, CF, compositæ sint ex eisdem partibus, ex quibus totæ AB, CD, componuntur, ut in 7ma figura, sive non ex eisdem, ut in 8va figura. Dico reliquam EB, ita esse multiplicem reliquæ FD, ut est tota AB, totius CD. Ponatur enim EB, ita multiplex cujuspiam magnitudinis, videlicet ipsius GC, ut est AE, multiplex ipsius CF, vel tota AB, totius CD. Quoniam igitur AE, EB, æque sunt multiplices ipsarum CF, GC; a erit tota AB, totius GF, a 1. quinq.
ita multiplex, ut AE, ipsius CF, hoc est omnes omnium, ut una unius: Sed tam multiplex etiam ponitur AB, ipsius CD, quam est multiplex AE, ipsius CF. Igitur AB, tam est multiplex ipsius GF, quam multiplex est ipsius CD; b atque id- b 6. prop.
circo æquales sunt GF; CD. Ablata igitur communi CF, æquales erunt GC, FD. Tam multiplex igitur erit EB, ipsius FD, quam multiplex

192 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

tiplæx est ipſius GC. Sed ita multiplex poſita fuit EB, ipſius GC, ut AE, ipſius CF, hoc eſt, ut tota AB, totius CD. Quare tam multiplex eſt reliqua EB, reliquæ FD, quam eſt tota AB, totius CD, quod eſt propoſitum.

TAB. Aliter. Sit ita multiplex tota AB, totius CD, ut ablata AE, ablata CF. Dico reliquam EB, reliquæ FD, eſſe ſic multiplicem; ut eſt tota totius. Poſita enim GA, ita multiplici ipſius FD, ut eſt AE, ipſius CF, vel ut tota AB, totius CD, quoniam AE, GA, æque multiplicæ ſunt ipſarum CF, FD; erit tota GE, ſic multiplex totius CD, ut AE, ipſius CF: Sed ita quoque multiplex eſt AB, ejuſdem CD, ut AE, ipſius CF, ex hypothefi. Æque multiplicæ ſunt igitur GE, AB, ipſius CD; *d* atque adeo inter ſe æquales. Quare, dempta communi AE, æquales erunt GA, EB, Ideoque æque multiplicæ ipſius FD; cum GA, ſit multiplex poſita ipſius FD: Atqui ita eſt multiplex poſita GA, ipſius FD, ut AB, ipſius CD. Igitur & EB, reliqua ſic erit multiplex ipſius FD, reliquæ ut AB, tota totius CD; quod eſt propoſitum. Si magnitudo itaque magnitudinis æque fuerit multiplex, &c. Quod erat demonſtrandum.

vi. THEOR. 6. PROPOS. 6.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum ſint æque multiplicæ, & detractæ quædam ſint earundem æque multiplicæ: & reliquæ eiſdem aut æquales ſunt, aut æque ipſarum multiplicæ.

TAB. **S**int magnitudines AB, CD, æque multiplicæ ipſarum E, F; & detractæ AG, CH, earundem E, F, æque multiplicæ. Dico reliquas GB, HD, aut eſſe æquales eiſdem E, F, aut certe earundem æque multiplicæ. Cum enim AB, ſit multiplex ipſius E, & ablata quoque AG,

AG, ejsdem E, multiplex; erit reliqua GB, vel æqualis ipsi E, vel ejus multiplex; alias inæqualis, vel non multiplex magnitudo addita multiplici, componeret multiplicem, quod est absurdum. Sit igitur primum GB, æqualis ipsi E. Dico etiam HD, ipsi F, esse æqualem. Ponatur enim, CI, æqualis ipsi F. Et quia prima AG, tam est multiplex secundæ E, quam CH, tertia multiplex est quartæ F; & quinta GB, æqualis est secundæ E, sicut & CI, sexta æqualis est quartæ F; erit AB, prima cum quinta, ita multiplex secundæ E, ut HI, tertia cum sexta, multiplex est quartæ F: Atqui CD, ipsius F, erat quoque tam multiplex, quam AB, multiplex est ipsius E. Æque multiplices igitur sunt HI, CD, ipsius F. Ideoque æquales inter se. Quare dempta CH, communi remanebunt CI, HD, æquales. Cum igitur CI, posita sit æqualis ipsi F, erit quoque HD, eidem F, æqualis. Quod est propositum.

Sit deinde GB, multiplex ipsius E. Dico ita quoque esse multiplicem HD, ipsius F. Posita namque CI; ita multiplici ipsius F, ut est multiplex GB, ipsius E; erit ut prius AB, ita multiplex ipsius E, ut HI, multiplex est ipsius F. Quare iterum æquales erunt HI, CD; atque adeo dempta communi CH, & reliquæ CI, HD, æquales erunt: Sed CI, est ita multiplex ipsius F, ut GB, ipsius E, multiplex est, ex hypothefi. Igitur & HD, tam multiplex erit ipsius F, quam GB, ipsius E, multiplex est, quod est propositum. Si duæ itaque magnitudines duarum magnitudinum sint æque multiplices, &c. Quod ostendendum erat.

THEOR. 7. PROPOS. 7.

Æquales ad eandem, eandem habent rationem: Et eadem ad æquales.

Sint duæ magnitudines A, B, æquales inter se, & tertia quævis C. Dico A, & B; habere
N TAB. XII. fg. 1.
N bere

bere eandem proportionem ad C. Item C, vicissim ad A, & B, eandem quoque proportionem habere. Sumantur D, E, æque multiplices ipsarum æqualium A, B; *a* eruntque D, E, æquales inter se. Capiatur rursus F, utcumque multiplex ipsius C. Quoniam igitur D, E, æquales sunt, fit ut utraque vel minor sit, quam F, vel æqualis, vel major, juxta quamcunque multiplicationem ea multiplicia sumantur. Quare cum D, E, æque multiplices primæ A, & B, tertiæ minores sunt ipsa F, multiplice secundæ & quartæ C, (est enim C, instar duarum magnitudinum, &c.) vel æquales, vel majores; *b* erit ea proportio primæ A, ad C, secundam, quæ tertiæ B, ad C, quartam.

Eodem pacto ostendemus F, vel minorem esse utraque D, E, vel utrique æqualem, vel majorem. Igitur cum F, multiplex primæ & tertiæ C, una deficiat à D, & E, æque multiplicibus secundæ A, & quartæ B, vel una æqualis sit, vel major; *c* Erit quoque ea proportio primæ C, ad secundam A, quæ tertiæ C, ad quartam B; quod est propositum. Posset brevius secunda hæc pars ostendi per coroll. 4. proposit. ex inversa ratione. Cum enim ostensum jam sit, esse A, ad C, ut B, ad C, erit convertendo C, ad A, ut C, ad B. Æquales ergo ad eandem, eandem habent rationem: Et eadem ad æquales. Quod erat demonstrandum.

S C H O L I U M.

Eodem fere modo ostendemus, æquales magnitudines ad alias inter se æquales, eandem habere rationem, si loco multiplicis F, sumantur due æque multiplices: quod Euclides, ob facilitatem omisit, utitur tamen eo nonnunquam in iis, quæ sequuntur, perinde ac si in hac proposit. 7. esset demonstratum.

TAB. XIX. Sint enim tam A, & B, inter se æquales, quam C, & D, inter se. Dico esse A, ad C, ut B, ad D. Sumptis enim E, & F, æque multiplicibus ipsarum

Fig. 2.





Fig. 20.



de cálculo vef

do

cas

n

as =

gore

li =

ufy =

Cal =

pi =

uaba



LIBER QUINTUS. 295

ipſarum A , & B , prima, & tertia. Item G , & H , æque multiplicibus ipſarum C , & D , ſecunda & quarta; derunt tam E , & F , inter ſe d. 6. prop. æquales, quam G , & H , inter ſe. Quare ſi E , multiplex prima dicitur à G , multiplice ſecunda, etiam F , multiplex tertia, ab H , multiplice quarta deficiet; & ſi æqualis, æqualis; & ſi ſuperas, ſuperabit. e Eadem ergo eſt proportio A , prima ad e. 6. def. C , ſecundam; qua B , tertia ad D , quartam. Quod quæſitum eſt propoſitum.

THEOR. 8. PROPOS. 8. viij.

Inæqualium magnitudinum major ad eandem, majorem rationem habet, quam minor: Et eadem ad minorem, majorem rationem habet, quam ad majorem.

Sint magnitudines inæquales, AB , major & $TABXIX.$
 C , minor, tertia autem quælibet D . Dico *ſg.* 3. 4.
 proportionem AB , ad D , majorem eſſe proportionem C , ad D . At è converſo, majorem eſſe proportionem D , ad C , quam D , ad AB . Intelligatur enim in AB , magnitudine majore, magnitudo AE , æqualis minori C , ut ſit reliqua EB . Utraque deinde EB , AE , æqualiter multiplicetur, hac lege, ut GF , multiplex ipſius EB , major quidem ſit, quam D ; At HG , multiplex ipſius AE , non ſit minor eadem D , ſed vel major, vel æqualis. In 3tia figura, neceſſe fuit ſumere GF , HG , triplas ipſarum EB , AE ; quia dupla ipſius AE , eſſet minor, quam D . Loco triplarum potuiſſent accipi quæcunque aliæ æque multiplices majores. In 4ta autem figura latius eſt, ſumere ipſarum EB , AE , duplas GF , HG ; quia utraque GF , HG , major eſt, quam D . Poſſent tamen pro duplis ſumi quæcunque aliæ majores æque multiplices. Quoniam igitur duæ FG , GH , æque multiplices ſunt duarum BE , EA ; erit & tota FH , ita multiplex totius AB , a 1. quæſitum.

ut GH, ipsius AE, hoc est, ipsius C, cum æquales sint positæ, C, & AE. Capiatur quoque ipsius D, multiplex IK, quæ proxime major sit, quam HG, nempe dupla, ut in 3tia figura. Quod si dupla major non fuerit quam HG, sumatur tripla, vel quadrupla, &c. In 4ta figura accepta est IK, ipsius D, quadrupla, quia tam dupla quam tripla minor est, quam HG, at quadrupla jam major est. Abscissa ergo LK, quæ æqualis sit ipsi D, non erit IL, major quam HG, (alias IK, non esset multiplex ipsius D, proxime major quam HG; sed & IL, major quoque esset quam GH. Quod si IK, dupla sit ipsius D, perspicuum est, IL, non esse majorem, quam HG, cum HG, posita sit non minor quam D, hoc est quam IL,) & idcirco HG, erit vel æqualis ipsi IL, vel major. Et quia FG, major est posita quam D; LK, vero æqualis eidem D; erit quoque FG, major quam LK. Cum ergo HG, non minor sit quam IL, ut demonstratum est, sed vel æqualis, vel major; erit tota FH, major quam IK. Itaque cum FH, HG, sint æque multiplices primæ AB, & tertiæ C; atque IK, multiplex ipsius D, quæ instar est secundæ & quartæ: sit autem FH, multiplex primæ, major quam IK, multiplex secundæ; At HG, multiplex tertiæ, non sit major, quam IK, multiplex quartæ, immo minor, ex hypothese; (sumpta enim est IK, multiplex ipsius D, major quam HG,) berit major proportio AB, primæ ad D, secundam, quam C, tertiæ ad D, quartam.

b 8. def.
quinti.

Quoniam vero è contrario IK, multiplex primæ D, (ponatur enim nunc D, prima ac tertia; At C, secunda & AB, quarta) major est quam HG, multiplex secundæ C; At IK, multiplex tertiæ D, major non est, quam FH, multiplex quartæ AB, immo minor, cum FH, major sit, quam IK, ut ostensum est; erit major proportio D, primæ ad C, secundam, quam D, tertiæ ad AB, quartam: quod est propositum. Inæqualium

c' 8. def.
quinti.

qualium igitur magnitudinum major ad eandem, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 9. PROPOS. 9. ix:

Quæ ad eandem, eandem habent rationem, æquales sunt inter se: Et ad quas eadem eandem habet rationem, eæ quoque sunt inter se æquales.

HAbeant primum A, & B, eandem rationem ad C; Dico A, & B, esse inter se æquales. *fig. 5. TAB. XIX*
 Sit enim, si fieri potest, altera, nempe A, major & B, minor. a Erit igitur major proportio A, majoris ad C, quam B, minoris ad eandem C; quod est contra hypothesin. Non ergo inæquales sunt A, & B, sed æquales. a 8. quint.

Habeat deinde C, eandem proportionem ad A, & B; Dico rursus A, & B, esse æquales. Nam si altera, nempe A, esset major, & B, minor; b haberet C, ad B, minorem, majorem proportionem, quam ad A, majorem: quod est contra hypothesin. Non igitur major erit A, quam B, sed æqualis. Quæ igitur ad eandem, eandem habent rationem, &c. Quod demonstrandum erat. b 8. quint.

THEOR. 10. PROPOS. 10. x.

Ad eandem magnitudinem rationem habentium, quæ majorem rationem habet, illa major est: Ad quam autem eadem majorem rationem habet, illa minor est.

HAbeat primum A, ad C, majorem proportionem, quam B, ad eandem C. Dico A, majorem esse, quam B: Si enim A, foret ipsi B, æqualis, a haberent A, & B, eandem proportionem ad C: Si autem A, minor esset, quam B, b haberet B, major ad C, proportionem majorem, *TAB. XIX fig. 6.* a 7. quint. b 8. quint.

198 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

jorem, quam A; minor ad eandem C, quod est contra hypothefin. Non est igitur A, æqualis vel minor quam B, sed major.

Habeat secundo C, ad B, majorem proportionem, quam ad A. Dico B, minorem esse, quam A. Non enim æqualis erit B, ipsi A; & alioqui haberet C, eandem proportionem ad A, & B; quod est contra hypothefin. Neque vero B, major erit quam A, & alius haberet C, ad minorem A, majorem proportionem quam ad B, majorem: quod magis est contra hypothefin. Minor igitur est B, quam A, quod est propositum. Ad eandem igitur magnitudinem rationem habentium, &c. Quod erat demonstrandum.

xi. THEOR. II. PROPOS. II.

Quæ eidem sunt eadem rationes,
& inter se sunt eadem.

TAB. XIX. **fig. 7-1** Sint proportiones A, ad B, & C, ad D, eadem proportioni E, ad F. Dico & proportionem A, ad B, & C, ad D, easdem esse inter se, secundum definitionem 6. hoc est sumptis æque multiplicibus ipsarum A, C; Item æque multiplicibus ipsarum B, D; temper contingere, ut multiplices ipsarum A, C, à multiplicibus ipsarum B, D, vel una deficiant, vel una æquales sint, vel una excedant. Sumantur enim ad omnes antecedentes A, C, E, æque multiplices quæcunque G, H, I, & ad omnes consequentes B, D, F, aliæ quæcunque æque multiplices K, L, M. Quoniam igitur ponitur esse A, prima ad B, secundam ut E, tertia ad F, quartam; *a 6. def. quinti.* sit ut si G, multiplex primæ deficiat à K, multiplice secundæ, deficiat quoque I, multiplex tertiæ ab M, multiplice quartæ; Et si G, æqualis est ipsi K, vel major, æqualis quoque sit I, ipsi M, vel major: *b 6. def. quinti.* Sed (ut eodem modo ostendatur) si I, minor est, quam M, vel æqualis, vel

vel major est quoque H, minor quam L, vel æqualis, vel major; propterea quod ponitur esse E, prima ad F, secundam, ut C, tertia ad D, quartam. Quare si G, multiplex primæ A, deficit à K, multiplice secundæ B, deficient quoque H, multiplex tertiæ C, ab L, multiplice quartæ D. Et si G, æqualis est, vel major quam K, etiam H, æqualis erit, vel major quam L. Idemque ostenderetur accidere in quibuscunque aliis æque multiplicibus, Quapropter erit A, prima ad B, secundam, ut C, tertia ad D, quartam. Quæ igitur eidem sunt eadem rationes, & inter se sunt eadem. Quod erat ostendendum.

T H E O R. 12. P R O P O S. 12. 17.

Si sint magnitudines quotcunque proportionales: quemadmodum se habuerit una antecedentium ad unam consequentium, ita se habebunt omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Q U O D in propos. 1. de proportione multiplici demonstravit, ostendit hic de omni genere proportionis etiam irrationalis. *TAB. IX. fig. 3.* Sint ergo quotcunque magnitudines A, B, C, D, E, F, proportionales hoc est, sit A, ad B, ut C, ad D, & E, ad F. Dico ut est una antecedentium ad unam consequentium, nimirum A, ad B, ita esse omnes antecedentes simul A, C, E, ad omnes consequentes simul B, D, F. Sumptis enim G, H, I, æque multiplicibus antecedentium; & K, L, M, æque multiplicibus consequentium, erunt omnes G, H, I, simul omnium A, C, E, simul ita multiplices, ut una unius, nempe ut G, ipsius A; & omnes K, L, M, simul omnium B, D, F, simul ita multiplices, ut una unius, nimirum ut K, ipsius B. Quoniam vero ponitur esse A, prima ad B, secundam, ut C, tertia ad D, quartam, & ut alia E, tertia ad aliam

206 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

b 6. def. quinti. aliam F, quartam; *b* fit ut si G, multiplex primæ deficiat à K, multiplice secundæ, deficiat quoque H, multiplex tertiæ ab L, multiplice quartæ, & I, ab M: Et si G, æqualis est ipsi K, vel major, æqualis quoque sit H, ipsi L, & I, ipsi M, vel major. Ac proinde si G, minor est, vel æqualis, vel major quam K, & omnes G, H, I, simul omnibus K, L, M, simul minores sint, vel æquales vel majores. *c* Quocirca ut est A, prima ad B, secundam ita erit A, C, E, tertia ad B, D, F, quartam. Si sint itaque magnitudines quotcunque proportionales, &c. Quod demonstrandum erat.

liij. THEOR. 13. PROPOS. 13.

Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam majorem rationem habuerit, quam quinta ad sextam: Prima quoque ad secundam majorem rationem habebit, quam quinta ad sextam.

TAB. XIX. AL. 9. **S**It prima A, ad B, secundam, ut C, tertia ad D, quartam: sit autem proportio C, tertiæ ad D, quartam major, quam E, quintæ ad F, sextam. Dico & proportionem A, primæ ad B, secundam esse majorem quam E, quintæ ad F, sextam, secundum definitionem 8. hoc est, sumptis æque multiplicibus ipsarum A, E; Item æque multiplicibus ipsarum B, F, contingere posse, ut multiplex ipsius A, excedat multiplicem ipsius B, at multiplex ipsius E, multiplicem ipsius F, non excedat. Sumptis enim G, H, I, æque multiplicibus antecedentium; Et K, L, M, æque multiplicibus consequentium, cum sit A, prima ad B, secundam, ut C, tertia ad D, quartam; *a* fit ut si G, multiplex primæ excederit K, multiplicem secundæ, excedat quoque H, multiplex tertiæ ipsam L, multiplicem quartæ, &c.

&c. At quando H, excedit ipsam L, non necesse est I, excedit ipsam M, sed æqualis aliquando erit, vel minor; quod major ponatur proportio C, primæ ad D, secundam, quam E, tertiæ F, quartam. Igitur si G, excedit K, non necesse est I, excedit M. Major est ergo proportio A, primæ ad B, secundam, quam E, tertiæ ad F, quartam. Quamobrem si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam, &c. Quod ostendendum erat.

T H E O R . 14 . P R O P O S . 14 . xiv.

Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam; Prima vero quam tertia major fuerit, erit & secunda major quam quarta. Quod si prima fuerit æqualis tertiæ; erit & secunda æqualis quarta. Si vero minor, & minor erit.

Sit enim A, prima ad B, secundam ut C, tertia ad D, quartam. Dico si A, major fuerit quam C, fore quoque B, majorem quam D. Quod si A, æqualis fuerit ipsi C, æqualem quoque esse B, ipsi D: Si denique A, minor fuerit quam C, minorem quoque esse B, ipsa D. Sit primum A, major quam C, & eritque proportio A, majoris ad B, major quam C, minoris ad eandem B. Quoniam igitur est C, prima ad D, secundam ut A, tertia ad B, quartam, proportio autem A, tertiæ ad B, quartam major est, ut ostendimus, quam C, quintæ ad B, sextam: Major quoque erit proportio C, primæ ad D, secundam, quam C, quintæ ad B, sextam. Minor est ergo D, quam B; Ideoque B, major erit quam D. Quod est propositum.

Sit deinde A, æqualis ipsi C; & eritque proportio A, ad B, ut C, ad B. Quoniam igitur proportionem C, ad D, & C, ad B, eadem sunt proportioni A, ad B, & erunt quoque inter se eadem







- f9. quint.* proportiones C, ad D, & C, ad B; Ideoque æquales erunt B, & D. Quod est propositum.
- fig. 12.* Sit tertio A, minor quam C, & eritque ob
g8. quint. hoc major proportio C, majoris ad B, quam A, minoris ad B, eandem. Quoniam igitur est C, prima ad D, secundam, ut A, tertia ad B, quartam; est autem proportio A, tertia ad B, quartam minor, quam C, quinta ad B, sextam:
- b3. quint.* Minor quoque erit proportio C, primæ ad D, secundam, quam C, quinta ad B, sextam;
- i10. quint.* Ideoque B, minor erit, quam D, quod est propositum. Si prima igitur ad secundam eandem habuerit rationem, &c. Quod erat demonstrandum.

xv. THEOR. 15. PROPOS. 15.

Partes cum pariter multiplicibus in eadem sunt ratione, si prout sibi mutuo respondent, ita sumantur.

- TAB. XX.* Sint partium A, & B, æque multiples CD,
fig. 1. & EF. Dico ita esse CD, ad EF, ut A, ad B. Cum enim CD, & EF, sint æque multiples ipsarum A, & B, continebitur A, toties in CD, quoties B, in EF. Dividatur ergo CD, in partes CG, GH, HD, æquales ipsi A, & EF, in partes EI, IK, KF, æquales ipsi B, & A, æquales inter se sint, nec non EI, & B. Eadem ratione erit GH, ad IK, & HD, ad EI, IK, KF, eandem habebunt proportionem.
- a7. quint.* eritque CG, ad EI, ut A, ad B, quod CG, & A, æquales inter se sint, nec non EI, & B. Eadem ratione erit GH, ad IK, & HD, ad EI, IK, KF, eandem habebunt proportionem.
- b11. quint.* Quocirca ut CG, ad EI, hoc est, ut A, ad B, ita erit CD, ad EF, nempe omnes CG, GH, HD, simul ad omnes EI, IK, KF, simul, quod est propositum. Partes itaque cum pariter multiplicibus, &c. Quod erat demonstrandum.
- c12. quint.*

THEOR.





THEOR. 16. PROPOS. 16. xvi.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, & vicissim proportionales erunt.

Hic demonstratur alterna, sive permutata proportio, seu ratio, quæ defin. 12. explicata est. Sit enim A, ad B, ut C, ad D. Dico vicissim, seu permutando, esse quoque A, ad C, ut B, ad D. Sumantur enim ipsarum A, B, primæ ac secundæ, æque multiples E, F. Item ipsarum C, D, tertiæ & quartæ æque multiples G, H; a eritque E, ad F, ut A, ad B, cum E, & F, sint pariter multiples partium A, & B. Eadem ratione erit G, ad H, ut C, ad D. Cum igitur proportioncs E, ad F, & C, ad D, sint eædem proportioui A, ad B; erunt & ipsæ inter se eædem. Rursus quia proportioncs E, ad F, & G, ad H, eædem sunt proportioui C, ad D; erunt & ipsæ eædem inter se; hoc est, ut est E, prima ad F, secundam, ita erit G, tertia ad H, quartam. Quare si E, prima major est quam G, tertia, vel æqualis, vel minor, erit quoque F, secunda major quam H, quarta, vel æqualis, vel minor, in quacunque multiplicatione accepta sint æque multiplicia E, F, & æque multiplicia G, H. Est igitur A, prima ad C, secundam, ut B, tertia ad D, quartam (cum E, & F, sint æque multiples primæ A, ac tertiæ B; At G, & H, æque multiples C, secundæ & D, quartæ, & illæ ab his una deficient, vel una æquales sint, vel una excedant, &c.) quod est propositum. Si quatuor igitur magnitudines proportionales fuerint, & vicissim proportionales erunt. Quod ostendendum erat.

TAB. XX.

fig. 2.

a 15. quint.

b 11. quint.

c 11. quint.

d 14. quint.

e 6. def.

quinti.

THEOR.

xvij.

THEOR. 17. PROPOS. 17.

Si compositæ magnitudines proportionales fuerint, hæ quoque divisæ proportionales erunt.

TAB XX.
fig. 3.

HOc loco demonstrat Euclides Divisionem rationis, quam defin. 15. explicavit. Sint enim compositæ magnitudines AB, CB, & DE, EF, proportionales, hoc est, sit AB, ad CB, ut DE, ad EF. Dico & divisas easdem proportionales esse; hoc est, ut est AC, ad CB, ita esse DF, ad FE, in eo sensu, quem definitione 6. exposuimus. Ipsarum enim AC, CB, DF, FE, æque multiples capiantur eodem ordine GH, HI, KL, LM; æritque GI, ita multiplex ipsius AB, ut est GH, ipsius AC, hoc est, ut KL, ipsius DF, & ita quoque multiplex est KM, ipsius DE. Æque multiples ergo sunt GI, KM, ipsarum AB, DE. Capiantur rursus IN, MO, æque multiples ipsarum CB, FE. Quoniam igitur sic est multiplex IH, prima secundæ CB, ut LM, tertia quartæ FE: Itam tam est multiplex IN, quinta secundæ CB, quam multiplex est MO, sexta quartæ FE; ærit & HN, sic multiplex secundæ CB, ut LO, multiplex est quartæ FE. Itaque cum sit AB, prima ad CB, secundam, ut DE, tertia ad FE, quartam; sumptæque fiat æque multiples GI, KM, primæ ac tertiæ AB, DE: Item secundæ & quartæ CB, FE, æque multiples HN, LO, ærit ut si GI, multiplex primæ AB, deficit ab HN, multiplice secundæ CB, etiam KM, multiplex tertiæ DE, deficiat ab LO, multiplice quartæ FE; & si æqualis, æqualis; & si excedit, excedat. Quod si deficiat tam GI, ab HN, quam KM, ab LO, ablati communibus HI, LM, deficiet quoque GH, ab IN, & KL, ab MO. Et si GI, æqualis fuerit ipsi HN, & KM, ipsi LO, ablati com-

communibus HI, LM, erit & GH, æqualis ipsi IN, & KL, ipsi MO. Et si denique GI, excesserit ipsam HN, & KM, ipsam LO, ablatis communibus HI, LM, excedet quoque GH, ipsam IN, & KL, ipsam MO. Quam ob rem cum GH, KL, sumptæ sint æque multiples primæ AC, & tertiæ DF: Item IN, MO, æque multiples secundæ CB, & quartæ FE, ostensumque sit, (in quacunque multiplicatione illæ æque multiples fuerint acceptæ) æque multiples primæ & tertiæ ab æque multiplicibus secundæ & quartæ vel una deficere, vel una æquales esse, vel una excedere; *e* Erit AC, prima ad CB, secundam, ut DF, tertia ad FE, quartam, quod est propositum. Si compositæ igitur magnitudines proportionales fuerint, &c. Quod ostendendum erat.

e 6. def. quint.

THEOR. 18. PROPOS. 18.

xviii.

Si divisæ magnitudines sint proportionales, hæ quoque compositæ proportionales erunt.

DEmonstrat hoc loco Euclides compositionem rationis, quam definitione 14. descripsit. Sint enim divisæ magnitudines AB, BC, & DE, EF, proportionales, hoc est, AB, ad BC, ut DE, ad EF. Dico & compositas proportionales esse, hoc est, ut est AC, ad BC, ita esse DF, ad EF. Si enim non est, ut AC, ad BC, ita DF, ad EF, habeat DF, ad aliquam magnitudinem minorem ipsa EF, vel majorem, eandem proportionem, quam AC, ad BC. Habeat primum DF, ad GF, minorem ipsa EF, si fieri potest, eandem proportionem, quam AC, ad BC. Quoniam igitur est, ut AC, ad BC, ita DF, ad GF; *a* Erit dividendo quoque, ut AB, ad BC, ita DG, ad GF: Sed ut AB, ad BC, ita proposita quoque est DE, ad EF. *b* Igitur erit etiam, ut DG, prima ad GF, secundam, ita DE, tertia

TAB. XX. fig. 4.

a 17. quint.

b 11. quint.

ad

206 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ad EF, quartam. Cum ergo DG, prima major sit, quam DE, tertia, e erit quoque GF, secunda major quam EF; quarta, pars quam totum. Quod est absurdum.

Habeat deinde, si fieri potest, DF, ad HF, majorem ipsa EF, eandem proportionem, quam AC, ad BC. Quoniam igitur est, ut AC, ad BC, ita DF, ad HF; d erit dividendo quoque ut AB, ad BC, ita DH, ad HF. Sed ut AB, ad BC, ita posita etiam est DE, ad EF. e Igitur erit quoque, ut DH, prima ad HF, secundam, ita DE, tertia ad EF, quartam. Cum ergo DH, prima minor sit quam DE, tertia, eritque HF, secunda minor quam EF, quarta, totum quam pars, quod est absurdum. Non igitur habebit DF, ad minorem ipsa EF, aut ad majorem, eandem proportionem, quam AC, habet ad BC. Ergo DF, ad ipsam EF, crit, ut AC, ad BC, quod est propositum. Itaque si divisæ magnitudines sint proportionales, &c. Quod demonstrandum erat.

xix. THEOR. 19. PROPOS. 19.

Si quemadmodum totum ad totum, ita ablatum se habuerit ad ablatum: & reliquum, ad reliquum, ut totum ad totam, se habebit.

TAB. XX. **Q**Uod in propof. 5. demonstratum est de multiplici proportione, hoc loco de omni proportione, etiam irrationali demonstratur. Sit enim tota AB, ad totam CD, ut ablata AE, ad ablatam CF. Dico & reliquam EB, esse ad reliquam FD, ut est tota AB, ad totam CD. Cum enim sit AB, ad CD, ut AE, ad CF, e erit & permutando AB, ad AE, ut CD, ad CF. b Dividendo ergo erit EB, ad AE, ut FD, ad CF, c Quare permutando rursus erit EB, ad FD, ut AE, ad CF. hoc est, ut tota AB, ad totam CD, cum posita sit AB, ad CD, ut AE, ad CF. Si

LIBER QUINTUS. 209

Si igitur quemadmodum totum ad totum, &c.
Quod demonstrandum erat.

C O R O L L A R I U M.

Hinc facile demonstrabitur modus ille argumentandi in
proportionibus, qui sumitur à conversione rationis, juxta
16. defin.

Sit enim, ut AB, ad CB, ita DE, ad FE. Dico *TAB. XX. fig. 6.*
per conversionem rationis esse quoque, ut AB, ad AC, *fig. 6.*
ita DE, ad DF. Cum enim sit, ut AB, ad CB, ita
DE, ad FE, *a* erit quoque dividendo, ut AC, ad CB, *a 7. quinti*
ita DF, ad FE. Igitur & convertendo, ut CB, ad
AC, ita FE, ad DF, *b* ac propterea componendo quo- *c 18. quinti*
que, ut AB, ad AC, ita DE, ad DF. Quod est pro-
positum.

T H E O R. 20. P R O P O S. 20. XL

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis
æquales numero; quæ binæ & in eadem
ratione sumantur; ex æquo autem prima,
quam tertia major fuerit, erit & quarta
quam sexta, major. Quod si prima tertiæ
fuerit æqualis, erit & quarta æqualis sextæ:
sin illa minor, hæc quoque minor erit.

Sint tres magnitudines A, B, C, & totidem *TAB. XX. fig. 7.*
D, E, F, sitque A, ad B, ut D, ad E; &
B, ad C, ut E, ad F, sit autem primum A,
prima major quam C, tertia. Dico & D, quar-
tam esse majorem F, sexta. Cum enim A, ma-
jor sit quam C, *a* erit major proportio A, ad *a 8. quinti*
B, quam C, ad B. Est autem ut A, ad B, ita
D, ad E. *b* Major igitur proportio quoque *b 13. quinti*
erit D, ad E, quam C, ad B. At ut C, ad
B, ita est F, ad E. (Cum enim sit B, ad C,
ut E, ad F, erit convertendo ut C, ad B, ita
F,

208 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

F, ad E.) Major igitur quoque proportio erit
 c10. *quint.* D, ad E, quam F, ad E, & quare D, major
 erit, quam F. Quod est propositum.

TAB. XX. Sit deinde A, æqualis ipsi C. Dico & D, æ-
 fig. 8 qualem esse ipsi F. Cum enim A, sit ipsi C,
 d 7. *quint.* æqualis d erit A, ad B, ut C, ad B. Est autem
 e 11. *quint.* ut A, ad B, ita D, ad E. Igitur erit & D,
 ad E, ut C, ad B: At ut C, ad B, ita est F,
 ad E, per inversam rationem, uti prius. Quare
 f 9. *quint.* erit quoque D, ad E, ut F, ad E: Ideoque
 æquales erunt D, & F. Quod est propositum.

TAB. XX. Sit tertio A, minor quam C. Dico & D, mi-
 fig. 9 norem esse, quam F. Cum enim A, minor sit
 g 8. *quint.* quam C, g erit minor proportio A, ad B, quam
 C, ad B. Sed ut A, ad B, ita est D, ad E.
 h 13. *quint.* Minor ergo quoque proportio est D, ad E,
 quam C, ad B. Est autem convertendo, ut
 prius, ut C, ad B, ita F, ad E. Igitur minor
 est quoque proportio D, ad E, quam F, ad E,
 i 10. *quint.* proptereaque D, minor erit quam F. Quod est
 propositum. Si sint itaque tres magnitudines,
 & aliæ ipsis æquales numero, &c. Quod erat
 ostendendum.

xxi. THEOR. 21. PROPOS. 21.

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis
 æquales numero, quæ binæ, & in eadem
 ratione sumantur, fueritque perturbata ea-
 rum proportio; ex æquo autem prima quam
 tertiæ major fuerit: erit & quarta, quam
 sextæ major. Quod si prima tertiæ fuerit
 æqualis, erit & quarta æqualis sextæ; sin
 illa minor; hæc quoque minor erit.

TAB. XX. Sint tres magnitudines A, B, C, & totidem
 fig. 10. D, E, F, quæ binæ, & in eadem ratione suman-
 tur; sitque earum proportio perturbata, hoc est,
 sit ut A, ad B, ita E, ad F, & ut B, ad C,
 ita D, ad E: Sit autem primum A, primo ma-
 jor quam C, tertiæ. Dico & D, quartam esse
 majo-

maorem sexta, F. Cum enim A, major sit quam C, erit major proportio A, ad B, quam a 8. *quint.* C, ad B: Est autem ut A, ad B, ita E, ad F. Major ergo quoque proportio est E, ad F, b13. *quint.* quam C, ad B. Quoniam vero ut B, ad C, ita est D, ad E, erit convertendo ut C, ad B, ita E, ad D. Quare major quoque erit proportio E, ad F, quam E, ad D. Ideoque major erit c10. *quint.* D, quam F. Quod est propositum.

Sit deinde A, ipsi C, æqualis. Dico D, quo- TAB. XX. que ipsi F, esse æqualem. Cum enim A, sit fig. 11. æqualis ipsi C, erit A, ad B, ut C, ad B: Sed d7. *quint.* ut A, ad B, ita est E, ad F. Igitur erit ut C, e11. *quint.* ad B, ita E, ad F: Est autem ex inversa ratione, ut C, ad B, ita E, ad D, veluti prius. Igitur erit quoque ut E, ad F, ita E, ad D; fatque idcirco D, ipsi F, æqualis erit. Quod est f9. *quint.* propositum.

Sit tertio A, minor, quam C. Dico & D, TAB. XX. minorem esse quam F. Cum enim A, sit minor fig. 12. quam C, erit minor proportio A, ad B, quam e8. *quint.* C, ad B: Ut autem A, ad B, ita est E, ad F. Minor est ergo proportio E, ad F, quam C, h13. *quint.* ad B. Quoniam vero, ut ante, ex inversa ratione, est ut C, ad B, ita E, ad D; erit quoque minor proportio E, ad F, quam E, ad D; ita propterea D, minor erit quam F, quod est i10. *quint.* propositum. Si igitur sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, &c. Quod ostendendum erat.

T H E O R. 22. P R O P O S. 22. xxij:

Si sint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ in eadem ratione sumantur: Et ex æqualitate in eadem ratione erunt.

JAm hic demonstrat Euclides modum argumen- tandi in proportionibus ex æqualitate, quando
 O pro-

TABXXI
fig. 1.

proportio. est ordinata. Sint enim primum tres magnitudines A, B, C, & aliæ tres D, E, F: sitque A, ad B, ut D, ad E; & B, ad C, ut E, ad F. Dico quoque ex æqualitate esse A, ad C, ut D, ad F. Sumptis enim ipsarum A, D, æque multiplicibus G, H: Item ipsarum B, E, æque multiplicibus I, K: Item ipsarum C, F, æque multiplicibus L, M; cum sit A, prima ad B, secundam, ut D, tertia ad E, quartam, erit quoque G, multiplex primæ A, ad I, multiplicem secundæ B, ut H, multiplex tertiæ D, ad K, multiplicem quartæ E. Eadem ratione, cum sit B, prima ad C, secundam, ut E, tertia ad F, quartam; erit I, multiplex primæ B, ad L, multiplicem secundæ C, ut K, multiplex tertiæ E, ad M, multiplicem quartæ F. Quoniam igitur sunt tres magnitudines G, I, L, & aliæ tres H, K, M, quæ binæ in eadem proportione sumuntur; erit ut si G, prima superat tertiam L, superet necessario quoque H, quarta sextam M; Et si æqualis, æqualis; Et si deficit, deficiat. Itaque cum G, H, æque multiplices primæ A, & tertiæ D, vel deficiant una ab L, M, æque multiplicibus secundæ C, & quartæ F, vel una æquales sint, vel una excedant: in quacunque multiplicatione sumpta sint ea multiplicia: scilicet A, prima ad C, secundam, ut D, tertia ad F, quartam. Quod est propositum.

ad 6. def.
quinti.

Deinde sint plures magnitudines tribus, ita ut sit etiam C, ad N, ut F, ad O. Dico adhuc esse ut A, ad N, ita D, ad O. Cum enim jam sit ostensum in tribus magnitudinibus, esse A, ad C, ut D, ad F: ponatur autem C, ad N, ut F, ad O; erunt tres magnitudines A, C, N, & aliæ tres D, F, O, quæ binæ in eadem ratione sumuntur. Ergo ex æqualitate in tribus magnitudinibus ostensa, rursus erit, ut A, ad N, ita D, ad O. Eodemque modo idem ostendetur in quinque magnitudinibus, per quatuor; sicut id in quatuor demonstratum fuit per tres; Et sic de pluri-

2.




Fig. 5.




Fig. 10.





Fig. 12.





L I B E R Q U I N T U S. 212

pluribus. Itaque si sint quotcunque magnitudines, &c. Quod erat ostendendum.

T H E O R. 23. P R O P O S. 23. xxij:

Si sint tres magnitudines, aliæque ipsis æquales numero, quæ binæ in eadem ratione sumantur, fuerit autem perturbata earum proportio: Etiam ex æqualitate in eadem ratione erunt.

DEmonstratur hic ratio ex æqualitate, quando proportio est perturbata. Sint enim tres magnitudines A, B, C, & aliæ tres D, E, F, sitque perturbata earum proportio, hoc est, sit ut TAB. XXI
fig. 2:
A, ad B, ita E, ad F; & ut B, ad C, ita D, ad E. Dico quoque ex æqualitate esse ut A, ad C, ita D, ad F. Sumptis enim ipsarum A, B, D, æque multiplicibus G, H, I; Item ipsarum C, E, F, æque multiplicibus K, L, M. a 15. quint.
Erit ut A, ad B, ita G, ad H, cum G, H, sint ipsarum A, B, æque multiples: At ut A, ad B, ita est E, ad F; b 11. quint.
Igitur ut G, ad H, ita quoque est E, ad F; c 15. quint.
Sed ut E, ad F, ita est quoque L, ad M, quod L, M, sint ipsarum E, F, æque multiples. d 11. quint.
Igitur erit quoque ut G, ad H, ita L, ad M. Rursus quoniam est B, prima ad C, secundam, ut D, tertia ad E, quartam; e 4. quint.
erit quoque ut H, multiplex primæ B, ad K, multiplicem secundæ C, ita I, multiplex tertiæ D, ad L, multiplicem quartæ E. Quia igitur sunt tres magnitudines G, H, K, & aliæ tres I, L, M, quæ binæ in eadem ratione sumantur, estque earum proportio perturbata; cum ostensum sit esse ut G, ad H, ita L, ad M: Et ut H, ad K, ita I, ad L; f 11. quint.
fit ut si G, prima superat tertiã K, superet quoque quarta I, sextam M; & si æqualis, æqualis, & si deficit deficient. Itaque cum G, & I, æque multiples primæ A, & tertiæ D, à K, & M, æque

multiplicibus secundæ C, & quartæ F, vel una deficient, vel una æquales sint, vel una excedant; g erit ut A, prima ad C, secundam, ita D, tertiã ad F, quartam, quod est propositum. Itaque si sint tres magnitudines, &c. Quod demonstrandum erat.

xxiv. THEOR. 24. PROPOS. 24.

Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam; habuerit autem & quinta ad secundam eandem rationem, quam sexta ad quartam: Etiam composita prima cum quinta, ad secundam eandem habebit rationem, quam tertia cum sexta, ad quartam.

QUOD propositione 2. demonstravit Euclides de sola proportione multiplici, demonstrat hoc loco de omni proportione, etiam irrationali. Sit
TAB. XXI. enim AB, prima ad C, secundam, ut DE, tertia ad F, quartam; Item BG, quinta ad C, secundam, ut EH, sexta ad F, quartam. Dico ita esse AG, compositam ex prima ac quinta, ad secundam C, ut est DH, composita ex tertia & sexta, ad quartam F. Cum enim sit ut BG, ad C, ita EH, ad F, erit convertendo ut C, ad BG, ita F, ad EH. Quoniam igitur est AB, ad C, ut DE, ad F, & C, ad BG, ut F, ad EH, a erit ex æqualitate AB, ad BG, ut DE, ad EH. b Componendo igitur erit ut tota AG, ad BG, ita tota DH, ad EH. Itaque cum rursus sit AG, ad BG, ut DH, ad EH, & BG, ad C, ut EH, ad F: c erit ex æqualitate AG, ad C, ut DH, ad F. Quod est propositum. Si prima igitur ad secundam eandem habuerit rationem, &c. Quod erat demonstrandum.

a12. quint.
 b18. quint.
 c12. quint.

THEOR.

THEOR. 25. PROPOS. 25. xxv.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint : maxima & minima reliquis duabus majores erunt.

It enim AB, ad CD, ut E, ad F, sitque AB, TABXXI
omnium maxima, & F, minima. Dico duas fig. 4.
AB, & F, simul esse majores duabus CD, & E, simul. Auferatur enim ex AB, magnitudo AG, æqualis ipsi E; & ex CD, alia CH, æqualis ipsi F. Erit igitur AG, ad CH, ut E, ad F, hoc est, ut AB, ad CD. Quare cum sit tota AB, ad totam CD, ut ablata AG, ad ablatam CH: erit quoque ut tota AB, ad totam CD, ita reliqua GB, ad reliquam HD: Est autem AB, (cum sit omnium maxima) major, quam CD. Igitur & GB, major erit quam HD. Quoniam vero AG, & E, æquales sunt; si ipsis addantur æquales F, & CH, nimirum F, ipsi AG, & CH, ipsi E, fient AG, & F, simul æquales ipsis E, & CH, simul. Additis igitur inæqualibus GB, & HD, fient AB, & F, simul majores quam E, & CD, simul, cum GB, sit major quam HD. Quod est propositum. Si ergo quatuor magnitudines proportionales fuerint, &c. Quod erat demonstrandum.

S C H O L I U M.

Hic finem Euclides imponit quinto libro. Verum quia Campanus, & nonnulli alii adjiciunt alias quasdam propositiones, quibus sæpenumero gravissimi Scriptores, ut Archimedes, Apollonius, Joannes Regiomontanus, & alii utuntur, easque quasi essent Euclidis, citant; placuit eas huic quinto libro annexere, & maxima, qua fieri potest, brevitate demonstrare, nec non in numerum, ac seriem propositionum

214 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

tionum Euclidis referre. Omnes autem traduntur de magnitudinibus impropotionalibus, quarum prima hæc est.

xxvi. [THEOR. 26. PROPOS. 26.]

Si prima ad secundam habuerit majorem proportionem, quam tertia ad quartam: habebit convertendo secunda ad primam minorem proportionem, quam quarta ad tertiam.

TABXXI. *fig. 5.* **H**abeat enim A, ad B, majorem proportionem, quam C, ad D. Dico proportionem B, ad A, minorem esse proportione D, ad C. Intelligatur enim esse E, ad B, ut C, ad D; eritque proportio A, ad B, major quoque quam E, ad B, *a* ac propterea A, major erit quam E. *b* Quare minor erit proportio B, ad A, majorem, quam B, ad E, minorem: Sed ut est B, ad E, ita est convertendo D, ad C. Igitur proportio B, ad A, minor est quoque, quam D, ad C. Quod est propositum.]

xxvij. [THEOR. 27. PROPOS. 27.]

Si prima ad secundam habuerit majorem proportionem, quam tertia ad quartam: Habebit quoque vicissim prima ad tertiam majorem proportionem; quam secunda ad quartam.

TABXXI. *fig. 5.* **H**abeat enim A, ad B, majorem proportionem, quam C, ad D. Dico permutando majorem esse quoque proportionem A, ad C, quam B, ad D. Intelligatur namque esse E, ad B, ut C, ad D, eritque proportio A, ad B, major etiam quam E, ad B: *a* Ideoque A, major erit quam E. *b* Quare major erit proportio A, ad C, quam B, ad D. Quod est propositum.]

A, ad C, quam E, ad C. Quoniam vero permutando est, ut E, ad C, ita B, ad D, (cum posita sit E, ad B, ut C, ad D.) Igitur proportio A, ad C, major quoque erit quam B, ad D. Quod est propositum.] c16. *quint.*

[THEOR. 28. PROPOS. 28. xxvlij.

Si prima ad secundam habuerit majorem proportionem, quam tertia ad quartam: Habebit quoque composita prima cum secunda, ad secundam majorem proportionem, quam composita tertia cum quarta, ad quartam.

Si major proportio AB, ad BC, quam DE, ad EF. Dico & componendo majorem esse proportionem AC, ad BC, quam DF, ad EF. Intelligatur enim esse GB, ad BC, ut DE, ad EF; eritque proportio AB, ad BC, major quoque, quam GB, ad BC; Ideoque AB, major quam GB. Addita ergo communi BC, fiet AC, major quam GC; majorque propterea erit proportio AC, ad BC, quam GC, ad BC. Sed componendo, ut est GC, ad BC, ita est DF, ad EF, (quod posita sit GB, ad BC, ut DE, ad EF.) Major ergo etiam erit proportio AC, ad BC, quam DF, ad EF. Quod est propositum.] TABXXI. *fig. 6.*
a10. *quint.*
b8. *quint.*
c18. *quint.*

[THEOR. 29. PROPOS. 29. xxix.

Si composita prima cum secunda ad secundam majorem habuerit proportionem, quam composita tertia cum quarta ad quartam: Habebit quoque dividendo prima ad secundam majorem proportionem, quam tertia ad quartam.

Si major proportio AC, ad BC, quam DF, ad EF. Dico & dividendo majorem esse proportionem AC, ad BC, quam DF, ad EF. TABXXI. *fig. 6.*
por-

portionem AB, ad BC, quam DE, ad EF. Intelligatur enim esse GC, ad BC, ut DF, ad EF, eritque proportio AC, ad BC, major quoque
 a 10. *quint.* proportionē GC, ad BC: a ideoque major erit AC, quam GC. Ablata ergo communi BC;
 b 8. *quint.* major erit AB, quam GB: b Ac propterea major erit proportio AB, ad BC, quam GB, ad BC.
 c 17. *quint.* c Sed dividendo, ut est GB, ad BC, ita est DE, ad EF. (Posita namque est GC, ad BC, ut DF, ad EF.) Igitur major quoque erit proportio AB, ad BC, quam DE, ad EF. Quod est propositum.]

xxx: [THEOR. 30. PROPOS. 30.

Si composita prima cum secunda, ad secundam habuerit majorem proportionem, quam composita tertia cum quarta, ad quartam: Habebit per conversionem rationis, prima cum secunda ad primam, minorem proportionem, quam tertia cum quarta, ad tertiam.

TAB. XXI. *fig. 7.* **S**It major proportio AC, ad BC, quam DF, ad EF. Dico per conversionem rationis, minorem esse proportionem AC, ad AB, quam DF, ad DE. Cum enim sit AC, ad BC, major proportio, quam DF, ad EF; a erit & dividendo, major proportio AB, ad BC, quam DE, b 16. *quint.* ad EF. b Quare convertendo, minor erit proportio BC, ad AB, quam EF, ad DE; c Ac propterea & componendo, minor erit proportio totius AC, ad AB, quam totius DF, ad DE. Quod est propositum.]
 c 28. *quint.*

THEOR.

[THEOR. 31. PROPOS. 31. xxxi.]

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, sitque major proportio primæ primorum ad secundam, quam primæ posteriorum ad secundam; Item secundæ priorum ad tertiam major, quam secundæ posteriorum ad tertiam: Erit quoque ex æqualitate major proportio primæ priorum ad tertiam, quam primæ posteriorum ad tertiam.

Sint tres magnitudines A, B, C, & aliæ tres D, E, F, sitque major proportio A, ad B, quam D, ad E: Item major B, ad C, quam E, ad F. Dico ex æqualitate majorem quoque esse A, ad C, quam D, ad F. Intelligatur enim esse G, ad C, ut E, ad F, erisque propterea proportio B, ad C, major, quam G, ad C; Ideoque B, major erit quam G. Quare major erit proportio A, ad G, minorem quam A, ad B, majorem: Ponitur autem proportio A, ad B, major quam D, ad E. Multo ergo major erit proportio A, ad G, quam D, ad E. Intelligatur rursus esse H, ad G, ut D, ad E; eritque propterea major proportio A, ad G, quam H, ad G; Ideoque A, major erit, quam H. Quare major quantitas A, ad C, habebit majorem proportionem, quam minor quantitas H, ad eandem C: Atqui ut H, ad C, ita est, ex æqualitate D, ad F. (quotiam ut D, ad E, ita est H, ad G; & ut E, ad F, ita G, ad C.) Major ergo proportio quoque erit A, ad C, quam D, ad F. Quod est propositum.]

xxxij. [THEOR. 32. PROPOS. 32.]

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, sitque major proportio primæ priorum ad secundam, quam secundæ posteriorum ad tertiam; Item secundæ priorum ad tertiam major, quam primæ posteriorum ad secundam: Erit quoque ex æqualitate, major proportio primæ priorum ad tertiam, quam primæ posteriorum ad tertiam.

TAB. XXI. **Fig. 9.** **S**int tres magnitudines A, B, C, & aliæ tres D, E, F, sitque major proportio A, ad B, quam E, ad F. Item major B, ad C, quam D, ad E. Dico esse quoque majorem proportionem ex æqualitate A, ad C, quam D, ad F. *a*Intelligatur enim esse G, ad C, ut D, ad E, eritque propterea proportio B, ad C, major quam G, ad C. *b*Ideoque major erit B, quam G. *b*Quare major erit proportio A, ad G, minorem, quam ejusdem A, ad B, majorem; Est autem proportio A, ad B, major quam E, ad F. Multo ergo major est proportio A, ad G, quam E, ad F. *c*Intelligatur rursus esse H, ad G, ut E, ad F; Eritque propterea major proportio A, ad G, quam H, ad G; *c*ideoque major erit A, quam H. *d*Quocirca A, major ad C, majorem habebit proportionem, quam H, minor ad eandem C: *e*At ut H, ad C, ita est ex æqualitate, D, ad F. (Quoniam ut D, ad E, ita est G, ad C, & ut E, ad F, ita est H, ad G.) Major ergo etiam est proportio A, ad C, quam D, ad F. Quod est propositum.]

THEOR.

Fig. 3.

TAB. XXI.




Fig. 4.




Fig. 5.








Fig. 6.





[T H E O R. 33. P R O P O S. 33. xxxij:

Si fuerit major proportio totius ad totum, quam ablati ad ablatum: Erit & reliqui ad reliquum major proportio, quam totius ad totum.

SIt major proportio totius AB, ad totam CD, quam ablatæ AE, ad ablatam CF. Dico & proportionem reliquæ EB, ad reliquam FD, majorem esse, quam totius AB, ad totam CD. Cum enim major sit proportio AB, ad CD, quam AE, ad CF; erit quoque permutando major proportio AB, ad AE, quam CD, ad CF; *b* ac propterea, per conversionem rationis, minor erit proportio AB, ad EB, quam CD, ad FD. *c* Permutando igitur, minor quoque erit proportio AB, ad CD, quam EB, ad FD, hoc est, EB, reliqua ad reliquam FD, majorem habeat proportionem, quam tota AB, ad totam CD. Quod est propositum.]

[T H E O R. 34. P R O P O S. 34. xxxiv.

Si sint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, sitque major proportio primæ priorum ad primam posteriorum, quam secundæ ad secundam; & hæc major, quam tertiæ ad tertiam; & sic deinceps: Habebunt omnes priores simul ad omnes posteriores simul, majorem proportionem; quam omnes priores, relicta prima, ad omnes posteriores, relicta quoque prima; minorem autem, quam prima priorum ad primam posteriorum, majorem denique etiam, quam ultima priorum ad ultimam posteriorum.

SInt primùm tres magnitudines A, B, C, & aliæ tres D, E, F. Sit autem major proportio

310 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

- tio A, ad D; quam B, ad E; Item major B, ad E, quam C, ad F. Dico proportionem ipsarum A, B, C, simul ad ipsas D, E, F, simul majorem esse proportionem ipsarum B, C, simul ad ipsas E, F, simul; minorem vero, proportionem A, ad D; majorem denique etiam proportionem C, ad F. Cum enim major sit proportio
227. *quint.* A, ad D, quam B, ad E; *a* erit permutando
228. *quint.* major A, ad B, quam D, ad E. *b* Igitur componendo, major erit proportio ipsarum A, B, simul ad B, quam ipsarum D, E, simul ad E;
227. *quint.* *c* Permutando ergo rursus, major erit proportio A, B, simul ac D, E, simul, quam B, ad E. Itaque cum tota A, B, ad totam D, E, majorem habeat proportionem, quam ablata B, ad ablatam E; *d* habebit quoque reliqua A, ad reliquam D, majorem proportionem, quam tota A, B, ad totam D, E. Eadem ratione, major erit proportio, B, ad E, quam totius B, C, ad totam E, F: Multo ergo major erit proportio A, ad D, quam B, C, totius ad totam E, F.
227. *quint.* *e* Permutando igitur, major erit proportio A, ad
228. *quint.* B, C, quam D, ad E, F; *f* & componendo ergo major est proportio totius A, B, C, ad B, C, quam totius D, E, F, ad E, F, *g* Et rursus permutando major proportio omnium A, B, C, simul ad omnes D, E, F, simul quam B, C, ad E, F, quod est primum.
- Itaque cum sit major proportio totius A, B, C, ad totam D, E, F, quam ablatæ B, C, ad ablatam E, F, *b* erit & major proportio reliquæ A, ad reliquam D, quam totius A, B, C, ad totam D, E, F, quod est secundum.
- Quoniam vero major est proportio B, ad E, quam C, ad F; *i* erit permutando major quoque
227. *quint.* B, ad C, quam E, ad F; *k* & componendo, major totius B, C, ad C, quam totius E, F, ad F, *l* & rursus permutando, major B, C, ad E, F, quam C, ad F. Est autem major proportio A, B, C, ad D, E, F, ut ostendimus, quam B, C, ad E, F. Multo ergo major erit pro-

proportio omnium A, B, C, ad omnes D, E, F, quam ultimæ C, ad ultimam F, quod est tertium.

Deinde sint quatuor magnitudines utrobique cum eadem hypothefi, hoc est, fit quoque major proportio tertix C, ad F, tertiam, quam G, quartæ ad H, quartam. Dico eadem consequi. Ut enim jam in tribus est ostensum, major est proportio B, ad E, quam B, C, G, ad E, F, H. Multo ergo major erit A, ad D, quam B, C, G, ad E, F, H. *m* Permutando ergo major erit A, ad B, C, G, quam D, ad E, F, H, & componendo major A, B, C, G, ad B, C, G, quam D, E, F, H, ad E, F, H, & permutando A, B, C, G, ad D, E, F, H, major quam B, C, G, ad E, F, H, quod est primum.

TAB.
XXII.
fig. 3.
m27 quins.
st.
na8 quins.
oa7 quins.

Itaque cum fit major proportio totius A, B, C, G, ad totam D, E, F, H, quam ablata B, C, G, ad ablatam E, F, H, perit & reliqua A, ad reliquam D, major proportio, quam totius A, B, C, G, ad totam D, E, F, H, quod est secundum.

Quoniam vero, ut in tribus est demonstratum, major est proportio B, C, G, ad E, F, H, quam G, ad H; & major A, B, C, G, ad D, E, F, H, quam B, C, G, ad E, F, H, ut fuit ostensum; multo major erit proportio A, B, C, G, ad D, E, F, H, quam ultimæ G, ad ultimam H; quod est tertium.

Eadem arte concludes, eadem consequi in quinque magnitudinibus per quatuor; & in sex per quinque, & in septem, per sex, &c. quemadmodum ostendimus in quatuor, per tres. Constat ergo totum Theorema, &c.]

327
328
329



EUCLIDIS ELEMENTUM SEXTUM.

DEFINITIO. I.

Similes figuræ rectilinæ sunt, quæ & angulos singulos singulis æquales habent, atque etiam latera, quæ circum angulos æquales, proportionalia.

TAB.
XXII.
fig. 4.

UT triangula ABC , DEF , similia dicentur si fuerint equiangulara, ita ut angulus A , angulo D ; & B , ipsi E ; & C , ipsi F , equalis sit: Item latera circa æquales angulos proportionalia, hoc est, ut AB , ad AC , ita DE , ad DF ; & ut AB , ad BC , ita DE , ad EF , & ut AC , ad CB , ita DF , ad FE .

Quod si anguli unius æquales fuerint angulis alterius, singuli singulis, at latera circa æquales angulos non proportionalia, aut contra; non dicentur tales figura similes: Ex quibus constat, omnes figuras rectilineas equiangularas, & æquilateras, quæ & angulos & latera habent numero equalia, esse simi-

TAB.
XXII.
fig. 5.

les, quanquam inter se maxime sint inæquales. Cujusmodi sunt triangula æquilatera GHI , KLM . Propter laterum enim æqualitatem, erit GH , ad GI ,

GI, ut KL, ad KM. Item GH, ad HI, ut KL, ad LM, & GI, ad IH, ut KM, ad ML, cum semper sit proportio aequalitatis. Idem dicendum est de quadratis, pentagonis aequaliteris & aequiangulis, nec non de hexagonis, heptagonis, octogonis, & de aliis id genus figuris rectilineis aequiangulis, atque aequaliteris.

DEFINITIO. II.

Reciprocae autem figurae sunt, cum in utraque figura antecedentes & consequentes rationum termini fuerint.

UT si in parallelogrammis ABCD, EFGH, latera AB, BC, ita proportionalia fuerint lateribus EF, FG, ut utrobique sit & antecedens, & consequens diversarum proportionum, hoc est, ut sit ea proportio AB, ad EF, qua FG, ad BC, seu eadem AB, ad FG, qua EF, ad BC; (utroque enim modo AB, est antecedens unius proportionis & BC, consequens alterius, in figura ABCD, quemadmodum & primo modo EF, est consequens unius, & FG, antecedens alterius; vel secundo modo FG, consequens, & EF, antecedens, in figura EFGH,) dicentur huiusmodi parallelogramma reciproca, quamvis similia non sint. Similiter erunt triangula IKL, MNO, reciproca, si fuerit ut IK, ad MN, ita MO, ad IL; vel ut IK, ad MO, ita MN, ad IL. Neque memini me invenisse apud Geometras usum reciprocarum figurarum in aliis figuris, quam in parallelogrammis, & triangulis.

TAB.
XXII.
fig. 6.

TAB.
XXII.
fig. 7.

DEFINITIO. III.

Secundum extremam, & mediam rationem recta linea secta esse dicitur, cum ut tota ad majus segmentum, ita majus ad minus se habuerit.

TAB. XXII. *SI* linea recta quævis AB , ita dividatur in C , inæqualiter, ut sit, quemadmodum tota AB , ad majus segmentum AC , ita AC , majus segmentum ad CB , minus segmentum; dicitur divisa esse secundum extremam, & mediam rationem.

DEFINITIO. IV.

Altitudo cujusque figuræ est linea perpendicularis à vertice ad basin deducta.

TAB. XXII. *SI* à vertice A , trianguli ABC , ad basin BC , perpendicularis ducatur AG , dicitur hac perpendicularis, altitudo trianguli ABC ; ita ut tantam dicatur habere altitudinem triangulum, quanta est perpendicularis AG . Sic etiam perpendicularis DH , ducta à D , vertice trianguli DEF , ad basin EF , ad partes E , protractam, appellabitur altitudo trianguli DEF . Itaque si duarum figurarum perpendiculares à verticibus ad bases (sive hæ protractæ sint, sive non) demissa, fuerint æquales, eandem dicentur hujusmodi figura habere altitudinem. Tunc autem hujusmodi perpendiculares erunt æquales, cum bases figurarum, ac vertices in eisdem constituti fuerint parallelis, cujusmodi sunt perpendiculares AG , DH , triangulorum ABC , DEF , in eisdem parallelis constitutorum. Cum enim anguli AGH , DHG ,

DHG, interni ex eadem parte sint duobus rectis
 aequales; immo duo recti; a erunt recta AG, DH, a 28. primi
 parallela; Sunt autem & AD, GH, parallela,
 ea quod ponantur triangula in eisdem esse parallelis
 constituta. Igitur parallelogrammum erit ADHG;
 bac propterea latera opposita AG, DH, equalia b 34. primi
 erunt. Eandem igitur dicentur ea triangula habere
 altitudinem. Quod si in eisdem triangulis vertices
 ponantur C, & F, bases vero AB, & DE; non
 habebunt ea eandem altitudinem. Perpendicularis
 enim ducta ex F, ad Basin DE, protractam aqua-
 lis non est perpendiculari ex C, ad basin AB, de-
 ducta, cum nec triangula ipsa in eisdem parallelis
 possint constitui, ut manifestum est.

Recte vero ab Euclide altitudo figura cujusvis de-
 finita est per lineam perpendicularem, qua a vertice
 ad basin deducitur: quoniam, ut scribit Ptolemaeus
 in libello de Analemmate, & referente Simplicio,
 in libro de dimensione, mensura cujuscunque rei
 debet esse stata, determinataque, & non indefinita:
 Inter omnes autem rectas lineas, penes quas merito
 Geometra, sicut & vulgus, omnia metiuntur, sola
 linea perpendicularis certa est, determinataque longi-
 tudinis, alia autem omnes incerta indeterminataque.

DEFINITIO. V.

Ratio ex rationibus componi dicitur, cum
 rationum quantitates inter se multiplicatae,
 aliquam effecerint rationem.

Quoniam denominator cujuslibet proportionis ex-
 primit, quanta sit magnitudo antecedens ad
 consequentem; (ut denominator quadrupla proportio-
 nis, sempe. 4. ostendit, in quavis proportione qua-
 drupla

P

drupla

dupla antecedentem magnitudinem quater continere consequentem; denominator vero proportionis subquadrupla, videlicet $\frac{1}{4}$. indicat antecedentem esse partem quartam consequentis, &c.) dici solet propterea denominator à Geometris, quantitas proportionis; ut idem significet quantitas alicujus proportionis, quod denominator. Vult igitur hac definitio, proportionem aliquam ex duabus, vel pluribus proportionibus componi, quando harum denominatores, seu quantitates inter se multiplicatae effecerint illam proportionem, seu (ut veris Zambertus) effecerint illius proportionis quantitatem, sive denominatorem. Ut proportio duodecupla componi dicitur ex dupla, & sextupla; quoniam denominator proportionis duodecupla, nimirum 12. producitur ex multiplicatione denominatoris dupla proportionis, nempe ex 2. in denominatorem sextupla, hoc est, in 6. Sic eadem proportio duodecupla dicitur componi ex tripla & quadrupla. Nam ex multiplicatione 3. in 4. producitur idem denominator 12. duodecupla proportionis. Eadem ratione proportio trigecupla componi dicitur ex dupla, tripla, & quinquupla. Nam harum denominatores 2. 3. 5. inter se multiplicati gignunt 30. denominatorem illius.

Porro quemadmodum in magnitudinibus continue proportionalibus; proportio prima ad ultimam componi dicitur ex proportionibus prima ad secundam, & secundam ad tertiam, & tertiam ad quartam, &c. cum illa ex his intermediis constet, & illius denominator ex harum denominatoribus inter se multiplicatis producat, ut quinto libro defin. 10. exposuimus: ita ut si fuerint due proportionibus aequales intermedia, ex quibus dicitur componi, dicatur proportio prima magnitudinis ad ultimam duplicata proportionibus prima ad secundam; si tres, triplicata, &c. Sic etiam

etiam in magnitudinibus quibuscunque ordine positis, proportio prima ad ultimam dicitur componi ex proportione prima ad secundam, & secundæ ad tertiam, & tertiæ ad quartam, &c. donec extiterit proportio; quoniam denominator proportionis primæ magnitudinis ad ultimam consurgit ex denominatoribus proportionum intermediarum inter se multiplicatis.

DEFINITIO. VI.

[Parallelogrammum secundum aliquam rectam lineam applicatum, deficere dicitur parallelogrammo quando non occupat totam lineam. Excedere vero, quando occupat majorem lineam, quam sit ea, secundum quam applicatur: ita tamen, ut parallelogrammum deficiens, aut excedens eandem habeat altitudinem cum parallelogrammo applicato, constituatque cum eo totum unum parallelogrammum.]

Si data recta linea AB , supra quam constituatur ^{TAB.} parallelogrammum $ACDE$, quod non occupet ^{XXII} totam lineam AB , sed desit CB ; & ducta BF , ^{fig. 10.} parallela ipsi CD , donec cum ED , protracta conveniat in F , compleatur totum parallelogrammum $ABFE$. Parallelogrammum igitur AD , applicatum secundum rectam AB , deficere dicitur parallelogrammo DB , ita ut DB , appelletur defectus.

Rursus sit data recta linea AC , supra quam constituentur parallelogrammum $ABFE$, quod habeat latus AB , majus recta data AC ; & ducatur CD , ipsi BF , parallela. Parallelogrammum igitur AF , applicatum secundum rectam AC , excedere dicitur parallelogrammo DB , ita ut DB , vocetur excessus.

THEOR. I. PROPOS. I.

Triangula & parallelogramma, quorum eadem fuerit altitudo, ita se habent inter se, ut bases.

TAB. XXII.
fig. 11.

Sint duo triangula ABC, DEF, eandem habentia altitudinem, quorum bases BC, EF. Item duo parallelogramma CG, EH, ejusdem altitudinis, quorum eadem bases BC, EF. Dico ita esse triangulum ABC, ad triangulum DEF, & parallelogrammum CG, ad parallelogrammum EH, ut est basis BC, ad basin EF. Hoc est, si basis BC, statuatur prima magnitudo, & basis EF, secunda: At triangulum ABC, vel parallelogrammum CG, tertia, & triangulum DEF, vel parallelogrammum EH, quarta, æque multiplicia primæ ac tertiæ ab æque multiplicibus secundæ & quartæ vel una deficere, vel una æqualia esse, vel una excedere, ut definitio 6. libr. 5. exigit. Collocentur enim tam triangula, quam parallelogramma inter easdem parallelas GH, LN, (Nam ut in defin. 4. dictum est, triangula ac parallelogramma tum demum eandem habebunt altitudinem, cum inter easdem fuerint constituta parallelas, sic enim perpendiculares à verticibus ad bases demissæ æquales erunt,) & ex BL, sumantur quocunque rectæ BI, IK, KL, ipsi BC, æquales; Item ex FN, abscindantur quocunque rectæ FM, MN, æquales rectæ EF. Deinde ex A, & D, deducantur rectæ AI, AK, AL; DM, DN, ærunt igitur triangula ABC, AIB, AKI, ALK, super æquales bases, & inter easdem parallelas constituta, inter se æqualia. Eadem ratione æqualia erunt triangula DEF, DFM, DMN. Quam multiplex est ergo recta CL, rectæ BC, tam multiplex quoque erit triangulum ACL, trianguli ABC; & quam multiplex est recta EN, rectæ EF, tam quoque multiplex erit triangulum DEN, trianguli DEF, quia in
tot

tot triangula æqualia sunt divisa tota triangula
 ACL, DEN, in quot rectas æquales sectæ fue-
 runt totæ rectæ CL, EN. Quoniam vero si ba-
 sis CL, æqualis fuerit basi EN, b necessario tri- b 38. primæ
 angulum ACL, æquale est triangulo DEN, ac
 proinde si CL, major fuerit quam EN, necessario
 ACL, majus est quam DEN, & si minor, mi-
 nus; deficient propterea una CL, recta, & tri-
 angulum ACL, æque multiplicia primæ magni-
 tudinis BC, & tertix ABC, ab EN, recta & trian-
 gulo DEN, æque multiplicibus secundæ EF, &
 quartæ DEF, vel una æqualia erunt, vel una
 excedent, si ea sumantur, quæ inter se respon-
 dent. a Quare quæ proportio est primæ BC, ad a 6. def.
 secundam EF, basis ad basim, ea est tertix ABC, quinti.
 ad quartam DEF, trianguli ad triangulum. Sicut
 igitur basis ad basim, ita est triangulum ad tri-
 angulum. Quod est propositum.

Quoniam autem b ut triangulum ABC, ad tri- b 5. quinti;
 angulum DEF, ita est parallelogrammum CG,
 (c quod duplum est trianguli ABC,) ad paralle- c 34. primæ
 logrammum EH; (d quod est duplum trianguli d 34. primæ
 DEF,) perspicuum est, e ita quoque esse paralle- e 11. quinti.
 logrammum ad parallelogrammum, ut est basis
 ad basim. Quod tamen eodem argumento con-
 firmari potest, quo usi sumus in triangulis, si
 prius ex punctis I, K, L, educantur rectæ pa-
 rallelæ ipsi BG; nec non ex punctis M, N, pa-
 rallelæ ipsi FH, &c. Triangula igitur & paral-
 lelogramma, quorum eadem fuerit altitudo; ita
 se habent inter se, ut bases. Quod erat demon-
 strandum.

T H E O R. 2. P R O P O S. 2. h.

Si ad unum trianguli latus parallela ducta fuerit recta quædam linea, hæc proportio-
 naliter secabit ipsius trianguli latera. Et si
 trianguli latera proportionaliter secta fuerint,

P 3 quæ

quæ ad sectiones adjuncta fuerit recta linea, erit ad reliquum ipsius trianguli latus parallela.

TAB. XXII. **I**N triangulo ABC, ducatur primum recta DE, parallela lateri BC. Dico latera AB, AC, secta esse proportionaliter in D, & E, hoc est, esse ut AD, ad DB, ita AE, ad EC. Ductis enim rectis CD, BE, ærunt triangula DEB, DEC, super eandem basin DE, & inter easdem parallelas DE, BC, constituta inter se æqualia.

fig. 12. *a 37. primi.* *b 7. quint.* *c 1. sext.* *d 11. quint.* *e 1. sext.* *f 11. quint.* *g 1. sext.* *h 11. quint.* *i 9. quint.* *k 39. primi.*

b Quare ut triangulum ADE, ad triangulum DEB, ita est triangulum idem ADE, ad triangulum DEC: *c* Atqui ut triangulum ADE, ad triangulum DEB, ita est basis AD, ad basin DB; (cum hæc triangula sint ejusdem altitudinis, ut constat, si per E, agatur parallela recta ipsi AB.) & eadem ratione, ut triangulum ADE, ad triangulum DEC, ita est basis AE, ad basin EC.

d Ut igitur AD, ad DB, ita est AE, ad EC, (cum hæc duæ proportionales eadem sint proportioni trianguli ADE, ad triangulum DEB, & ejusdem trianguli ADE, ad triangulum DEC.) Quod est propositum.

Secet deinde recta DE, latera AB, AC, proportionaliter. Dico DE, parallelam esse reliquo lateri BC. Ductis enim rursus rectis CD, BE, erit ut basis AD, ad basin DB, ita triangulum ADE, ad triangulum DEB, cum sint ejusdem altitudinis: Ponitur autem ut AD, ad DB, ita AE, ad EC. Igitur erit ut triangulum ADE, ad triangulum DEB, ita AE, ad EC: Sed rursus *g* ut basis AE, ad basin EC, ita est triangulum ADE, ad triangulum DEC, cum sint altitudinis ejusdem. *h* Igitur ut triangulum ADE, ad triangulum DEB, ita est triangulum idem ADE, ad triangulum DEC. *i* Æqualia ergo sunt triangula DEB, & DEC: ac propterea, cum eandem habeant basin DE, *k* inter easdem erunt collocata parallelas. Igitur parallela est DE, ipsi BC, quod est propositum. Si itaque

ad

ad unum trianguli latus parallela ducta fuerit, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 3. PROPOS. 3. 117.

Si trianguli angulus bifariam sectus sit, fecans autem angulum recta linea secuerit & basin: basis segmenta eandem habebunt rationem, quam reliqua ipsius trianguli latera. Et si basis segmenta eandem habeant rationem, quam reliqua ipsius trianguli latera; recta linea, quæ à vertice ad sectionem producitur, bifariam secat trianguli ipsius angulum.

IN triangulo ABC, recta AD, secet primo angulum BAC, bifariam. Dico esse ut BA, ad AC, ita BD, ad DC. Agatur enim per B, recta BE, parallela ipsi AD, donec cum CA, producta conveniat in E; (coibunt autem omnino BE, CA, propterea quod anguli C, & CBE, minores sunt duobus rectis i. Cum enim C, & CDA, a minores duobus rectis sunt; b sit autem angulus CDA, angulo CBE, externus interno, æqualis: erunt quoque C, & CBE, duobus rectis minores,) eritque angulus EBA, æqualis alterno BAD; & angulus E, externo DAC. Cum igitur duo anguli BAD, DAC, æquales ponantur; erunt & anguli EBA, & E, inter se æquales; Ideoque & rectæ BA, EA, inter se æquales. Ut igitur EA, ad AC, ita BA, ad eandem AC. Atqui ut EA, ad AC, ita est BD, ad DC. Cum in triangulo BCE, recta AD, sit parallela lateri BE. Igitur ut BA, ad AC, ita est BD, ad DC. Quod est propositum.

Sit deinde ut BA, ad AC, ita BD, ad DC. Dico rectam AD, bifariam secare angulum BAC. Agatur enim rursus per B, recta BE, ipsi AD,

TAB.

XXII.

fig. 13.

i 13. *prim.*

a 17. *primi*

b 19. *primi*

c 19. *primi*

d 6. *primi*

e 7. *quint.*

f 2. *sec.*

g u. *quint.*

232 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

h31. *primi*: parallela b coiens cum CA, protracta in E.
 Quoniam igitur ut BA, ad AC, ita ponitur BD,
 e 2. *sec.* ad DC. e Ut autem BD, ad DC, ita est EA,
 ad AC; (quod in triangulo BCE, recta AD,
 f 11. *quins.* fit lateri BE, parallela) ferit ut BA, ad AC,
 g 9. *quins.* ita EA, ad eandem AC. g Æquales igitur sunt
 h 5. *primi* BA, & EA, inter se, h ac propterea anguli
 i 29. *primi* ABE, & E, æquales quoque erunt. Cum igitur
 angulus ABE, æqualis sit alterno BAD, &
 angulus E, externo DAC, erunt & duo anguli
 BAD, DAC, inter se æquales, quod est propo-
 situm. Itaque si trianguli angulus bifariam sectus
 sit, &c. Quod erat demonstrandum.

(iv): THEOR. 4. PROPOS. 4.

Æquiangulorum triangulorum proportiona-
 lia sunt latera, quæ circum æquales angu-
 los, & homologa sunt latera, quæ æqua-
 libus angulis subtenduntur.

TAB. XXII. *fig. 14.* SInt æquiangula triangula ABC, DCE, sintque
 æquales anguli ABC, DCE, & ACB, DEC,
 BAC, CDE. Dico esse AB, ad BC, ut DC,
 ad CE, & BC, ad CA, ut CE, ad ED; & AB,
 denique ad AC, ut DC, ad DE: Ita enim latera
 circa æquales angulos sunt proportionalia, ho-
 mologaque sunt ea latera, quæ æqualibus angulis
 subtenduntur, hoc est, & antecedentia omnia
 æquales respiciunt angulos, & consequentia si-
 militer. Constituantur latera BC, CE, secundum
 lineam rectam, ita ut angulus DCE, externus
 sit æqualis interno ABC, pariterque externus
 ACB, interno DEC. Et quia duo anguli ABC,
 a 17. *primi* ACB, & minores sunt duobus rectis: est autem
 angulo ACB, æqualis angulus DEC, erunt &
 b 13. *primi* anguli B, & E, duobus rectis minores. b Quare
 rectæ BA, & ED, productæ ad partes A, D,
 coibunt. Producantur ergo, & convenient in F.
 Quoniam vero angulus externus DCE, æqualis
 est

est interno opposito ABC; & parallelæ erunt CD, ^{c 28. prim.}
 & BF, Eadem ratione parallelæ erunt CA, &
 EF, quod angulus externus ACB, fit æqualis in-
 terno DEC. Parallelogrammum est igitur ACDF,
 & proptereaque recta AF, æquatis rectæ CD; & ^{d 34. prim.}
 recta CA, rectæ DF. Quoniam igitur in trian-
 gulo BEF, recta AC, parallela est lateri EF,
 erit AB, ad AF, hoc est, ad DC, (quæ æ- ^{e 2. sext.}
 qualis est ipsi AF,) ut BC, ad CE. Permutan-
 do figitur erit AB, ad BC, ut DC, ad CE. ^{f 16. quint.}
 Rursus quia in eodem triangulo BEF, recta CD,
 parallela est lateri BF, erit BC, ad CE, ut ^{g 2. sext.}
 FD, hoc est, ut CA, (quæ æqualis est ipsi FD)
 ad ED. Permutando bigitur erit BC, ad CA, ^{h 16. quint.}
 ut CE, ad ED. Cum igitur sit AB, ad BC,
 ut DC, ad CE, & BC, ad CA, ut CE, ad
 ED: erit & ex æqualitate AB, ad CA, ut DC, ^{i 22. quint.}
 ad ED. Quod est propositum. Æquiangulorum
 ergo triangulorum proportionalia sunt latera, &c.
 Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M .

Hinc fit, lineam rectam, quæ parallela ducitur uni
 lateri in triangulo, aut re triangulum toti triangulo ^{TAB.}
 simile. Ducatur enim in triangulo ABC, lateri BC, ^{XXII.}
 parallela DE, Dico triangulum ADE, triangulo ABC, ^{fig. 15.}
 esse simile. Æquiangula namque sunt, & cum anguli ^{k 29. prim.}
 ADE, AED, æquales sint angulis ABC, ACB, exter-
 nis; & angulus A, communis. Quare ut demo-
 stratum est, habent latera circa æquales angulos propor- ^{l 4. sext.}
 tionalia; Ac proinde, ex definitione, similia sunt.

T H E O R . 5 . P R O P O S . 5 .

Si duo triangula latera proportionalia ha-
 beant; æquiangula erunt triangula, & æ-
 quales habebunt eos angulos, sub quibus &
 homologa latera subtenduntur.

Habeant triangula ABC, DEF, latera propor- ^{TAB.}
 tionalia, sitque AB, ad BC, ut DE, ad ^{XXIII.}
 EF, ^{P 5} ^{fig. 15}

234 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

EF, & BC, ad CA, ut EF, ad FD, & AB, denique ad AC, ut DE, ad DF. Dico triangula esse æquiangula, angulum scilicet A, æqualem esse angulo D, & angulum B, angulo E, & angulum C, angulo F. Sic enim anguli æquales respiciunt homologa latera. *k* 23. *primi* Fiat angulus FEG, æqualis angulo B; & angulus EFG, angulo C, convenientque rectæ EG, FG, in G: *a* 32. *primi* eritque reliquus angulus G, reliquo angulo A, æqualis. *b* 4. *sext.* *Æ*quiangula igitur sunt triangula ABC, GEF. Quare *b* ut AB, ad BC, ita est GE, ad EF: Ut autem AB, ad BC, ita ponitur DE, *e* 11. *quint.* ad EF. *c* Igitur ut GE, ad EF, ita est DE, *d* 9. *quint.* ad EF, eandem: *d* proptereaque æquales erunt *e* 4. *sext.* GE, DE. Rursus, *e* quoniam ut BC, ad CA, ita est EF, ad FG: Ut autem BC, ad CA, ita ponitur EF, ad FD; *f* erit ut EF, ad FG, ita *g* 9. *quint.* eadem EF, ad FD; *g* ideoque æquales erunt FG, FD. Itaque cum latera EG, FG, æqualia sint lateribus DE, DF, utrumque utrique; & basis communis EF; *h* erunt anguli G, & D, æquales, *i* ac propterea & reliqui anguli GEF, GFE, reliquis angulis DEF, DFE, æquales erunt. Quamobrem cum angulus G, æqualis sit angulo A; erit & angulus D, eidem angulo A, æqualis, eodemque modo angulus DEF, angulo B, & angulus DFE, angulo C, æqualis erit, quod est propositum. Si duo igitur triangula latera proportionalia habeant, &c. Quod ostendendum erat.






vi.


THEOR. 6. PROPOS. 6.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, & circum æquales angulos latera proportionalia habuerint: æquiangula erunt triangula, æqualesque habebunt angulos, sub quibus homologa latera subtenduntur.

TAB.
XXIII.
fig. 2.

Sit angulus B, trianguli ABC, æqualis angulo E, trianguli DEF, sintque latera AB, BC, pro-





proportionalia lateribus DE, EF, hoc est, sit AB, ad BC, ut DE, ad EF. Dico reliquos angulos reliquis angulis æquales esse, angulum scilicet A, angulo D, & angulum C, angulo F; Ita enim æquales anguli homologa latera respiciunt. Fiat angulo B, æqualis angulus FEG; *d & a. d. 23. prim.* angulo C, angulus EFG, eritque ut in præcedenti propos. dictum est, triangulum GEF, triangulo ABC, æquiangulum. Quare aut AB, ad BC, *a. 4. sens.* ita est, GE, ad EF: Sed ut AB, ad BC, ita ponitur DE, ad EF. *b. 11. quins.* Igitur ut DE, ad EF, ita est GE, ad eandem EF; *c. 9. quins.* atque idcirco DE, GE, æquales erunt. Itaque cum latera DE, EF, æqualia sint lateribus GE, EF, & anguli ipsis contenti æquales quoque; (nam angulo B, cui factus est æqualis angulus FEG, æqualis est positus angulus DEF, proptereaque æquales ad invicem erunt anguli DEF, GEF.) *d. 4. prim.* erunt reliqui anguli D, EFD, reliquis angulis G, EFG, æquales. Cum ergo angulus G, sit æqualis angulo A, & angulus EFG, angulo C; erunt etiam angulis A, C, æquales anguli D, EFD, & ob id æquiangula erunt triangula ABC, DEF, quod est propositum. Si igitur duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 7. PROPOS. 7. vij.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, circum autem alios angulos latera proportionalia habeant; reliquorum vero simul utrumque aut minorem, aut non minorem recto: Æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt eos angulos, circum quos proportionalia sunt latera.

Si angulus A, trianguli ABC, æqualis angulo *TAB;* D, trianguli DEF, & latera AC, CB, circa *XXIII,* angulo *FE. 31*

angulum ACB, proportionalia lateribus DF, FE, circa angulum F, hoc est sit ut AC, ad CB, ita DF, ad FE, hac tamen lege, ut quilibet reliquorum angulorum B, & E, sit vel minor recto, vel non minor. Dico æquiangula esse triangula, angulos scilicet ACB, & F, circa quos sunt latera proportionalia, & angulos B, & E, æquales esse. Sit enim primum tam B, quam E, recto minor: Quo posito, si anguli ACB, & F, non sunt æquales, sit ACB, major quam F: fiatque ipsi F, æqualis ACG. Cum igitur, & angulus A, angulo D, ponatur æqualis, a 32. primi e erit & reliquus AGC, reliquo E, æqualis; ideoque triangula AGC, DEF, æquiangula erunt. b 4. sext. Quare b ut AC, ad CG, ita erit DF, ad EF: Sed ut DF, ad FE, ita ponitur AC, ad CB. c 11. quint. c Ut igitur AC, ad CG, ita erit eadem AC, d 9. quint. ad CB, d ac propterea æquales erunt CG, CB, e 5. primi e & anguli CBG, CGB, æquales. Cum igitur angulus B, ponatur recto minor, erit & CGB, minor recto, ideoque ei deinceps AGC, f 13. primi recto major; f cum AGC, CGB, sint duobus rectis æquales: Est autem ostensus angulus AGC, angulo E, æqualis. Major igitur recto est quoque angulus E: Sed positus est etiam recto minor. Quod est absurdum.

Sit deinde tam B, angulus, quam E, recto non minor; erique ut prius, angulus B, angulo CGB, æqualis, ideoque & CGB, recto non minor erit; ac propterea anguli CBG, CGB, in triangulo BCG, non minores erunt duobus rectis, sed vel majores, vel æquales duobus rectis, quod est absurdum. g 17. primi g Sunt enim duobus rectis minores. Non ergo inæquales sunt anguli ACB, h 32. primi h & F, sed æquales, atque hinc relinqui etiam anguli B, & E, æquales erunt, quod est propositum. Si duo itaque triangula unum angulum uni angulo æqualem, &c. Quod demonstrandum erat.

THEOR.

T H E O R. 8. P R O P O S. 8. viij.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto in basin perpendicularis ducta sit: quæ ad perpendicularem triangula, tum toti triangulo tum ipsa inter se similia sunt.

IN triangulo ABC, angulus BAC, sit rectus, à quo ad basin perpendicularis agatur AD. Dico triangula ADB, ADC, similia esse & toti triangulo ABC, & inter se. Cum enim in triangulis ABC, DBA, anguli BAC, & ADB, sint recti, & angulus B, communis; erunt & reliqui anguli ACB, & DAB, æquales. Equiangulum est igitur triangulum DBA, triangulo ABC, hæc propterea habebunt latera circa æquales angulos proportionalia, &c. hoc est, erit ut CB, ad BA, ita BA, ad BD; & ut BA, ad AC, ita BD, ad DA; & ut BC, ad CA, ita BA, ad AD. Ita enim latera homologa æqualibus angulis opponuntur, ut vult propos. 4. hujus lib. Quare simile est triangulum ADB, toti triangulo ABC. Eodem modo ostendetur triangulum ADC, simile eidem triangulo ABC. Nam anguli BAC, & ADC, sunt recti, & angulus C, communis; hæc propterea anguli ABC, & CAD, æquales. Quare erit BC, ad CA, ita CA, ad CD; & ut CA, ad AB, ita CD, ad DA, & ut CB, ad BA, ita CA, ad AD. Sic enim opponuntur quoque homologa latera angulis æqualibus, ex præscripto propos. 4. hujus lib. Non secus demonstrabitur, similia inter se esse triangula ADB, & ADC, cum anguli ADB, ADC, sint recti, & anguli ABD, CAD, ostensi æquales, nec non anguli BAD, ACD; Atqui idcirco sit erit BD, ad CA, ita DA, ad DC; & ut DA, ad AB, ita DC, ad CA; & ut AB, ad BD, ita CA, ad AD. Si igitur in triangulo rectangulo, ab angulo recto in basin perpendicularis

TAB.

XXIII.

fig. 4.

a 32. primi.

b 4. sec.

ix

... T

XXXX

c 32. primi.

d 4. sec.

e 4. sec.

laris

238 *EUCLIDIS GEOMETRIÆ.*

laris ducta fit , &c. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M.

Ex hoc manifestum est , perpendicularem , quæ in rectangulo triangulo ab angulo recto in basin demittitur , esse mediam proportionalem inter duo basis segmenta : Item utrumlibet laterum angulum rectum ambientium , mediam proportionalem inter totam basin , & illud segmentum basis , quod ei lateri adjacet.

Ostensum est enim , esse ut BD , ad DA , ita DA , ad DC ; ac propterea DA , esse mediam proportionalem inter BD , & CD : Item esse ut CB , ad BA , ita BA , ad BD ; & idcirco BA , mediam esse proportionalem inter CB , & BD : Denique esse ut BC , ad CA , ita CA , ad CD ; ideoque CA , esse proportionalem mediam inter BC , & CD . Quod est propositum.

P R Ó B L E M A I. P R O P O S. 9.

A data recta linea imperatam partem auferre.

TAB. XXIII. **Fig. 5.** Imperetur , ut ex linea AB , auferamus partem tertiam. Ex A , ducatur recta AC , utcunque faciens angulum CAB ; & ex AC , abscindantur tot partes æquales cujuslibet magnitudinis , quæ pars detrahenda est ex AB , ut in proposito exemplo tres AD , DE , EF . Deinde ex F , ad B , recta ducatur FB , cui per D , parallela agatur DG . Dico AG , esse partem tertiam imperatam rectæ AB . Nam cum in triangulo ABF , lateri FB , parallela sit recta DG ; a erit ut FD , ad DA , ita BG , ad GA . b Componendo igitur , ut FA , ad DA , ita BA , erit ad GA : Sed FA , ipsius AD , est tripla , ex constructione. Igitur & BA , ipsius AG , erit tripla ; ideoque AG , tertia pars erit ipsius AB , quæ imperabatur. A data ergo recta linea imperatam partem abstulimus. Quod faciendum erat.

THEOR.

PROBL. 2. PROPOS. 10. xij.

Datam rectam lineam infectam similiter secare, ut data altera recta secta fuerit.

Sit recta AB, secanda similiter, ut secta est recta AC, in D, & E, hoc est, in partes, quæ sint partibus AD, DE, EC, proportionales. TAB. XXIII. fig. 6.
 Coniungantur datæ duæ lineæ ad A, facientes angulum quemcunque BAC, & connectatur recta BC. Deinde ex D, E, agantur DF, EG, parallelæ ipsi BC. Dico rectam AB, similiter esse sectam in F, & G, ut est secta AC, in D, & E, sicut AD, ad DE, ita est AF, FG. a 2. sect.
 Proportionales ergo sunt partes AF, FG, partibus AD, DE. Quod si ducatur DH, ipsi FB, parallela, secans EG, in I; erit rursus, ut DE, ad EC, ita DI, ad IH, hoc est, ita FG, ad GB; quod FG, ipsi DI, & GB, ipsi IH, æqualis sit. b 2. sect. c 34. prim.
 Quare proportionales quoque erunt partes FG, GB, partibus DE, EC. Eademque ratio est de pluribus partibus, si ex E, & C, ipsi AB, parallelæ agantur, &c. Itaque datam rectam lineam infectam similiter secimus, ut data altera recta secta fuit. Quod faciendum erat.

PROBL. 3. PROPOS. 11. x.

Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem adinvenire.

Sint duæ rectæ AB, AC, ita dispositæ, ut efficiant angulum A, quemcunque, sitque inventenda illis tertia proportionalis, sicut quidem AB, ad AC, ita AC, ad tertiam. TAB. XXIII. fig. 7.
 Producatur AB, quam volumus esse antecedentem, & capiatur BD, æqualis ipsi AC, quæ consequens esse debet, sive media. Deinde ducta recta BC, agatur

240 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

agatur illi ex D, parallela DE, occurrens ipsi AC, productæ in E. Dico CE, esse tertiam proportionalem, hoc est, esse ut AB, ad AC, ita AC, ad CE. Cum enim in triangulo ADE, a 2. sext. lateri DE, parallela sit recta BC; a erit ut AB, b 7. quint. ad BD, ita AC, ad CE: b Sed ut AB, ad BD, ita eadem AB, ad AC, æqualem ipsi BD. Ut igitur AB, ad AC, ita AC, ad CE: quod est propositum. Duabus ergo datis rectis lineis, tertiam proportionalem adinvenimus. Quod erat faciendum.

S C H O L I U M.

Inventa autem tertia linea continue proportionali, si primam omiseris, & aliis duabus tertiam inveneris, habebis quatuor lineas continue proportionales. TAB. XXIII. fig. 16. Ut si lineis A, & B, adinveniatur tertia proportionalis C, & duabus B, & C, tertia proportionalis D. erunt quatuor lineæ A, B, C, D, continue proportionales. Eadem arte reperietur quinta proportionalis, sexta, septima, octava; & sic in infinitum.

P R O B L. 4. P R O P O S. 12.

Tribus datis rectis lineis, quartam proportionalem invenire.

TAB. XXIII. fig. 8. Sint tres lineæ rectæ AB, BC, AD, quibus invenienda sit quarta proportionalis; sicut quidem AB, ad BC, ita AD, ad quartam. Disponentur primæ duæ AB, BC, secundum lineam rectam, quæ sit AC: Tertia vero AD, cum prima AB, faciat angulum A, quemcunque. Deinde ex B, ad D, recta ducatur BD, cui per C, parallela ducatur CE, occurrens rectæ AD, productæ, in E, puncto. Dico DE, esse quartam proportionalem. Cum enim in triangulo ACE, lateri CE, acta sit parallela BD; a erit ut AB, ad BC, ita AD, ad DE. Quare DE, quarta

quarta est proportionalis ; ac propterea tribus datis rectis lineis , quartam proportionalem invenimus. Quod faciendum erat.

PROBL. 5. PROPOS. 13. ix.

Duabus datis rectis lineis , mediam proportionalem adinvenire.

Sint duæ rectæ AB, BC, quibus media inveni- ^{TAD}
 enda est proportionalis, dispositæ secundum ^{XXIII.}
 lineam rectam AC. Divisa AC, bifariam in E, ^{fig. 9.}
 ex E, centro, & intervallo EA, vel EC, semi-
 circulus describatur, ADC : Deinde ex B, ad
 AC, perpendicularis educatur BD, ad circumferentiam usque. Dico BD, esse, mediam proportionalem inter AB, & BC. Ductis enim rectis AD, CD ; erit angulus ADC, rectus in semi- ^{a 31. servit.}
 circulo. Cum igitur ex angulo recto ADC, trianguli rectanguli ADC, deducta sit ad basin AC, perpendicularis DB, erit per corollarium propos. 8. hujus lib. BD, media proportionalis inter AB, & BC. Duabus ergo datis rectis lineis mediam proportionalem adinvenimus. Quod erat faciendum.

THEOR. 9. PROPOS. 14. xii.

Æqualium & unum uni æqualem habentium angulum , parallelogrammorum , reciproca sunt latera , quæ circum æquales angulos. Et quorum parallelogrammorum unum angulum uni angulo æqualem habentium reciproca sunt latera , quæ circum æquales angulos ; illa sunt æqualia.

Sint duo parallelogramma æqualia ABCD, ^{TAD}
 BEFG, habentia angulos ABC, EBG, æqua- ^{XXIII.}
 les. Dico latera circum hosce angulos esse reci- ^{fig. 10.}
 proca,
 Q

242 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

proca, hoc est, esse ut AB, ad BG, ita EB, ad BC. Coniungantur enim parallelogramma ad angulos æquales, ita ut AB, & BG, unam efficiant lineam rectam. Quo facto, cum anguli ABC, EBG, sint æquales, erunt & EB, BC, una recta linea, ut ad propos. 15. lib. 1. ex Proclo demonstravimus. Producantur jam DC, & FG, donec coeant in H. Quoniam igitur æqualia sunt parallelogramma DB, BF: a erit ut DB, ad BH, ita BF, ad idem BH: Sed ut b c. fact. DB, ad BH, ita est AB, basis ad basin BG, quod parallelogramma sint ejusdem altitudinis; & similiter ut BF, ad BH, ita est basis EB, ad basin BC. Igitur ut AB, ad BG, ita est EB, ad BC. Quod est propositum.

a 7. quint.

b c. fact.

E contrario sint jam latera circa æquales angulos ABC, EBG, reciproca, hoc est, ut AB, ad BG, ita EB, ad BC. Dico parallelogramma DB, BF, esse æqualia. Facta enim eadem constructione; cum sit, ut AB, ad BG, ita EB, ad BC: c Ut autem AB, ad BG, ita DB, ad BH; & ut EB, ad BC, ita BF, ad idem BH; erit d 9. quint. quoque DB, ad BH, ita BF, ad idem BH. Atque idcirco æqualia erunt parallelogramma DB, BF. Æqualium igitur, & unum uni æqualem habentium angulum, &c. Quod erat demonstrandum.

c 1. fact.

d 9. quint.

xiv. THEOR. 10. PROPOS. 15.

Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum, triangulorum, reciproca sunt latera, quæ circum æquales angulos. Et quorum triangulorum unum angulum uni æqualem habentium reciproca sunt latera, quæ circum æquales angulos, illa sunt æqualia.

TAB. XXIII. Sint duo triangu-
la ABC, DBE, habentia angulos, qui ad B, æquales. Dico latera circa hosce angulos esse reciproca, hoc est, esse ut

ut

ut AB, ad BE, ita DB, ad BC. Coniungantur enim triangu-
la ad angulos æquales, ita ut AB, BE, efficiant lineam rectam. Quo facto, cum anguli ABC, DBE, sint æquales; erunt & DB, BC, una recta linea, ut demonstratum est ad propof. 15. lib. 1. ex Proclo. Ducta igitur recta CE, quoniam æqualia sunt triangu-
la ABC, DBE, a crit ut ABC, ad BCE, ita DBE, ad idem BCE. Sed ut triangulum ABC, ad trian-
gulum BCE, b ita est basis AB, ad basin BE, b 1. scilicet;
quod hæc triangu- la ejuſdem ſint altitudinis; & ſimiliter ut DBE, & BCE, ita eſt baſis DB, ad BC. Quare ut AB, ad BE, ita eſt DB, ad BC. Quod eſt propoſitum.

Jam vero contra, ſint latera circa angulos æ-
quales, qui ad B, reciproca, hoc eſt, ut AB, ad BE, ita DB, ad BC. Dico triangu- la ABC, DBE, eſſe æqualia. Facta enim conſtructione eadem, cum ſit ut AB, ad BE, ita DB, ad BC; ut autem AB, ad BE, c ita triangulum
ABC, ad triangulum BCE; & ut DB, ad BC, c 1. ſcilicet;
ita triangulum DBE, ad triangulum idem BCE; Erit ut ABC, ad BCE, ita DBE, ad idem BCE, d 9. quoniam;
& proptereaque æqualia erunt triangu- la ABC, DBE. Æqualium igitur, & unum uni æqualem habentium angulum, &c. Quod oftendendum erat.

THEOR. II. PROPOS. 16. xvj.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fue-
rint: quod sub extremis comprehenditur re-
ctangulum, æquale est ei, quod sub me-
diis comprehenditur, rectangulo. Et si sub
extremis comprehensum rectangulum æquale
fuerit ei, quod sub mediis continetur, re-
ctangulo; illæ quatuor rectæ lineæ propor-
tionales erunt.

¶ Int quatuor rectæ proportionales IAB, FG, TAB, EF, BC; ut quidem AB, ad FG, ita EF, ad BC. XXIII.
Q 2 ad fg. 12.

244 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ad BC: Sitque rectangulum ABCD, comprehensum sub extremis AB, BC; rectangulum vero EFGH, comprehensum sub mediis EF, FG: Dico rectangula AC, EG, esse æqualia. Cum enim anguli recti B, & F, sint æquales, & sit ut AB, ad FG, ita EF, ad BC, erunt latera circa æquales angulos B, & F, reciproca. Quare parallelogramma AC, EG, æqualia erunt. Quod est propositum.

Contra vero, sint jam æqualia rectangula AC, EG. Dico quatuor rectas lineas AB, FG, EF, BC, esse proportionales, hoc est, esse ut AB, ad FG, ita EF, ad BC. Cum enim æqualia sint rectangula AC, EG, habeantque angulos æquales, nempe rectos B, & F, erunt latera circa hosce angulos reciproca; sicut quidem AB, ad FG, ita EF, ad BC. Itaque si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, &c. Quod erat ostendendum.

xvi. T H E O R. 12. P R O P O S. 17.

Si tres rectæ lineæ sint proportionales: quod sub extremis comprehenditur rectangulum, æquale est ei, quod à media describitur, quadrato. Et si sub extremis comprehenditur rectangulum æquale sit ei, quod à media describitur, quadrato: illæ tres rectæ lineæ proportionales erunt.

T AB.
XXIII.
fg. 13. **S**int tres lineæ rectæ AB, EF, & BC, proportionales: ut quidem AB, ad EF, ita EF, ad BC: sitque rectangulum ABCD, contentum sub extremis AB, BC, & quadratum mediæ EF, sit EFGH. Dico æqualia esse rectangulum AC, & quadratum EG. Sumpta enim recta FG, quæ æqualis sit ipsi EF, erunt quatuor lineæ AB, EF, FG, BC, proportionales; ut quidem AB, ad EF, ita FG, ad BC; eritque quadratum EG, comprehensum sub mediis EF, FG, propter æqua-

qualitatem reftarum EF, FG. *a* Quare reftan- *a 16. fept.*
gulum AC, comprehenſum ſub extremis AB,
BC, æquale eſt quadrato EG, hoc eſt, reftan-
gulo ſub mediis EF, FG, comprehenſo: Quod
eſt propoſitum.

Sed ſunt jam æqualia reftangulum AC, & qua-
dratum EG. Dico eſſe ut AB, ad EF, ita EF,
ad BC. Cum enim æqualia ſint reftangula AC,
& EG; *b* erit ut AB, ad EF, ita FG, ad BC: *b 16. fept.*
c Ut autem FG, ad BC, ita eſt EF, ipſi FG, *c 7. quint.*
æqualis, ad eandem BC. Quare ut AB, ad EF,
ita eſt EF, ad BC. Si tres igitur reftæ lineæ
ſint proportionales, &c. Quod erat demonſtran-
dum.

C O R O L L A R I U M.

Ex poſteriori hujus theorematis parte efficitur, quam-
libet reftam lineam eſſe mediam proportionalem inter
quaſvis alias duas reftas, quæ comprehendunt reftangu-
lum quadrato illius æquale. Ex eo enim quod reftæ
AB, BC, comprehendunt reftangulum æquale quadrato
reftæ EF, oſtenſum fuit, eſſe ut AB, ad EF, ita EF,
ad BC. Quare EF, media eſt proportionalis inter AB,
& BC.

P R O B L. 6. P R O P O S. 18. *xix.*

A data refta linea dato reftilineo ſimile,
ſimiliterque poſitum reftilineum deſcribere.

SIt data refta AB, ſuper quam deſcribendum *TAB.*
ſit reftilineum reftilineo CDEFG, ſimile ſi- *XXIII.*
militerque poſitum. Ducantur ex quolibet an- *fig. 14.*
gulo, ut ex F, ad ſingulos angulos oppoſitos
reftæ lineæ, quæ reftilineum reſolvant in trian-
gula CDF, DEF, FGC. Deinde angulo DCF,
æqualis fiat angulus BAI; & angulo CDF,
angulus ABI; cocantque reftæ AI, BI, in
puncto I; (coibunt enim omnino, propterea quod
duo anguli IAB, IBA, duobus reftis minores
ſunt

sunt, cum æquales sint duobus angulis FCD, *a* qui duobus rectis sunt minores) *a* 17. primi FDC, *a* qui duobus rectis sunt minores) *b* 32. primi *b* eritque reliquo angulo CFD, reliquus angulus AIB, æqualis; totumque triangulum AIB, toti triangulo CFD, æquiangulum. Rursus angulo FDE, æqualis fiat angulus IBH; & angulo DFE, angulus BIH. Et *c* quia duo anguli EDF, EFD, minores sunt duobus rectis; erunt quoque duo anguli HBI, HIB, duobus rectis minores; ac proinde rectæ BH, IH, coibunt. Coeant ergo in puncto H; eritque eadem ratione triangulum BHI, triangulo DEF, æquiangulum. Præterea angulo CFG, fiat æqualis angulus AIK; & angulo FCG, angulus IAK: *d* Et quia duo anguli GCF, GFC, minores sunt duobus rectis: erunt & duo anguli KAI, KIA, duobus rectis minores; atque idcirco rectæ AK, IK, convenient in aliquo puncto. Conveniant ergo in K: eritque triangulum quoque AKI, triangulo CGF, æquiangulum. Atque ita procedatur, donec absolvantur omnia triangula rectilinei propositi, si plura extiterint. Dico igitur, rectilineum ABHIK, rectilineo CDEFG, simile esse, similiterque positum. Cum enim angulus IAB, constitutus sit æqualis angulo FCD; & angulus IAK, angulo FCG; erit totus angulus BAK, toti angulo DCG, æqualis: Eademque ratione angulus ABH, angulo CDE, æqualis erit, & reliqui reliquis, ut constat ex constructione; cum singulæ partes unius singulis partibus alterius factæ sint æquales. Quare æquiangulum erit rectilineum ABHIK, rectilineo CDEFG. Quoniam vero *e* ita est AB, ad BI, ut CD, ad DF: & ita BI, ad BH, ut DF, ad DE: ferit ex æquo ita AB, ad BH, ut CD, ad DE. Quare latera circa æquales angulos ABH, CDE, proportionalia sunt, *g* quemadmodum & latera circa æquales angulos H, & E, proportionalia sunt, ob triangula æquiangula BHI, DEF. *b* Rursus ita est HI, ad IB, ut EF, ad FD, & ita IB, ad IA, ut FD, ad FC: *i* 22. quinti: & ita IA, ad IK, ut FC, ad FG. *i* Igitur
 ex

ex æquo erit ita HI, ad IK, ut EF, ad FG, & ideo latera quoque circa æquales angulos HIK, EFG, proportionalia erunt, & sic de cæteris. Quamobrem rectilinea, cum sint æquiangula, habeantque latera circa æquales angulos proportionalia, similia sunt, similiterque descripta. A data ergo recta linea, dato rectilineo simile similiterque positum rectilineum descripsimus. Quod faciendum erat.

T H E O R . 13. P R O P O S . 19. xvij:










Similia triangula inter se sunt in duplicata ratione laterum homologorum.


Sint triangula similia ABC, DEF, habentia ^{TAB.} angulos æquales B, & E: Item C, & F, &c. ^{XXIII.}
 Et sit ut AB, ad BC, ita DE, ad EF, &c. ^{fig. 15.}
 Dico triangula inter se rationem habere duplicatam ejus, quam habent latera homologa BC, & EF, vel AB, & DE, vel AC, & DF; Hoc est; si homologis lateribus BC, EF, inveniatur tertia proportionalis BG: ita esse triangulum ABC, ad triangulum DEF, ut rectam BC, ad rectam BG: ac proinde cum ex defin. 10. lib. 5. proportio BC, ad BG, dicatur duplicata proportionis BC, ad EF: proportionem trianguli ad triangulum dici quoque duplicatam proportionis laterum homologorum BC, EF. Ita ut nihil aliud sit, triangula duo, vel duas quaslibet figuras similes, similiterque positas habere proportionem duorum laterum homologorum duplicatam, quam ita esse triangulum ad triangulum, vel figuram ad figuram, ut est prima linea ad tertiam, cum tres lineæ fuerint continue proportionales in proportione duorum laterum homologorum: quales hic sunt tres lineæ rectæ BC, EF, BG, continue proportionales in proportione homologorum laterum BC, EF. Sint ergo primum latera BC, EF, æqualia, ac proinde & tertia pro-

portionalis BG, illis æqualis: ita ut proportio BC, ad BG, quæ duplicata dicitur proportionis lateris BC, ad latus EF, sit proportio æqualitatis. Quoniam igitur triangula ABC, DEF, habent quoque proportionem æqualitatis, & quod ipsa inter se æqualia sint, ob angulos B, C, angulis E, F, æquales, & æqualitatem laterum BC, EF, quibus adjacent: erit triangulum ad triangulum, ut recta BC, ad rectam BG. Cum ergo hæc proportio dicatur duplicata proportionis laterum homologorum BC, EF; dicetur quoque proportio trianguli ABC, ad triangulum DEF, proportionis, quam habet latus BC, ad latus EF, duplicata. Quod etiam hinc constare potest. Quoniam, ut dictum est, triangula ABC, DEF, æqualia sunt, hoc est, proportionem æqualitatis habent, sicut & latera homologa BC, EF: proportio autem æqualitatis duplicata solum efficit proportionem æqualitatis: (Positis enim tribus magnitudinibus æqualibus, dicitur prima ad tertiam habere proportionem duplicatam proportionis, quam habet prima ad secundam, ut constat ex defin. 10. lib. 5. cum tamen prima ad tertiam habeat proportionem æqualitatis, sicuti & prima ad secundam,) habebit triangulum ABC, ad triangulum DEF, proportionem duplicatam ejus, quam habet latus BC, ad latus EF. Quod est propositum.

TAB. Sit deinde BC, latus latere EF, majus; & ex
XXIV. BC, abscindatur rectis BC, EF, tertia propor-
fig. 1. tionalis BG, ducaturque recta AG. Quia igitur
b 11. sext. est ut AB, ad BC, ita DE, ad EF; erit permu-
 tando ut AB, ad DE, ita BC, ad EF: Ut autem
c 11. quint. BC, ad EF, ita est per constructionem EF, ad
 BG. Ut ergo AB, ad DE, ita erit EF, ad
 BG. Quare cum triangula ABG, DEF, habe-
 ant latera circa angulos B, E, æquales recipro-
d 15. sext. ca, ipsa inter se æqualia erunt; & propterea ut
e 7. quint. triangulum ABC, ad triangulum DEF, ita erit
 idem triangulum ABC, ad triangulum ABG.
 Ut autem triangulum ABC, ad triangulum ABG,
 ejusdem

TAB. XXIII.





ejusdem altitudinis, fita est basis BC, ad basin f *fig. 1.*
 BG. Igitur ut triangulum ABC, ad triangulum
 DEF, ita est BC, ad BG. Atqui cum tres lineæ
 BC, EF, BG, sint continue proportionales, pro-
 portio primæ BC, ad tertiam BG, duplicata di-
 citur proportionis BC, primæ ad EF, secundam.
 Igitur & triangulum ABC, ad triangulum DEF,
 proportionem habet duplicatam proportionis late-
 ris BC, ad latus EF. Similia igitur triangula
 inter se sunt, &c. Quod erat demonst-
 randum.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, si tres rectæ lineæ proportio-
 nes fuerint; ut est prima ad tertiam, ita esse triangulum
 super primam descriptum ad triangulum supra secundam
 simile similiterque descriptum.

Sint enim tres rectæ proportionales A, B, C; & *TAB;*
 super primam A, & secundam B, constituta triangula *XXIV.*
 A, & B, similia, similiterque descripta. Dico, ut est *fig. 2.*
 recta A, prima ad rectam C, tertiam, ita esse triangu-
 lum A, ad triangulum B. Nam proportio rectæ A,
 ad rectam C, est, per definitionem 10. lib. 5. du-
 plicata proportionis rectæ A, ad rectam B. *g* Cum
 igitur triangulum A, ad triangulum B, habeat quoque *g 19. fig. 1.*
 proportionem duplicatam rectæ A, ad rectam B; erit
 ut recta A, ad rectam C, ita triangulum A, ad trian-
 gulum B.

Eodem modo ostendes, ita esse triangulum supra se-
 cundam ad triangulum supra tertiam simile similiterque
 descriptum, ut est prima linea ad tertiam. Sint enim
 proportionales tres C, B, A, & super B, secundam,
 & A, tertiam constituantur triangula similia similiter-
 que posita B, & A. Dico, ut est, recta C, ad rectam
 A, ita esse triangulum B, ad triangulum A. Nam
 proportio C, ad A, duplicata est proportionis C, ad B,
 hoc est, rectæ B, ad rectam A. *h* Cum igitur & tri- *h 19. fig. 1.*
 angulum B, ad triangulum A, habeat proportionem
 duplicatam rectæ B, ad rectam A, quoniam B, & A,
 sunt latera homologa: Erit ut C, recta ad rectam A,
 ita triangulum B, ad triangulum A.

xvñ. THEOR. 14. PROPOS. 20.

Similia polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis: Et polygona duplicatam habent eam inter se rationem, quam latus homologum ad homologum latus.

TAB XXIV.
fig. 3. Sint polygona similia ABCDE, FGHK, habentia angulos æquales BAE, GFK; Item angulos B, G, & sic deinceps: habeant autem latera proportionalia circa angulos æquales; ut quidem AB, ad BC, ita FG, ad GH; & ut BC, ad CD, ita GH, ad HI, &c. Dico primum, hæc polygona dividi in triangula similia, quæ sint numero æqualia. Ab angulis enim BAE, GFK, rectæ educantur ad singulos angulos oppositos, quæ sint AC, AD, FH, FI; divisaque erunt polygona in triangula numero æqualia. Quoniam vero angulus B, æqualis est angulo G, ex hypothesi, & circa ipsos latera proportionalia; *a* æquiangula erunt triangula ABC, FGH, habentia angulos BAC, GFH, æquales; Item angulos ACB, FHG, lateribus homologis oppositos: *b* Ideoque latera habebunt circa æquos angulos proportionalia. ac propterea inter se similia erunt. Eadem ratione erunt similia triangula AED, FKI, habentia angulos EAD, KFI, & angulos ADE, FIK, æquales. Deinde *c* quia est ut AC, ad CB, ita FH, ad HG, ob similitudinem triangulorum ABC, FGH; ut autem CB, ad CD, ita est, ex hypothesi, HG, ad HI, ob similitudinem polygonorum: *d* erit ex æquo ut AC, ad CD, ita FH, ad HI. Et quoniam angulus BCD, æqualis ponitur angulo GHI; est autem & ablatu ACB, ostensus æqualis ablato FHG; erit & reliquus ACD, reliquo FHI, æqualis, *e* Quare triangula ACD, FHI, cum habeant

beant latera circa æquales angulos ACD , FHI , proportionalia, æquangula erunt, ideoque similia. Eademque ratio est de aliis omnibus triangulis, si plura fuerint.

Dico præterea, triangula hæc esse homologa totis polygonis, hoc est, ita esse quodlibet triangulum in uno polygono ad suum correspondens triangulum in altero polygono, ut polygonum ad polygonum. Quoniam enim similia sunt triangula ABC , FGH , erit eorum proportio duplicata proportionis homologorum laterum AC , FH . g 19. sext. Atque eodem argumento proportio triangulorum ACD , FHI , duplicata erit proportionis eorundem laterum homologorum AC , FH . Quare ut triangulum ABC , ad triangulum FGH , ita erit triangulum ACD , ad triangulum FHI , cum utraque hæc proportio triangulorum sit duplicata ejusdem proportionis lateris AC , ad latus FH . Neque dissimili ratione concludetur quoque esse triangulum ADE , ad triangulum FIK , ut ACD , ad FHI : Atque ita deinceps, si plura fuerint triangula. Sunt igitur proportionalia triangula unius polygones cum triangulis alterius, ita ut triangula unius sint antecedentia, & triangula alterius consequentia proportionum. Ut autem unum antecedens ad unum consequens fita sunt f 12. quint. omnia antecedentia ad omnia consequentia. Igitur ut quodlibet triangulum unius polygones ad sibi respondens triangulum alterius, ita erit totum polygonum ad totum polygonum; ideoque triangula homologa erunt totis polygonis.

Dico postremo, polygones inter se proportionem habere duplicatam ejus, quam habent latera homologa, hoc est, si homologis lateribus, verbi gratia, AB , FG , inveniatur tertia linea proportionalis, ita esse polygonum $ABCDE$, ad polygonum $FGHIK$, ut est prima linea AB , ad tertiam inventam: ac proinde, cum proportio AB , ad illam tertiam, dicatur duplicata proportionis AB , ad FG , dici quoque proportionem poly-

252 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

polygoni ad polygonum duplicatam proportionis laterum homologorum AB, FG. Cum enim sit, ut triangulum ABC, ad triangulum FGH, ita polygonum ABCDE, ad polygonum FGHK; Triangulum vero ABC, ad triangulum FGH, *g* habeat proportionem duplicatam ejus, quam habent latera homologa AB, FG, hoc est eandem, quam habet AB, ad illam tertiam inventam; habebunt quoque polygona inter se proportionem duplicatam proportionis eorundem laterum homologorum AB, FG, hoc est, eandem, quam habet AB, ad illam tertiam inventam. Itaque similia polygona in similia triangula dividuntur, &c. Quod demonstrandum est.

C O R O L L A R I U M.

Hinc manifestum est, si fuerint tres rectæ proportionales, ut est prima ad tertiam, ita esse polygonum super primam descriptum, ad polygonum super secundam similitè similitèque descriptum: Vel ita esse polygonum super secundam descriptum ad polygonum super tertiam simile similitèque descriptum; uti si A, B, & C, sint tres proportionales, atque super A, & B, describantur duo polygona similia, uti sunt quadrata A, & B, erit A, ad C, ut quadratum super A, ad quadratum super B.

TAB.
XXIV.
fig. 4.

Hoc non aliter demonstrabitur ex hoc theoremate, quam ostensum fuit corollarium præcedentis theorematum ex suo theoremate. Ut perspicuum est in hac figura.

XX. T H E O R. 15. P R O P O S. 21.

Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se sunt similia.

TAB.
XXIV.
fig. 5. SInt rectilinea ABC, DEF, rectilineo GHI, similia. Dico & ipsa inter se esse similia. Cum enim propter similitudinem, anguli rectilinei ABC, æquales sint angulis rectilinei GHI;
Item

Item eadem de causa anguli rectilinei DEF, æquales angulis ejusdem rectilinei GHI; *a* erunt anguli rectilinei ABC, æquales angulis rectilinei DEF. Rursus cum ob eandem similitudinem, latera rectilinei ABC, proportionalia sint lateribus rectilinei GHI, ea videlicet iis, quæ circum æquales sunt angulos: Item eandem ob causam, latera rectilinei DEF, proportionalia lateribus ejusdem rectilinei GHI; *b* erunt quoque latera rectilinei ABC, lateribus rectilinei DEF, proportionalia, ea nimirum iis, quæ angulos ambiunt æquales. Atque adeo per definitionem primam hujus, similia existent rectilinea ABC, DEF. Quæ igitur eidem rectilineo sunt similia, & inter se sunt similia. Quod erat ostendendum.

THEOR. 16. PROPOS. 22. *xxi.*

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint: Et ab eis rectilinea similia similiterque descripta, proportionalia erunt. Et si à rectis lineis similia similiterque descripta rectilinea, proportionalia fuerint: ipsæ etiam rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint primum quatuor rectæ AB, CD, EF, GH, proportionales, ut quidem AB, ad CD, ita EF, ad GH; Constituaturque super AB, CD, duo quæcunque rectilinea similia similiterque descripta ABI, CDK; Item super EF, GH, alia duo quæcunque rectilinea similia similiterque descripta, EFML, GHON. Dico & hæc rectilinea esse proportionalia, ut quidem ABI, ad CDK, ita EM, ad GO. *a* Inventatur enim rectis AB, CD, tertia proportionalis P; & rectis EF, GH, tertia proportionalis Q. *b* eritque ex æquo, ut AB, ad P, ita EF, ad Q: Ut autem AB, ad P, ita est rectilineum ABI, ad rectilineum CDK; simile similiterque descriptum, ex coroll. propof.

20. hujus lib. vel si fuerint triangula, ex coroll. propof. 19. Et eadem ratione, ut EF , ad Q ,
 e 11. quins. ita rectilineum EM , ad rectilineum GO . ϵ Igitur
 ut ABI , ad CDK , ita erit EM , ad GO . Quod
 est propofitum.

Deinde fint ABI , CDK , EM , GO , rectilinea
 proportionalia. Dico quatuor rectas AB , CD ,
 EF , GH , esse quoque proportionales, ut quidem
 d 12. sext. AB , ad CD , ita EF , ad GH . δ Inveniatur
 enim tribus rectis AB , CD , EF , quarta propor-
 tionalis RS , super quam describatur rectilineum
 $RSVT$, fimile rectilineo EM , fimiliterque pofitum;
 e 21. sext. ϵ & ob id rectilineo GO . Quoniam igitur
 est, ut AB , ad CD , ita EF , ad RS ; erit quoque
 ut jam est ostenfum, ut ABI , ad CDK ,
 ita EM , ad RV . Ut autem ABI , ad CDK ,
 f 11. quins. ita quoque ponitur EM , ad GO . ζ Igitur erit
 g 9. quins. ut EM , ad RV , ita EM , ad GO ; ζ Atque idcirco
 æqualia erunt RV , GO . Quæ cum fint
 fimilia fimiliterque pofita, confistent neceffario,
 ut mox ostendemus super rectas RS , GH , æ-
 h 7. quins. quales. b Quare erit ut EF , ad RS , ita EF , ad
 GH . Ponitur autem EF , ad RS , ut AB , ad
 i 11. quins. CD . δ Igitur erit quoque ut AB , ad CD , ita
 EF , ad GH . Quamobrem si quatuor rectæ li-
 neæ proportionales fuerint, &c. Quod erat de-
 monftrandum.

L E M M A.

QUod autem equalia rectilinea fimilia fimiliterque
 defcripta, qualia sunt GO , RV , confiftant
 super rectas æquales, ita ostendetur. Si enim ina-
 quales sunt GH , RS ; fit GH , major. Cum
 igitur, ob fimilitudinem rectilineorum, fit ut GH ,
 ad HO , ita RS , ad SV , ponatur autem GH ,
 major quam RS , erit quoque HO , major quam
 SV , & propterea rectilineum GO , majus rectilineo
 RV , cum hoc intra ipsum poffit confitui; quod est
 ob-

absurdum, cum sit contra hypothesin. Non ergo inaequales sunt rectae GH, RS. Quod est propositum.

Aliter. Sint duo rectilinea ABC, DEF, ^{TAB. XXIV.} & similia similiterque posita. Dico latera homologa, cujuscumodi sunt rectae AB, DE, esse aequalia. Si enim non credantur aequalia, sit AB, majus, quam, DE, inveniaturrectis AB, DE, tertia proportionalis G. Quoniam ergo est, ut AB, ad DE, ita DE, ad G. Est autem AB, major, quam DE. Erit quoque DE, major, quam G, ac propterea multo major AB, quam G. Ut vero AB, ad G, ita est rectilineum ABC, ad rectilineum DEF, per coroll. propos. 19. vel 20. hujus lib. Igitur cum AB, major sit, quam G, erit quoque rectilineum ABC, majus rectilineo DEF, quod est absurdum, cum positum sit aequale. Non ergo major est AB, recta quam recta DE. Sed neque minor erit eadem ratione; quia & rectilineum ABC, minus ostenderetur rectilineo DEF, quod est contra hypothesin. Quare aequales sunt rectae AB, DE.

THEOR. 17. PROPOS. 23. ^{XXIV.}

Æquiangula parallelogramma inter se rationem habent eam, quæ ex lateribus componitur.

Sint parallelogramma æquiangula AC, CF, habentia angulos BCD, ECG, æquales. Dico ^{TAB. XXIV.} proportionem eorum esse compositam ex duabus ^{fig. 8.} proportionibus, quas habent duo latera unius circa angulum æqualem, ad duo latera alterius circa angulum æqualem, ita ut antecedentia proportionum sint in uno Parallelogrammo, & consequen-

quentia in altero; hoc est, proportionem AC ,
 parallelogrammi ad parallelogrammum CF , com-
 positam esse ex proportionibus rectæ BC , ad
 CG , rectam, & rectæ DC , ad rectam CE ; Vel
 etiam ex proportionibus rectæ BC , ad rectam
 CE , & rectæ DC , ad rectam CG . Id est, si
 sumantur tres lineæ I , K , L , ita ut I , ad K ,
 sit, sicut BC , latus ad latus CG , & K , ad L ,
 ut latus DC , ad latus CE ; ita esse parallelo-
 grammum AC , ad parallelogrammum CF , ut
 est recta I , ad rectam L : ac proinde cum ex
 defin. 5. hujus lib. proportio I , ad L , componi
 dicatur ex proportionibus I , ad K , & K , ad
 L ; proportionem quoque parallelogrammi AC ,
 ad parallelogrammum CF , dici compositam esse
 ex eisdem proportionibus; hoc est, ex proportio-
 nibus BC , ad CG , & DC , ad CE . Conjun-
 gantur enim parallelogramma ad angulos æqua-
 les, ita ut BC , CG , efficiant unam lineam re-
 ctam: Quo posito, cum anguli BCD , ECG ,
 sint æquales, erunt & DC , CE , una recta linea,
 ut ad propof. 15. lib. 1. ex Proclo demonstravi-
 mus. Producantur deinde AD , FG , donec
 conveniant in H ; Sumptaque recta I , quacun-
 que, *a* inveniatur tribus BC , CG , & I , quarta
 proportionalis K : Item tribus DC , CE , & K ,
 quarta proportionalis L . Quoniam igitur est,
b ut BC , ad CG , ita AC , ad CH . Ut autem
c ut BC , ad CG , ita posita est I , ad K , erit quo-
 que ut AC , ad CH , ita I , ad K . Eodemque
 argumento ostendes esse, ut HC , ad CF , ita K ,
d ad L . Nam ut DC , ad CE , ita est HC , ad
 CF . Cum ergo posita sit K , ad L , ut DC , ad
 CE , erit quoque HC , ad CF , ut K , ad L :
e Ex æquo igitur erit, ut AC , ad CF , ita I , ad
 L . Sed proportio I , ad L , per 5. defin. hujus
 lib. componitur ex proportionibus BC , ad CG ;
 & DC , ad CE . Ex his eisdem ergo proportio-
 nibus componetur quoque proportio parallelo-
 grammi AC , ad parallelogrammum CF . Ea-
 demque ratione ostendemus, proportionem AC ,
 ad

ad CF, componi ex proportionibus BC, ad CE, & DC, ad CG, dummodo parallelogramma ita conjungantur ad angulos æquales, ut BC, CG, efficiant unam rectam lineam, &c. Æquiangula itaque parallelogramma inter se rationem habent, &c. Quod erat ostendendum.

T H E O R . 18. P R O P O S . 24. xxii.

In omni parallelogrammo, quæ circa diametrum sunt, parallelogramma & toti, & inter se sunt similia.

ESto parallelogrammum ABCD, in quo ducatur diameter AC, & per quodlibet ejus punctum I, ducantur duæ rectæ EF, GH, parallelæ lateribus parallelogrammi. Dico parallelogramma EG, FH, circa diametrum, similia esse & toti parallelogrammo & inter sese. Quod enim æquiangula sint toti, facile ostendetur. Nam angulus GAE, idem est, qui angulus BAD; & angulus externus AEI, æqualis interno ADC; & angulus AGI, externus interno ABC, & angulus EIG, externus interno BFI; & hic externus interno BCD. Quare æquiangulum est EG, parallelogrammum parallelogrammo BD: Et eadem ratione eidem BD, æquiangulum erit FH. Quod autem latera circa æquales angulos habeant proportionalia lateribus totius, hoc modo demonstrabimus. Cum triangulum AGI, æquiangulum sit triangulo ABC, & triangulum AEI, triangulo ADC, ut perspicuum est ex 29. propos. lib. 1. vel etiam ex coroll. propos. 4. hujus lib. erit ut AB, ad BC, ita AG, ad GI, atque ita latera circa æquales angulos B, & G, proportionalia sunt. Rursus erit, ut BC, ad CA, ita GI, ad IA; Item ut CA, ad CD, ita IA, ad IE. Ex æquo igitur, ut BC, ad CD, ita est GI, ad IE, ac propterea & latera circa æquales angulos BCD, GIE, proportionalia existunt.

R

TAB.

XXIV.

fig. 9.

29. prim.

b 4. sext.

c 4. sext.

d 21. quint.

258 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

existunt. Non aliter demonstrabuntur latera circa reliquos angulos æquales esse proportionalia. Quare per definitionem primam hujus, simile erit parallelogrammum EG, toti parallelogrammo BD. Eadem arte ostendes parallelogrammum FH, simile esse eidem parallelogrammo BD; *e a 1. sext.* e atque adeo & ipsa inter se similia erunt. In omni ergo parallelogrammo, quæ circa diametrum sunt, &c. Quod erat ostendendum.

XXV. P R O B L. 7. P R O P O S. 25.

Dato rectilineo simile similiterque positum, & alteri dato æquale idem constituere.

TAB. **S**int data duò rectilinea A, & B; sitque con-
XXV. stituendum aliud rectilineum, quod simile
fig. 1. quidem sit ipsi A, æquale vero ipsi B. Super
 CD, unum latus rectilinei, cui simile debet con-
a 44. vel stitui, a constituatur parallelogrammum CE, in quo-
45. primi vis angulo, æquale rectilineo A; Et super rectam
 DE, in angulo EDG, qui æqualis sit angulo
 DCF, parallelogrammum DH, æquale ipsi B, eritque
 tam CDG, quam FEH, linea una recta, ut demon-
b 13. sext. stratum est propof. 45. lib. 1. *b* Inveniatur jam
 inter rectas CD, DG, media proportionalis IK,
c 18. sext. c super quam constituatur rectilineum L, simile
 ipsi A, similiterque positum. Dico L, æquale
 esse alteri rectilineo B. Cum enim sint propor-
 tionales tres rectæ CD, IK, DG; erit per cor-
 roll. propof. 19. vel 20. hujus lib. ut CD, pri-
 ma ad DG, tertiam, ita A, rectilineum super
 primam CD, ad rectilineum L, super IK, se-
 cundam simile similiterque descriptum: d Ut au-
 tem CD, ad DG, ita est parallelogrammum CE,
 ad parallelogrammum DH, ejusdem altitudinis.
d 1. sext. e Igitur erit ut CE, ad DH, ita A, ad L.
e 11. quint. f Ut autem CE, ad DH, ita est A, ad B: propterea
f 7. quint. quod parallelogrammum CE, rectilineo A, &
 paral-

TAB. XXIV.

Fig. 2.




Fig. 4.








Fig. 9.



parallelogrammum DH, rectilineo B, constructum est æquale. *g* Quare erit ut A, ad B, ita A, ad L; *b* proptereaque æqualia erunt rectilinea B, & L: Est autem & L, simile ipsi A, similiterque positum per constructionem. Dato igitur rectilineo simile similiterque positum, & alteri dato æquale idem constituimus. Quod erat faciendum.

THEOR. 19. PROPOS. 26. xxij;

Si à parallelogrammo parallelogrammum ablatum sit, & simile toti, & similiter positum, communem cum eo habens angulum; hoc circum eandem cum toto diametrum consistit.

EX parallelogrammo BD, abscissum sit parallelogrammum EG, simile ei similiterque positum, habens cum ipso angulum communem EAG. Dico EG, consistere circa diametrum totius BD. Ducantur enim rectæ AF, CF, quæ si fuerint una linea recta, perspicuum est, cum AF, sit diameter ipsius EG, & AC, diameter ipsius BD, parallelogrammum EG, consistere circa diametrum AFC, totius parallelogrammi. Quod si AF, CF, non dicantur efficere lineam rectam, ducatur totius parallelogrammi diameter AC, secans latus EF, in H, puncto, per quod ipsi FG, parallela agatur HI. Quoniam igitur parallelogramma BD, EI, sunt circa eandem diametrum AHC; *a* ipsa erunt similia similiterque posita. *b* Quare erit ut BA, ad AD, ita EA, ad AI. Sed ut BA, ad AD, ita quoque est EA, ad AG, quod parallelogramma BD, EG, ponantur etiam similia, similiterque posita. Igitur erit ut EA, ad AI, ita EA, ad AG, propterea æquales erunt rectæ, AI, & AG, pars, & totum: quod est absurdum.

R 2

Quod

TAB.
XXV.
fig. 2.

a 24. sect.
b 1. def.
sect.
c 11. quint.
d Ac 09. quæst.

TAB. Quod si dicatur recta AHC, secare alterum
XXV. latus FG. Tunc ducta HI, parallela ipsi EF,
fig. 3. erunt rursus similia parallelogramma BD, IG,
e 24. sext. similiterque posita. *f* Quare erit ut DA, ad AB,
f 1. def. ita GA, ad AI: Sed ut DA, ad AB, ita quo-
sext. que est GA, ad AE, ob similitudinem parallelo-
g 11. quint. grammorum BD, EG. *g* Igitur erit ut GA, ad
h 9. quint. AI, ita GA, ad AE, hideoque æquales erunt
 rectæ AI, AE, pars & totum: Quod est absur-
 dum. Constituunt ergo rectæ AF, FC, unam
 rectam lineam; hoc est, ducta diameter AC,
 transit per punctum F; & ducta diameter AF,
 eaque producta cadit in punctum C. Itaque si à
 parallelogrammo parallelogrammum ablatum sit,
 &c. Quod erat demonstrandum.

xxvi. THEOR. 20. PROPOS. 27.

Omniū parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum, deficientiumque figuris parallelogrammis similibus similiterque positis ei, quod à dimidia describitur; maximum, id est, quod ad dimidiam applicatur, parallelogrammum simile existens defectui.

TAB. **D**Etur recta AB, divisa bifariam in C, super-
XXV. que ejus dimidiam BC, constituatur quod-
fig. 4. cunque parallelogrammum CDEB, cujus diame-
 ter BD. Si igitur compleatur totum parallelo-
 grammum ABEH, erit parallelogrammum AD,
 super dimidiam AC, consistens, applicatum se-
 cundum AB, deficiens parallelogrammo CE, &
 existens simile defectui CE. Dico parallelogram-
 mum AD, ad dimidiam AC, applicatum defi-
 cientsque parallelogrammo CE, maximum esse
 omnium, quæ secundum AB, rectam applican-
 tur, deficientque parallelogrammis similibus si-
 militerque positis ipsi CE. Sumpto enim puncto
 G, utcunque in diametro BD, & ductis per G,
 rectis

rectis FGI, KG, quæ sint parallelæ rectis AB, BE; erit parallelogrammum FK, secundum rectam AB, applicatum, deficiens parallelogrammo KI, a quod ipsi CE, simile est, similiterque positum, cum sit circa eandem cum CE, diæmetrum. *b* Quoniam vero complementa CG, GE, æqualia sunt; si addatur commune KI, erunt quoque æqualia CI, KE: Est autem CI, æquale ipsi CF, propter bases æquales AC, CB. Igitur & CF, KE, æqualia erunt; additaque communi CG, æqualia erunt parallelogrammum AG, & gnomon LM. Quare cum CE, majus sit gnomone LM, (continet enim CE, præter gnomonem, parallelogrammum adhuc DG,) erit quoque AD, æquale existens ipsi CE, propter bases æquales AC, CB, majus quam parallelogrammum AG, eodem parallelogrammo DG. Eodemque modo ostendetur AD, majus esse omnibus parallelogrammis, quæ ita secundum rectam AB, applicantur, ut punctum G, sit inter puncta B, & D, hoc est, quæ occupant majorem lineam semisse AC, habentque minorem altitudinem, quam AD, dummodo defectus similes sint ipsi CE.

Aliter demonstrabitur AD, majus esse parallelogrammo AG, hoc modo. Parallelogramma FD, DI, sunt æqualia, cum bases HD, DE, sint æquales: Est autem DI, majus quam GE, hoc est, quam complementum CG, (quod ipsi GE, æquale est,) parallelogrammo DG. Igitur & FD, majus erit, quam CG, parallelogrammo eodem DG. Atque idcirco addito communi CF, majus erit AD, quam AG, parallelogrammum eodem DG.

Quod si punctum G, sumatur in diametro BD, producta extra parallelogrammum CE. Tunc ducta per G, recta HM, quæ sit parallela ipsi AB, occurratque rectis AK, BE, protractis in H, & M. Item ducta GF, parallela ipsi AH; erit parallelogrammum AG, applicatum secundum rectam AB, deficiens parallelogrammo FM,

262 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

g 24. sext.
 h 34. primi
 i 36. primi
 k 43. primi

 quod ipsi CE, est simile similiterque positum, cum sit circa eandem diametrum cum CE. Dico adhuc majus esse AD, ipso AG. Protracta enim CD, ad L, erunt æquales rectæ HL, LM, b cum æquales sint æqualibus AC, CB; i ideoque æqualia parallelogramma HD, DM. k Cum igitur DM, sit æquale complemento DF; erit & HD, æquale ipsi DF. Est autem HD, majus quam HI, parallelogrammo IL. Quare & DF, majus erit quam HI, eodem parallelogrammo IL. Ac propterea communi addito AI, majus erit AD, quam AG, eodem parallelogrammo IL. Iisdem argumentis concludes AD, majus esse quocunque parallelogrammo ita applicato secundum rectam AB, ut punctum G, sit ultra D, in diametro BD, producta; hoc est, quod occupat minorem lineam semisse AC, habetque majorem altitudinem, quam AD: dummodo defectus similis existat parallelogrammo CE. Itaque omnium parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum, &c. Quod erat demonstrandum.

xxvij.

P R O B L. 8. P R O P O S. 28.

Ad datam lineam rectam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri parallelogrammo dato. Oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non majus esse eo, quod ad dimidiam applicatur, cum similes fuerint defectus, & ejus, quod ad dimidiam applicatur, & ejus, cui simile deesse debet.

TAB.
 XXV.
 fig. 6.

AD datam rectam lineam AB, dato rectilineo C, applicandum sit parallelogrammum æquale, deficiens parallelogrammo quod sit simile dato alteri parallelogrammo D: Secta AB, bifariam

riam in E, super medietatem EB, describatur a 18. *sect.*
 parallelogrammum EFGB, simile ipsi D, simili-
 terque positum; & compleatur totum parallelo-
 grammum AHGB. Si igitur AF, æquale est
 ipsi C; cum sit applicatum ad AB, deficiens
 parallelogrammo EG, simile ipsi D, factum erit,
 quod jubetur. Si autem AF, majus est quam
 C. (Neque enim minus esse debet. Nam cum
 per propof. præcedentem, ipsum sit omnium ap-
 plicatorum maximum, dummodo defectus sint
 similes, non posset applicari ullum ad AB, quod
 esset ipsi C, æquale, sed omnia essent minora.
 Propterea adjunxit Euclides; Oportet autem dar-
 tum rectilineum, &c.) erit quoque sibi æquale
 EG, majus quam C. Sit igitur majus rectilineo
 I. (Qua vero ratione excessus duorum rectilineo-
 rum sit inquirendus, docuimus ad propof. 45.
 lib. 1.) & constituatur parallelogrammum b 25. *sect.*
 KLMN, simile quidem similiterque positum ipsi
 D, seu ipsi EG, æquale vero excessui invento
 I; ut sit EG, æquale rectilineo C, & parallelo-
 grammu KM, simul; & ob id majus quam KM.
 Cum igitur ob similitudinem sit ut EF, ad FG,
 ita NK, ad KL; erunt quoque latera EF, FG,
 majora lateribus NK, KL. Si enim his illa fo-
 rent æqualia, vel minora, esset etiam EG, æ-
 quale ipsi NL, vel minus, ut constat. Quare
 abscissis rectis FO, FQ, quæ sint æquales ipsis
 KN, KL, & completo parallelogrammo FQPO,
 erit hoc ipsi LN, æquale, & eidem simile simili-
 terque positum, & propterea ipsi EG: atque c 26. *sect.*
 adeo circa eandem diametrum cum EG, con-
 sistet, quæ sit BF, productis jam rectis QP, OP,
 erit parallelogrammum AP, ad rectam AB, ap-
 plicatum deficiens parallelogrammo PB, d quod d 24. *sect.*
 simile est ipsi EG, similiterque positum, & prop-
 terea ipsi D. Dico igitur AP, æquale esse ipsi
 C, rectilineo. Nam cum PG, æquale sit com- e 43. *primi*
 plemento PE; si addatur commune PB, erit &
 BQ, æquale ipsi ER, hoc est, ipsi ES, f quod f 36. *primi*
 æquale est ipsi ER; propter bases æquales EA,
 EB.

164 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

EB. Quare si æqualibus AO, BQ, commune addatur EP, erit AP, æquale gnomoni TV. Sed gnomon TV, æqualis est rectilineo C, (Nam cum EG, parallelogrammum æquale sit ipsi C, una cum LN, si auferantur æqualia QO, LN, remanebit gnomon TV, ipsi C, æqualis.) Igitur & AP, eidem C, æquale erit. Ad rectam ergo AB, applicatum est parallelogrammum AP, deficiens parallelogrammo PB, quod simile est dato parallelogrammo D, & æquale existens rectilineo dato C. Quod faciendum erat.

xxviii.

P R O B L. 9. P R O P O S. 29.

Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare; excedens figura parallelogramma, quæ similis sit parallelogrammo alteri dato.

TAB. XXV.
fig. 7.
a 18. sect.
b 14. sect.
c 25. sect.

AD datam rectam lineam AB, dato rectilineo C, applicandum sit Parallelogrammum æquale, excedens parallelogrammo, quod simile sit dato alteri parallelogrammo D. Divisa AB, bifariam in E; a super dimidiam EB, construatur parallelogrammum EFGB, simile ipsi D, similiterque positum. b Deinde rectilineo C, & parallelogrammo EG, constituatur quadratum H, æquale; c cui quidem fiat parallelogrammum IKLM, æquale, simile vero ipsi EG, similiterque positum; eritque propterea IKLM, majus quam EFGB, quandoquidem æquale est quadrato H, quod constructum est rectilineo C, una cum parallelogrammo EG, æquale. Cum igitur ob similitudinem MK, EG, sit ut MI, ad IK, ita EF, ad FG, erunt quoque latera MI, IK, lateribus EF, FG, majora. Si enim illa his forent æqualia, vel minora, esset quoque MK, vel æquale ipsi EG, vel minus, ut perspicuum est. Productis igitur FE, FG, ut rectæ FO, FN, æquales sint rectis IM, IK, & completo paral-

lelo.

lelogrammo ON; erit hoc simile similiterque positum ipsi EG, cum sit æquale ipsi MK, & simile, similiterque positum. Quare ON, EG, circa eandem diametrum consistent, quæ sit FP. Productis jam AB, GB, ad Q, R; & PO, donec cum AS, ipsi FO, parallela conveniat in S, erit parallelogrammum AP, applicatum ad rectam AB, excedens parallelogrammo QR, quod simile est ipsi EG, ac propterea ipsi D. Dico igitur AP, æquale esse rectilineo C. Nam cum AO, ER, sint æqualia, & ER, æquale complemento BN, erit & AO, ipsi BN, æquale. Addito ergo communi OQ, fiet AP, æquale gnomoni EPG. Atqui gnomon EPG, æqualis est rectilineo C. (Nam cum MK, hoc est, ON, æquale sit rectilineo C, una cum EG, si auferatur commune EG, remanebunt æqualia gnomon EPG, & rectilineum C.) Igitur & AP, æquale erit rectilineo C. Ad datam ergo rectam AB, dato rectilineo C, æquale parallelogrammum applicatum est AP, excedens parallelogrammo RQ, quod simile est alteri dato D. Quod faciendum erat.

PROBL. IO. PROPOS. 30. xxix.

Propositam rectam lineam terminatam extrema, ac media ratione secare.

Sit recta AB, secanda extrema ac media ratione. Descripto super eam quadrato ABCD; ad latus DA, applicetur reſtāngulum DF, æquale quadrato AC, & excedens parallelogrammo AF, simile ipsi quadrato, ita ut sit AF, quoque quadratum, cum quadrato solum quadratum sit simile. Secet autem recta EF, rectam AB, in H. Dico AB, in H, sectam esse extrema ac media ratione. Cum enim æqualia sint DF, & AC, si dematur commune AE, remanebunt æqualia GH, HC, quæ cum habeant angulos æquales AHE, BHE, utpote rectos, æcrunt latera b TAB. XXV. fig. 8. a 29. (ant.)
R 5 14. (ant.)
circa

circa illos reciproca, hoc est, erit ut EH , hoc est, ut AB , ipsi EH , æqualis, ad HF , hoc est, ad AH , ipsi HF , æqualem, ut AH , ad HB . Quare cum sit; ut tota AB , ad segmentum AH , ita segmentum AH , ad segmentum HB , facta est AB , extrema ac media ratione, per definitionem tertiam hujus. Propositam ergo rectam lineam terminatam, &c. Quod erat faciendum.

Aliter quoque ostendemus AB , esse sectam in H , extrema ac media ratione. Cum tres lineæ dentur AB , AH , HB , sitque rectangulum HC , comprehensum sub prima AB , & tertia HB , æquale quadrato mediæ AH ; erunt ipsæ proportionales: ut AB , quidem prima ad AH , secundam, ita AH , secunda ad HB , tertiam. Quare per definitionem facta est AB , in H , extrema ac media ratione.

Aliter totum problema conficiemus. *Dividatur* AB , in C , ita ut rectangulum sub tota AB , & segmento CB , æquale sit quadrato alterius segmenti AC . Dico AB , in C , esse sectam extrema ac media ratione. Erunt enim rursus, ut prius, tres lineæ AB , AC , CB , continue proportionales. Constat ergo propositum.

T H E O R. 21. P R O P O S. 31.

In rectangulis triangulis, figura quævis à latere rectum angulum subtendente descripta, æqualis est figuris, quæ priori illi similes, & similiter positæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur.

TAB. XXV. fig. 10. a 18. sect. **T**riangulum rectangulum sit ABC , habens angulum BAC , rectum; describaturque super BC , quæcunque figura rectilinea $BCDE$, ac si similes similiterque positæ super AB , AC , constituentur $ABFG$, $ACIH$. Dico figuram BD , æqualem esse duabus figuris AF , AI . Demissum enim ex A , ad BC , perpendiculari AK , erit per coroll.

coroll. propof. 8. hujus lib. ut BC, ad CA, ita CA, ad CK. Quare ut BC, ad CK, prima linea ad tertiam, ita figura BD, super primam, ad figuram CH, super secundam similem similiterque positam, per coroll. propof. 19. vel. 20. hujus lib. & convertendo ut CK, ad BC, ita figura CH, ad figuram BD. Non secus ostendetur, esse quoque ut BK, ad BC, ita figuram BG, ad figuram BD; cum tres lineæ BC, BA, BK, sint quoque proportionales, &c. Quoniam igitur est ut CK, prima quantitas ad BC, secundam, ita CH, tertia ad BD, quartam; Item ut BK, quinta quantitas ad BC, secundam, ita BG, sexta ad BD, quartam; erit ut prima CK, cum quinta BK, ad BC, secundam, ita tertia CH, cum sexta BG, ad BD, quartam: Sunt autem prima CK, & quinta BK, simul æquales secundæ BC. Igitur tertia CH, & sexta BG, simul æquales quoque erunt quartæ BD. Quod est est propositum.

Aliter. Cum triangulo ABC, simile sit tri- c 8. *sect.*
 angulum KAC, sintque homologa latera ipso-
 rum, BC, CA; (Nam est ut BC, ad CA, in
 triangulo ABC, ita CA, ad CK, in triangulo
 KAC,) & habebit triangulum KAC, ad triangu- d 19. *sect.*
 lum ABC, duplicatam proportionem ejus, quam
 habet CA, ad BC, e habet autem & figura CH, e 19. vel
 ad figuram BD, proportionem duplicatam pro- 20. *sect.*
 portionis CA, ad BC. f Quare erit ut triangulum f 11. *quint.*
 KAC, ad triangulum ABC, ita figura CH, ad
 figuram BD. Eadem ratione ostendetur esse, ut trian-
 gulum KBA, ad ABC: ita figuram BG, ad figuram
 BD. Quoniam ergo rursus est, ut KAC, prima
 quantitas ad ABC, secundam, ita CH, tertia
 ad BD, quartam; Item ut KBA, quinta ad ABC,
 secundam, ita BG, sexta ad BD, quartam; erit g 24. *quint.*
 & prima KAC, composita cum quinta KBA,
 ad secundam ABC, ut composita tertia CH,
 cum sexta BG, ad quartam BD: Sunt autem
 KAC, KBA, prima & quinta simul, æquales
 secundæ ABC. Igitur CH, BG, tertia & sexta
 simul,

simul, æquales quoque erunt quartæ BD. Quod est propositum.

Aliter. Ut quadratum rectæ AC, prima quantitas, ad quadratum rectæ BC, secundam quantitatem, ita est figura CH, tertia quantitas, ad figuram BD, quartam quantitatem; *b* cum utraque proportio sit duplicata proportionis AC, ad BC. Similiter erit ut quadratum rectæ AB, quinta quantitas, ad quadratum rectæ BC, secundam quantitatem, ita figura BG, sexta quantitas, ad figuram BD, quartam quantitatem. Quocirca erit, ut prima quantitas cum quinta, nimirum quadratum rectæ AC, cum quadrato rectæ AB, ad secundam, hoc est, ad quadratum rectæ BC, ita tertia quantitas cum sexta, nimirum figura CH, cum figura BG, ad quartam, videlicet ad figuram BD: Sunt autem quadrata rectorum AC, AB, simul æqualia quadrato rectæ BC. Igitur & figuræ CH, BG, figuræ BD, æquales erunt. Quod est propositum. In rectoribus igitur triangulis, figura quævis &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 22. PROPOS. 32.

Si duo triangula, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, secundum unum angulum composita fuerint, ita ut homologa eorum latera sint etiam parallela: tum reliqua illorum triangulorum latera in rectam lineam collocata reperientur.

TAB. XXV. **II** Abeant triangula ABC, DCE, latera AB, AC, lateribus DC, DE, proportionalia, ut quidem AB, ad AC, ita DC, ad DE, componenturque ad angulum ACD, ita ut latera homologa AB, DC, item AC, DE, inter se sint parallela. Dico duo latera reliqua BC, CE, rectam componere lineam. Cum enim parallela sint AB, DC, erit angulus A, alterno ACD, æqualis:

æqualis: Eademque ratione angulus D, eidem ACD, æqualis erit; ac propterea A, & D, inter se quoque existent æquales. Quoniam igitur triangula ABC, DCE, habent latera circa æquales angulos A, & D, proportionalia; ipsa *b. 6. sec.* erunt inter se æquiangula, habebuntque æquales angulos B, & DCE. Additis ergo æqualibus A, & ACD, æqualibus angulis B, & DCE, erunt duo anguli B, & A, duobus angulis DCE, ACD, hoc est, angulo ACE, æquales. Rursum addito communi ACB, fient tres anguli trianguli ABC, duobus angulis ACE, ACB, æquales: *c. 32. primi* Sed illi tres æquales sunt duobus rectis. Ergo & duo ACE, ACB, duobus erunt rectis æquales: *d. 14. primi* Atque idcirco BC, CE, unam rectam lineam constituent. Itaque si duo triangula, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 23. PROPOS. 33. *xxxij.*

In æqualibus circulis, anguli eandem habent rationem cum peripheriis, quibus insistant, sive ad centra, sive ad peripherias constituti insistant: Insuper vero & sectores, quippe qui ad centra consistunt.

Sint duo circuli æquales ABC, EFG, quorum *T. A. B.* centra D, H; sumanturque ex circulis duo *XXV.* arcus quicumque BC, FG, quibus ad centra quidem *fig. 12.* insistant anguli BDC, FHG; ad circumferentias vero anguli BAC, FEG. Dico esse ex sententia defin. 6. lib. 5. ut arcum BC, ad arcum FG, ita angulum BDC, ad angulum FHG, & angulum BAC, ad angulum FEG; & sectorem insuper BDC, qui rectis BD, DC, & arcu BC, continetur, ad sectorem FHG, quem comprehendunt rectæ FH, HG, & arcus FG. *¶ 1. quæst.* Ductis enim rectis BC, FG, applicentur ipsi in circulis æquales rectæ; CI, quidem ipsi BC. At

270 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

At vero GK, KL, ipsi FG: ducanturque rectæ ID, KH, LH. Quoniam igitur æquales sunt rectæ BC, CI, berunt quoque æquales arcus BC, CI, & propterea & anguli BDC, CDI, æquales erunt. Eadem ratione æquales erunt & arcus FG, GK, KL, & anguli FHG, GHK, KHL. Quam multiplex ergo est arcus BCI, ipsius arcus BC, tam multiplex erit angulus BDI, seu aggregatum angulorum prope centrum D, insistentium arcui BCI, anguli BDC: Et quam multiplex est arcus FGKL, ipsius arcus FG, tam multiplex erit angulus FHL, seu aggregatum angulorum prope centrum H, arcui FGKL, insistentium, anguli FHG, quia in tot angulos æquales divisi sunt anguli BDI, FHL, in quot arcus æquales secti sunt arcus BCI, FGKL. Quoniam vero si arcus BCI, æqualis fuerit arcui FGKL, necessario angulus BDI, angulo FHL, æqualis est: Ac proinde si arcus BCI, major fuerit arcu FGKL, necessario angulus BDI, major est angulo FHL, & si minor, minor: Deficient propterea una arcus BCI, & angulus BDI, æque multiplicia primæ magnitudinis BC, & tertiæ BDC, ab FGKL, arcu, & angulo FHL, æque multiplicibus secundæ magnitudinis FG, & quartæ FHG, vel una æqualia erunt, vel una excedent, si ea sumantur, quæ inter se respondent. Quare quæ proportio est arcus BC, primæ magnitudinis, ad arcum FG, secundam magnitudinem, ea erit anguli BDC, tertiæ magnitudinis, ad angulum FHG, quartam magnitudinem:

Atque hoc verum etiam est de spatiis circa centra, hoc est, ita erit arcus BAC, ad arcum FEG, ut spatium ad centrum D, insitens arcui BAC, ad spatium ad centrum H, insitens arcui FEG, ut ex demonstratione patet. Nam & hæc spatia, si æqualia sunt insistent æqualibus arcibus, & si inæqualia, inæqualibus, &c.

Quoniam vero ut angulus BDC, ad angulum FHG, sita est angulus BAC, ad angulum FEG,

cum

g cum illi horum sint dupli, perspicuum est, ^{gao. servit}
 h ita esse quoque angulum, BAC, ad angulum ^{hii. quint.}
 FEG, ut est arcus BC, ad arcum FG. Quod
 tamen eisdem argumentis demonstrari potest,
 quibus usi sumus in angulis ad centra constitutis,
 si prius ducantur rectæ IA, KE, LE, &c.

Quod si ad circumferentias constituti sint an-
 guli ejusmodi BAC, FEG, ut rectæ ductæ BD,
 CD; FH, GH, non constituent angulos in cen-
 tris versus arcus BMC, FG; sumenda erunt spa-
 tia BDC, FHG; quæ dupla etiam sunt angulo-
 rum ad circumferentias.











Constituatur jam in segmentis BC, CI, an-
 guli BMC, CNI, i qui æquales erunt, cum in- ^{i 27. servit}
 sistant arcibus æqualibus BAC, CBAI. Quare ^{k 24. servit}
 similia erunt segmenta BMC, CNI, k atque adeo ^{l 4. prim}
 rectas BC, CI, æquales. Additis igitur triangulis
 BDC, CDI, l quæ æqualia quoque sunt, sicut
 sectores BDC, CDI, æquales. Quapropter tam
 multiplex erit sector BDI, sectoris BDC, quam
 est multiplex arcus BCI, ipsius arcus BC. Si-
 militer ostendemus, sectorem FHL, tam multi-
 plicem esse sectoris FHG, quam multiplex est ar-
 cus FGKL, ipsius arcus FG. Quoniam vero si
 arcus BCI, æqualis fuerit arcui FGKE, sector
 quoque BDI, sectori FHL, æqualis est, (ut in
 sectoribus BDC, CDI, ostensum fuit,) & si ma-
 jor, major; & si minor, minor: Deficient prop-
 terca una arcus BCI, & sector BDI, æque multi-
 plicia primæ magnitudinis BC, & tertiæ BDC,
 ab arcu FGKL, & sectore FHL, æque multipli-
 cibus secundæ magnitudinis FG, & quartæ FHG,
 vel una æqualia erunt: vel una excedent; si ea
 sumantur, quæ inter se respondent. i Quamobrem ^{i 6. def.}
 quæ proportio est arcus BC, primæ magni- ^{quinti.}
 tudinis, ad arcum FG, secundam magnitudinem,
 ea erit sectoris BDC, tertiæ magnitudinis, ad
 sectorem FHG, quartam magnitudinem. In æ-
 qualibus ergo circulis, anguli eandem habent
 rationem cum peripheriis, &c. Quod demon-
 strandum erat. Com-

17. EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Commodius fortasse instituetur demonstratio hoc modo. Sumantur (saltem cogitatione) quotvis circuli æquales circulo ABC, atque in singulis capiantur singuli arcus arcui BC, æquales, quibus insistant anguli tam ad centra, quam ad circumferentias. Erunt enim omnes hi anguli æquales angulis BDC, BAC, ob æqualitatem arcuum, quibus insistant: ac proinde eorum aggregata ita multiplicia erunt angulorum BDC, BAC, ut est multiplex aggregatum omnium arcuum ipsius arcus BC. Deinde sumantur etiam quotvis circuli æquales circulo EFG, & in singulis accipiantur singuli arcus arcui FG, æquales, &c. Hac enim ratione vitabitur confusio linearum, & angulorum in circulis ABC, EFG, quæ necessario oritur, quando arcus BC, FG, sunt magni, & eorum multiplices accipiendi sunt, ut perspicuum est. Nam si arcus essent BCI, FGL, quibus insistant anguli BDI, FHL, ad centra, & BAI, FEL, ad circumferentias: non poterunt eorum multiplices sumi sine confusione, ut patet. Hæc autem confusio vitatur, si plures circuli æquales adhibeantur, ut diximus.

COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, sic esse sectorem ad sectorem, ut est angulus ad angulum. Utraque enim proportio eadem est proportioni arcus ad arcum. Quare & inter se eadem erunt.







EUCLIDIS ELEMENTUM UNDECIMUM.


Et solidorum primum.

Postquam Euclides in prioribus sex libris abunde de ea Geometria parte disseruit, quae circa plana versatur, sibi que nomen Geometriae tanquam proprium, usurpavit; Nunc aggreditur in hoc libro undecimo eam partem Geometriae, quae corpora, sive solida considerat, proprioque vocabulo Stereometria est appellata.

DEFINITIO. I.

Solidum est, quod longitudinem, latitudinem, & crassitudinem habet.

Explicat autem prius, more suo, voces ad eam rem pernecessarias, quarum prima est: Solidum, sive corpus: nempe tertium genus quantitatis; docet igitur eam quantitatem, quae praeter longitudinem latitudinemque sortita est crassitudinem, seu profunditatem, ita ut tres dimensiones possideat, unam quidem secundum longitudinem, aliam vero secundum latitudinem, & tertiam secundum profunditatem, seu crassitudinem, altitudinemve, appellari
S
solidum,





E U C L I D I S

E L E M E N T U M

U N D E C I M U M.

Et solidorum primum.

Postquam Euclides in prioribus sex libris abunde de ea Geometria parte disseruit, qua circa plana versatur, sibi que nomen Geometriae tanquam proprium, usurpavit; Nunc aggreditur in hoc libro undecimo eam partem Geometriae, qua corpora, sive solida considerat, proprioque vocabulo Stereometria est appellata.

D E F I N I T I O. I.

Solidum est, quod longitudinem, latitudinem, & crassitudinem habet.

Explicat autem prius, more suo, voces ad eam rem pernecessarias, quarum prima est: Solidum, sive corpus: nempe tertium genus quantitatis; docet igitur eam quantitatem, qua praeter longitudinem latitudinemque sortita est crassitudinem, seu profunditatem, ita ut tres dimensiones possideat, unam quidem secundum longitudinem, aliam vero secundum latitudinem, & tertiam secundum profunditatem, seu crassitudinem, altitudinemve, appellari

S

solidum,

Solidum, sive corpus: quemadmodum quantitas longitudinem tantum habens, linea; quæ vero longitudini latitudinem adjicit, superficies vocatur, ut in primo lib. diximus.

Porro quemadmodum Mathematici, ut recte intelligamus lineam, præcipiunt, ut imagininemur punctum aliquod è loco in locum moveri; hæc enim describit vestigium quoddam longum tantum, hoc est, lineam, propterea quod punctum omnis est magnitudinis expers; ut autem percipiamus superficiem, movent, ut intelligamus lineam aliquam in transversum moveri; hæc enim describet vestigium longum & latum duntaxat; longum quidem propter longitudinem lineæ, latum vero propter motum illum, qui in transversum est factus; carens autem profunditate, quod & lineæ illius fit expers: Ita quoque, ut nobis ob oculos ponant corpus, seu solidum, hoc est, quantitatem trina dimensione præditam, consulunt, ut concipiamus superficiem aliquam æqualiter elevari, sive in transversum moveri; hæc enim ratione describetur vestigium quoddam longum, latum, atque profundum; longum quidem & latum, ob superficiem, quæ longa & lata existit; profundum vero seu crassum, propter elevationem illam, seu motum superficiem. Hæc ergo quantitas, solidum, sive corpus vocatur.

DEFINITIO. II.

Solidi autem extremum, est superficies.

Quemadmodum linea finita in extremitatibus puncta, superficies vero lineas recipit, ut in 1. lib. docuit, ita nunc ait Solidi finiti extremum esse superficiem. Cum enim solidum, sive corpus efficiatur

ex

ex illo motu imaginario superficies, perspicuum est
extremas partes illius esse superficies.

DEFINITIO. III.

Linea recta est ad planum recta, cum
ad rectas omnes lineas, à quibus illa tangi-
tur, quæque in proposito sunt plano, rectos
angulos efficit.

UT linea recta AB , plano CD , insistsens, ita ut TAB.
XXVI.
 B , punctum sit in sublimi extra planum CD ,
at punctum A , in ipso plano, tum demum dicitur fig. 1.
recta seu perpendicularis ad planum CD , cum rectos
effecerit angulos cum lineis AE , AF , AD , AG ,
& cum omnibus aliis, qua in eodem existentes plano
ipsam tangunt in puncto A . Hac enim ratione
fiet, ut AB , equaliter insistas plano CD , & non
magis in unam partem, quam in aliam inclinet.
Nam producta recta DA , ad H , cum angulus
 BAD , ponatur rectus, erit quoque deinceps BAH ,
rectus, ideoque illi equalis. Eademque ratione pro-
tracta qualibet linea in plano CD , faciet AB , cum
illa duos angulos æquales. Ac propterea æquabiliter
ipsi plano insistet. Quod si fieri posset, ut AB ,
cum una linea ex A , in plano CD , educta non
efficeret angulum rectum, etiamsi cum aliis omnibus
rectum angulum constitueret, non diceretur AB ,
recta ad planum CD . Itaque quando conceditur
linea aliqua ad planum recta, concedendum quoque
erit, eam cum omnibus in eodem plano ductis, qua
ipsam tangunt, rectos constituere angulos. Et è
contrario, ut recte concludatur, lineam quampiam
esse ad planum datum rectam, demonstrandum erit
prius, eam cum omnibus in eodem plano ductis,
qua ipsam tangunt, rectos angulos conficere.

DEFINITIO. IV.

Planum ad planum rectum est, cum rectæ lineæ, quæ communi planorum sectioni ad rectos angulos in uno planorum ducuntur, alteri plano ad rectos sunt angulos.

TAB. XXVI.
fig. 2. **I**nsistat planum AB , plano CD , ita ut linea AQ , sit in sublimi, hoc est, extra planum subjectum CD , at EB , in ipso eodem plano. Sit autem horum planorum communis sectio EB , quæ, ut demonstrabitur propof. 3. hujus lib. recta erit linea. In hac autem sumptis punctis quocunque G , I ; ex ipsis in plano AB , ducantur GF , IH , perpendiculares ad communem sectionem EB . Si igitur linea FG , HI , ad planum alterum CD , recta fuerint, hoc est, rectos angulos effecerint cum lineis GK , GL , GM ; IN , IO , IP , & cum aliis omnibus in plano CD , à punctis G , & I , ductis; dicitur planum AB , ad planum CD , rectum; quia hoc modo non magis in unam partem inclinabit, quam in alteram, sed æquabiliter illi insistet. Si enim KG , producatetur ad R , cum angulus FGK , ponatur rectus; erit & angulus ei deinceps FGR , rectus; ideoque illi æqualis: Ea lemque ratione, protracta qualibet alia linea in plano CD , fient utrobique à lineis FG , HI , anguli æquales. Quare planum AB , æquabiliter plano CD , insistet. Quotiescunque igitur planum aliquod rectum esse conceditur ad planum aliud, concedendum quoque erit, lineas perpendiculares in uno eorum ad communem sectionem deductas, rectas quoque esse ad alterum planum. Et contra, ut colligatur planum quodpiam ad aliud esse rectum, ostendendum prius erit, lineas perpendiculares in uno eorum
ad

ad communem sectionem ductas, rectas esse ad reliquum planum.

DEFINITIO. V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio est, cum à sublimi termino rectæ illius lineæ ad planum deducta fuerit perpendicularis, atque à puncto, quod perpendicularis in ipso plano fecerit, ad propositæ illius lineæ extremum, quod in eodem est plano, altera recta linea fuerit adjuncta: est, inquam angulus acutus insistente linea, & adjuncta comprehensus.

Insistat recta AB , plano CD , non ad angulos rectos, sed inclinata, ita ut punctum B , sit extra planum in sublimi, punctum vero A , in plano. Deinde ex B , termino sublimi rectæ AB , intelligatur ad idem planum deducta perpendicularis BE , faciens in plano punctum E ; atque ab E , ad A , adjungatur recta EA ; eritque necessario angulus BAE , acutus, ac cum in triangulo ABE , duo anguli BAE , BEA , duobus sint rectis minores, & angulus BEA , rectus. Angulus igitur acutus BAE , comprehensus linea insistente AB , & adjuncta AE , dicitur inclinatio rectæ AB , ad dictum planum CD ; Ita ut tanta dicatur esse inclinatio lineæ AB , ad planum CD , quantum est dictus angulus acutus BAE . TAB. XXVI. fig. 3.

DEFINITIO. VI.

Plani ad planum inclinatio, est angulus acutus rectis lineis contentus, quæ in utroque planorum ad idem communis sectionis

punctum ductæ, rectos cum sectione angulos efficiunt.

TAB.
XXVI.
fig. 4.

PLano namque AB , insistat planum CD , ita ut pars ad C , sit in sublimi extraplanum AB , & pars ad D , in ipso plano AB , sitque CD , inclinatum ad AB ; & communis eorum sectio sit DE . Si igitur ad DE , communem sectionem ex ejus puncto F , dua perpendiculares ducantur, FG , quidem in plano AB , & FH , in plano CD ; dicetur angulus acutus GFH , dictis rectis comprehensus, inclinatio plani CD , ad planum AB , ita ut tanta esse dicatur inclinatio plani ad planum, quantum est dictus angulus acutus.

D E F I N I T I O. VII.

Planum ad planum similiter inclinatum esse dicitur, atque alterum ad alteram, cum dicti inclinationum anguli inter se fuerint æquales.

Non obscura est hac definitio, precedente bene intellecta. Unde planum ad planum magis inclinatum esse dicitur, cujus angulus inclinationis minor extiterit, atque adeo a recto magis recesserit.

D E F I N I T I O. VIII.

Parallela plana sunt, quæ inter se non conveniunt.

Intellige, in quamcunque partem, etiam infinite, producantur: hoc est, sive ad dexteram, sive ad sinistram: & sive sursum, sive deorsum, &c. Sunt enim quedam plana quæ nec ad dextram, nec ad fini-

sinistram producta conveniunt; nec tamen ob id parallela sunt dicenda, quia nimirum vel sursum, vel deorsum protracta, tandem coeunt. Nam si sumatur tectum aliquod, cujus fastigium intelligatur abscessum, remanentia duo plana non conveniunt, quamvis producantur infinite ad dexteram, & ad sinistram: Sed tamen quia sursum protensa coeunt, nimirum in ipsa fastigio, idcirco non dicuntur parallela.

Sit enim tectum quodpiam *BACEDF*, contentum TAB;
 duobus planis *ABED*, *ACFD*, cujus basis *BCFE*, XXVI.
 auferaturque fastigium *GAHKDI*. Quo facto per fig. 5.
 spisuum est, reliqua plana *GBEK*, *HCFI*, non
 convenire inter se, si ad partes *GB*, *HC*, vel ad
 partes *KE*, *IF*, producantur; nec tamen idcirco
 parallela dicuntur, cum producta ad partes *GK*, *HI*,
 conveniant in fastigio *AD*. Ut igitur plana aliqua
 dicantur parallela, necesse est, ut in nullam partem
 producta inter se conveniant.

DEFINITIO. IX.

Similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis continentur multitudine æqualibus.

DEFINITIO. X.

Æquales, & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis, multitudine, & magnitudine æqualibus continentur.

Quod si plana similia, quibus corpora similia ex præcedenti definitione circumscribuntur, fuerint equalia, singula singulis, dicuntur ejusmodi figura solida non solum similes, verum etiam æquales. Nam

si animo concipiantur sese penetrare mutuo huiusmodi solida, neutrum alterum excedet, propter equalitatem, ac similitudinem planorum.

DEFINITIO. XI.

Solidus angulus est plurium, quam duarum linearum, quæ se mutuo contingant, nec in eadem sunt superficie, ad omnes lineas inclinatio.

DUa linea in eodem existentes plano, quæ non in directum jacentes ad unum punctum conveniunt, efficiunt angulum planum, ut lib. 1. exposuimus, qualis est angulus BAC , contentus duabus lineis AB , AC , in eodem plano constitutis. Si igitur accedat tertia quadam linea AD , quæ non in eodem cum illis plano existat, sed punctum D , sit in sublimi extra illarum planum, efficietur ad punctum A , angulus solidus, sive corporeus. Idem contingeret, si quarta linea, vel quinta, vel denique plures adjungerentur, licet anguli quantitas variaretur. Dixit autem Euclides, lineas angulum solidum constituentes non debere in eadem superficie existere, quoniam videlicet, si tres lineæ AB , AC , AD , in eadem consisterent superficie, non efficeretur angulus solidus ad punctum A , sed iplanus duntaxat ex duobus planis BAD , DAC , compositus. Quod si AD , sit in sublimi, hoc est, extra planum, in quo sunt AB , AC , jam non componetur angulus planus totus ex BAD , DAC , immo circa punctum A , tres plani consistent anguli BAD , DAC , CAB , qui ut mox dicetur, saltem constituunt angulum. Idem dices, si plures fuerint lineæ, & idcirco plures quoque anguli plani.

TAB.
XXVI.
fig. 6.

EFHG: vel pentagona ABCDE, FGHK, &c. Parallelogramma vero ACFD, ABED, CBEF: vel ABFE, ADHE, CDHG, CBFG: vel ABGF, AEKF, DEKI, DCHI, BCHG; dicuntur prismata. Itaque prisma nil aliud erit, quam columna quadam laterata equalis crassitudinis, cujus bases opposita sunt aequales, similes, & parallelae, sive haec sint triangula, sive quadrangula, sive pentagona, &c. Unde tot parallelogramma continebit prisma quodlibet, quot latera, sive anguli, in uno quoque oppositorum planorum reperiuntur, ut figura indicant.

DEFINITIO. XIV.

Sphaera est, quando semicirculi manente diametro, circumductus semicirculus in se ipsum rursus revolvitur, unde moveri coeperat, circumassumpta figura.

Sicut linea recta circa alterum ejus extremum quiescens revoluta describit circulum: ita & semicirculus circa alterum ejus extremum, nempe circa diametrum, circumductus figuram describit, quam Geometra sphaeram appellant. Unde quemadmodum in circulo punctum assignatur, extremum videlicet illud quiescens, à quo omnes linea recta in peripheriam cadentes sunt aequales; propterea quod omnes aequales existunt illi linea circumvoluta: Ita quoque in sphaera punctum reperitur, nempe medium diametri quiescentis, hoc est, centrum semicirculi circumducti, à quo omnes recta cadentes in peripheriam sunt aequales; eo quod omnes sunt semidiametro distant semicirculi aequales. Quapropter ad similitudinem definitionis circuli, sphaera definiti poterit hoc etiam modo.

Sphaera

Sphæra est figura solida, una superficie comprehensa, ad quam ab uno puncto eorum, quæ intra figuram sunt posita, cadentes rectæ lineæ inter se sunt æquales.

D E F I N I T I O. XV.

Axis autem sphæræ, est quiescens illa recta linea, circum quam semicirculus convertitur.

D E F I N I T I O. XVI.

Centrum sphæræ est idem, quod & semicirculi.

D E F I N I T I O. XVII.

Diameter autem sphæræ, est recta quædam linea per centrum ducta, & utrinque à sphæræ superficie terminata.

HÆ tres definitiones non egent expositione, dummodo hoc solum notetur, omnem diametrum sphaera posse esse axem, si nimirum circum eam sphaera revolvatur. Unde quia in descriptione sphaera circa diametrum semicirculi factus est motus ipsius sphaera; propterea eam solam Euclides axem sphaera nominavit.

D E F I N I T I O. XVIII.

Conus est, quando rectanguli trianguli manente uno latere eorum, quæ circa rectum angulum, circumductum triangulum in se

se. ipsum rursus revolvitur, unde moveri cœperat, circumassumpta figura.

Atque si quiescens recta linea æqualis sit reliquæ, quæ circa rectum angulum convertitur, Orthogonius erit conus: Si vero minor, Amblygonius: Si vero major, Oxygonius.

UT si triangulum rectangulum ABC, circa latus quiescens AB, quod est circum rectum angulum, circumducatur, donec integram revolutionem expleat, describetur solida quadam figura, quæ continetur duabus superficiebus, circulari una ac plana, quam BC, latus alterum circa angulum rectum, suo motu describit: & curva alia, eaque convexa, quam latus AC, recto angulo oppositum delineat. Hac igitur figura solida, conus nuncupatur. Campanus autem pyramidem rotundam appellat.

TAB.
XXVI.
fig. 13, 14,
15.

Quod si latus quiescens AB, æquale fuerit circumducto BC, ut in figura 13. dicitur conus descriptus Orthogonius, seu rectangulus, quia videlicet angulus prope verticem A, rectus est. Cum enim latera AB, BC, ponuntur æqualia; æerunt & anguli BAC, BCA, æquales, qui cum æquivalent uni recto, eo quod ABC, rectus est, erit angulus BAC, semirectus. Eodemque modo angulus BAD, ex parte opposita semirectus erit. Quare totus angulus CAD, rectus erit. Si vero quiescens latus AB, minus fuerit circumducto BC, ut in figura 14. vocabitur descriptus conus Amblygonius, seu obtusangulus; quoniam scilicet angulus ad verticem A, obtusus existit. Cum enim BC, latus latere AB, sit majus; ßerit angulus BAC, major angulo BCA. Quare cum hi duo æquipolleant uni recto, propterea quod angulus ABC, ponitur rectus, erit BAC, semi-

a 5. primus
b 18. primus

DEFINITIO. XXIV.

Similes conī & cylindri sunt, quorum & axes, & basium diametri proportionales sunt.

Reste Euclides similitudinem conorum, atque cylindrorum ab eorum axibus, & basium diametris sumit. Diametri enim basium indicant conos & cylindros secundum duas dimensiones esse similes, longitudinem scilicet ac latitudinem; Axes vero eisdem secundum profunditatem, seu altitudinem similes esse demonstrant. Sint enim duo conī ABC , EFG ; Item duo cylindri: in conis autem axes AD , EH , & basium diametri BC , FG ; similiter & in cylindris. Itaque si fuerit, ut axis AD , ad axem EH , ita BC , diameter basis ad FG , diametrum basis, dicentur tam conī, quam cylindri similes inter se; quia videlicet hac ratione tam secundum longitudinem & latitudinem similes sunt, quam secundum profunditatem, ut diximus, nempe omnes eorum tres dimensiones proportionales sunt: Vel etiam, quia triangula ADB , EHF , ex quorum revolutione descripti sunt conī, nec non rectangula AB , EF , quorum conversiones cylindros effecerunt, hac ratione similia inter se erunt. Cum enim sit ut AD , ad EH , ita BC , ad FG ; Sit autem ut BC , ad FG , a ita dimidia BD , ad dimidiam FH : erit quoque ut AD , EH , ita DB , ad HF : & permutando ut AD , ad DB , ita EH , ad HF . Quare tam in triangulis, quam in rectangulis latera, circum aequales angulos, nempe rectos, proportionalia sunt; ac propterea & triangula, & rectangula similia inter se erunt: Triangula quidem,

TAB.
XXVI.
fig. 17, 18.

as quint.

LIBER UNDECIMUS. 289

dem, b propterea quod triangula unum angulum uni b 6. *sem*
 angulo habentia aequalem, & circum aequales angulos
 latera proportionalia, equiangula sunt, c ideoque c 5. *sem*
 latera omnia circa angulos aequales habent proportio-
 nalia, atque adeo inter se similia existunt: Rectan-
 gula vero, deo quod reliqua duo latera duobus late- d 34. *prim*
 ribus AD, DB, sunt aequalia, opposita oppositis, ac
 propterea eandem cum his proportionem habent.

DEFINITIO. XXV.

Cubus est figura solida sub sex quadra-
 tis aequalibus contenta.

DEFINITIO. XXVI.

Tetraedrum est figura solida sub quatuor
 triangulis aequalibus, & aequaliteris contenta.

DEFINITIO. XXVII.

Octaedrum est figura solida sub octo tri-
 angulis aequalibus, & aequaliteris contenta.

DEFINITIO. XXVIII.

Dodecaedrum est figura solida sub duode-
 cim pentagonis aequalibus, & aequaliteris,
 & aequiangulis contenta.

DEFINITIO. XXIX.

Icosaedrum est figura solida sub viginti
 triangulis aequalibus, & aequaliteris contenta.

Haec sunt quinque corpora, quae regularia vo-
 cantur, quod omnia plana, quibus continen-
 T 177

290 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

tur, aequalia sint, æquilatera, & æquiangula, ut ex eorum definitionibus constat. A nonnullis corpora Platonica dicuntur, propterea quod Plato in Tymæa quinque mundi corpora, quæ simplicia à Philosophis nuncupantur, nempe Cælum, Ignem, Aerem, Aquam, atque Terram, quinque hisce corporibus assimilat.

DEFINITIO. XXX.

[Parallelepipedum est figura solida sex figuris quadrilateris, quarum, quæ ex adverso, parallelæ sunt contenta.]





TAB. XXVII.
fig. 1. **V**ELUTI solida figura comprehensa sex quadrilateris *ABCD, DEFA, ABGF, FGHE, EDCH, HCBG, quarum opposita AC, FH; Item DF, CG; Item AG, DH, sunt parallela, nominantur parallelepæda, quasi parallelis planis comprehensa, quæ quidem plana parallela opposita, sunt & æqualia, & similia, & parallelogramma, ut demonstrabitur propos. 24. hujus lib.*

DEFINITIO. XXXI.

[Solida figura in solida figura dicitur inscribi, quando omnes anguli figuræ inscriptæ constituuntur vel in angulis, vel in lateribus, vel denique in planis figuræ, cui inscribitur.]

DEFINITIO. XXXII.

[Solida figura solidæ figuræ vicissim circumscribi dicitur, quando vel anguli, vel latera, vel denique plana figuræ circumscrip-



scriptæ tangunt omnes angulos figuræ, circum quam describitur.]

Non est necesse, ut anguli interioris figura constituentur in omnibus vel angulis, vel lateribus, vel planis exterioris figura, cum interdum figura exterior plures, interdum pauciores angulos contineat, vel latera, vel plana, quam interior: sed satis est, ut omnes anguli figuræ interioris tangant vel aliquot angulos, vel aliquot latera, vel denique aliquot plana exterioris figuræ; ita ut nullus angulus figuræ interioris intus relinquantur vel ab angulis, vel à lateribus, vel denique à planis figuræ exterioris.

THEOR. I. PROPOS. I. 4

Rectæ linæ pars quædam non est in subiecto plano, quædam vero in sublimi.

Sit enim, si fieri potest, rectæ linæ AB, pars quidem AC, in subiecto plano DE, pars vero CB, in sublimi, ita ut omnia puncta partis AC, in plano DE, jaceant, puncta vero omnia partis CB, supra planum DE, existant, vel infra. TAB.
XXVII.
fig. 2. Erit igitur in plano DE, ipsi AC, rectæ linæ continua quædam recta linea in directum posita, nempe CF. Quamobrem duæ rectæ AB, AF, commune habent segmentum AC. Quod est absurdum, ex pronuntiatio 10. lib. 1. Rectæ igitur linæ pars quædam non est in subiecto plano, quædam vero in sublimi. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 2. PROPOS. 2. 4

Si duæ rectæ linæ se mutuo secent, in uno sunt plano. Atque triangulum omne in uno est plano.

Rectæ linæ AB, CD, se mutuo secent in E, & in EB, ED, sumptis punctis F, & G, TAB.
XXVII.
ut-
fig. 3.

utrumque, ducatur recta FG, ut fiat triangulum EFG. Dico triangulum EFG, in uno esse plano; Item rectas AB, CD, in uno quoque plano existere. Si enim trianguli EFG, pars quædam, nimirum EHIG, in plano uno exstat, & pars quædam, nempe reliqua FHI, in sublimi, vel contra, existent quoque rectarum EF, GF, partes quidem EH, GI, in uno plano, partes vero HF, IF, in sublimi, vel contra quod fieri non posse, jam supra demonstratum est. Quod si ejusdem trianguli pars quidem EFIK, in uno plano credatur esse, pars autem GIK, in sublimi, vel contra; erunt eadem ratione rectarum EG, FG, partes quidem EK, FI, in uno plano, partes vero KG, IG, in sublimi, vel contra. Si denique ejusdem trianguli pars quidem FHKG, in uno concedatur esse plano, pars vero EHK, in sublimi, vel contra; erunt quoque rectarum FE, GE, partes quidem FH, GK, in uno plano, partes autem HE, KE, in sublimi, vel contra. Quæ omnia absurda sunt, but est demonstratum. Quare triangulum EFG, in uno plano existit; eademque est ratio in omni alio triangulo. Quia vero, in quo plano est triangulum EFG, in eodem existunt ejus latera EF, EG: In quo autem sunt rectæ EF, EG: cum eodem sunt rectæ totæ CD, AB, ne partes quædam in plano, partes vero aliæ in sublimi dicantur esse; Erunt propterea rectæ AB, CD, in uno plano, in quo nimirum triangulum EFG, consistere demonstravimus. Quocirca si duæ rectæ lineæ se mutuo secent, in uno sunt plano. Atque triangulum omne in uno est plano. Quod erat demonstrandum.

ũj. THEOR. 3. PROPOS. 3.

Si duo plana se mutuo secent, communis eorum sectio est linea recta.

TAB. SEcent se mutuo plana AB, CD, sitque communis eorum sectio EF. Dico EF, esse lineam
 XVII.
 fig. 4. neam

neam rectam. Si enim non credatur esse recta, ducatur in plano AB, recta EGF, & in plano CD, recta EHF. Rectæ igitur EGF, EHF, cum eisdem habeant terminos E, & F, superficiem includent. Quod fieri non potest, ex 14. pronunciato 1. lib. Communis ergo sectio EF, recta erit linea; Ac proinde si duo plana se mutuo secent, eorum sectio est linea recta. Quod erat ostendendum.

Aliter. Secent se rursus plana AB, CD, sintque termini sectionis communis E, & F, puncta, quæ connectantur recta EF. Si igitur recta EF, in utroque plano existit, constat propositum: Ipsa enim erit communis sectio. Si vero EF, recta in neutro eorum dicatur esse, tunc si in alterutro eorum recta ducatur EGF, concludent rursus duæ rectæ EF, EGF, superficiem, cum eisdem habeant terminos E, & F. Si denique recta EF, in altero tantum plano credatur, tunc si in altero ducatur recta EHF; includent iterum duæ rectæ EF, EHF, superficiem. Quod est absurdum. Est ergo recta EF, in utroque plano AB, CD; atque adeo communis eorum sectio est.

THEOR. 4. PROPOS. 4. iv;

Si recta linea rectis duabus lineis se mutuo secantibus, in communi sectione ad rectos angulos insistat. Illa ducto etiam per ipsas plano ad angulos rectos erit.

RECTA linea AB, insistat duabus rectis CD, EF, ad rectos angulos in communi earum sectione B. Dico rectam AB, ad angulos quoque rectos esse plano, quod per ipsas ducitur, seu in quo existunt. Cum enim se mutuo secent in B; erunt ipsæ in uno plano, quod sit CEDF. Sumantur inter se æquales rectæ BG, BH; item rectæ BI, BK; ducanturque rectæ GK, IH; &

T 3 in

TAB.
XXVII.
fig. 5.
a. b. und

in eodem plano per B, ducatur recta LM, secans rectas GK, IH, in punctis L, & M. Demittantur quoque ex A, puncto in sublimi ad idem planum rectæ AG, AL, AK, AH, AM, AI. Quoniam igitur latera BG, BK, trianguli BGK, lateribus BH, BI, trianguli BHI, ex
b 15. primi constructione sunt æqualia; *b* & anguli quoque
 ipsis contenti GBK, HBI, cum sint ad verticem
c 4. primi B, oppositi, æquales: *c* Erunt bases GK, HI,
 inter se, & anguli BKG, BIH, inter se quoque
 æquales.

d 15. primi Rursum *d* cum anguli KBL, IBM, ad verticem
 B, oppositi sint æquales; erunt duo anguli KBL,
 BKL; trianguli BKL, duobus angulis IBM,
 BIM, trianguli BIM, æquales; Sunt autem &
 latera BK, BI, quibus adjacent æqualia, ex con-
 structione. *e* Igitur & reliqua latera KL, LB,
e 16. primi reliquis lateribus IM, MB, æqualia erunt.

Præterea cum latera AB, BG, trianguli ABG,
 æqualia sint lateribus AB, BH, trianguli ABH,
 ex constructione; & anguli ipsis contenti ABG,
f 4. primi ABH, æquales, nempe recti, ex hypothesi, ierunt
 & bases AG, AH, æquales. Simili argu-
 mento æquales erunt rectæ lineæ AI, AK.

Amplius quia latera AI, IH, trianguli AIH,
 lateribus AK, KG, trianguli AKG, æqualia
 sunt; & basis AH, basi AG, ex hætenus demon-
 stratis, *g* erunt etiam anguli AIH, AKG,
g 8. primi dictis lateribus comprehensi, æquales.

Itaque cum latera AK, KL, trianguli AKL,
 æqualia sint lateribus AI, IM, trianguli AIM;
 & anguli ipsis contenti AKL, AIM, æquales
h 4. primi etiam, ut hætenus demonstravimus; *h* erunt quo-
 que bases AL, AM, æquales.

Quoniam denique latera AB, BL, trianguli
 ABL, æqualia sunt lateribus AB, BM, trian-
 guli ABM; & basis AL, basi AM, ex demon-
 stratis; *i* erunt quoque anguli ABL, ABM,
i 8. primi dictis lateribus comprehensi, æquales; qui cum
 sint deinceps, recti erunt, ex defin. 10. lib. 1.
 Quare recta AB, rectos angulos efficit cum re-
 cta

Et LM, quæ in plano subiecto ipsam tangit in B; Eademque ratione ostendetur, rectam AB, cum omnibus rectis, quæ in eodem plano ipsam tangunt in B, angulos rectos constituere, etiam si inter puncta G, I, & K, H, ductæ sint, dummodo rectæ GI, KH, jungantur; vel certæ literæ disponantur, ut prius, quemadmodum in hac figura apparet, ubi eadem sunt literæ, & tamen LM, non ducitur à sinistra in dexteram, ut in figura quinta, sed à superiori parte versus inferiorem. Quocirca recta AB, plano CEDF, quod per rectas CD, EF, ducitur, ad rectos angulos erit, ex defin. 3. hujus lib. Si recta igitur linea rectis duabus lineis se mutuo secantibus, &c. Quod demonstrandum erat.

TAB:
XXVII.
fig. 6.

THEOR. 5. PROPOS. 5. v.

Si recta linea rectis tribus lineis se mutuo tangentibus, in communi sectione ad rectos angulos insistat: Illæ tres rectæ in uno sunt plano.

Insistat recta linea AB, tribus rectis lineis BC, BD, BE, se tangentibus in B, ad rectos angulos in communi earum sectione, seu tactu B. Dico tres rectas BC, BD, BE, in uno plano esse. *a* Cum enim quælibet duæ in uno sunt plano, propterea quod productæ ad partes B, se mutuo secant in B; sint BC, BD, in plano FC; Et si fieri potest, recta BE, non ponatur in eodem plano, sed in sublimi. *b* Quoniam vero duæ rectæ AB, BE, in uno sunt plano, cum se mutuo secant in B, sint ambæ in plano AE. Et quia plana FC, AE, sibi mutuo occurrunt in B; necessario producta se mutuo secabunt. *c* Sit ergo eorum communis sectio recta BG. Quia vero recta AB, ad angulos rectos ponitur rectis BC, BD; erit propterea & plano FC, per ipsas ducto ad rectos angulos; ac proinde ad rectos

angulos erit rectæ BG, quæ ipsam in B, tangit, ex defin. 3. hujus lib. Quare recti anguli ABE, ABG, existentes in plano AG, per rectas AB, BE, ducto æquales inter se erunt, pars & totum. Quod est absurdum. Duabus igitur rectis BC, BD, in uno plano FC, existentibus, non erit BE, in sublimi, sed in eodem cum ipsis plano. Quocirca si recta linea rectis tribus lineis se mutuo tangentibus, &c. Quod erat ostendendum.

THEOR. 6. PROPOS. 6.

Si duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos sint angulos; Parallelæ erunt illæ rectæ lineæ.

TAB. **XXVII.** **fig. 8.** Sint duæ rectæ lineæ AB, CD, eidem plano EF, ad angulos rectos in punctis B, & D. Dico illas esse parallelas. Ducta enim recta BD, in plano EF, erunt anguli ABD, CDB, recti, ex defin. 3. hujus lib. Jam in eodem plano EF, ducatur DG, ad BD, perpendicularis, ponanturque æquales AB, DG. Connectantur deinde rectæ BG, GA, AD. Quoniam igitur latera AB, BD, trianguli BAD, æqualia sunt lateribus GD, DB, trianguli GDB, ex constructione; & anguli quoque ipsis contenti ABD, GDB, æquales, nempe recti; erunt bases æquales AD, GB. Rursus quia latera AB, BG, trianguli ABG, æqualia sunt lateribus GD, DA, trianguli GDA. Est autem & basis communis AG, erunt anguli ABG, GDA, æquales: Est autem ABG, rectus, ex defin. 3. hujus lib. Igitur & GDA, rectus erit. Quoniam vero ex eadem defin. angulus quoque GDC, rectus est; erit recta GD, tribus rectis DB, DA, DC, ad angulos rectos. Quare rectæ DB, DA, DC, in uno erunt plano, hoc est, CD, erit in plano per rectas DB, DA, ducto: Est autem AB, in eodem plano, in

in quo DB, DA. Recta igitur CD, in eodem erit cum AB, plano. Quocirca cum anguli interni ABD, CDB, sint recti; erunt rectæ AB, CD, parallelæ. Si duæ itaque rectæ lineæ eidem plano ad rectos sint angulos, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 7. PROPOS. 7. vij.

Si duæ sint parallelæ rectæ lineæ, in quarum utraque sumpta sint quælibet puncta: Illa linea, quæ ad hæc puncta adjungitur, in eodem est cum parallelis plano.

IN parallelis AB, CD, sumantur utcumque duos puncta E, & F, quæ recta connectantur EF. Dico rectam EF, in eodem esse plano, in quo, per definitionem parallelarum, sunt parallelæ AB, CD. Si enim recta EF, non concedatur esse in eodem plano parallelarum, sed extra, sciet jam aliud planum superficiem parallelarum per puncta E, & F, sitque communis sectio horum planorum EGF, quæ recta linea erit. Duæ igitur rectæ EF, EGF, cum habeant eisdem terminos E, & F, superficiem claudent. Quod est absurdum. Non ergo extra planum parallelarum AB, CD, erit recta EF. Quare si duæ sint parallelæ rectæ lineæ, in quarum utraque sumpta sint quælibet puncta: Illa linea, quæ ad hæc puncta adjungitur, in eodem est cum parallelis plano. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 8. PROPOS. 8. (vij.)

Si duæ sint parallelæ rectæ lineæ, quarum altera ad rectos cuidam plano sit angulos; & reliqua eidem plano ad rectos angulos erit.

Sint parallelæ rectæ AB, CD; sitque CD, plano EF, ad angulos rectos. Dico & AB, eidem plano.

T 5

XXVII. fig. 10.

298 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

eidem plano EF, esse ad rectos angulos. Ducta enim recta BD, in plano EF, erit per defn. 3. hujus lib. angulus CDB, rectus: *a* Sunt autem duo CDB, ABD, duobus rectis æquales. Igitur & ABD, rectus erit. Jam in plano EF, ducatur BG, perpendicularis ad BD; ponanturque æquales BG, CD. Coniungantur deinde rectæ DG, GC, CB. Quoniam igitur latera CD, DB, trianguli CDB, æqualia sunt lateribus GB, BD, trianguli GBD, ex constructione, & anguli quoque ipsis contenti CDB, GBD, æquales, nimirum recti: *b* Erunt bases CB, GD, æquales; Rursus quia latera CD, DG, trianguli CDG, æqualia sunt lateribus GB, BC, trianguli GBC, & basis est communis CG. *c* Erunt anguli CDG, GBC, dictis lateribus comprehensi æquales. Est autem CDG, rectus ex definitione 3. hujus lib. Igitur & GBC, rectus erit. Quare recta GB, duabus rectis BD, BC, se mutuo secantibus in B. (Si namque producerentur DB, CB, secarent sese in B, ob angulum CBD,) ad rectos angulos existit; *d* ac proinde ad rectos angulos erit plano per BD, BC, ducto: Est autem in hoc eodem plano recta AB; *e* propterea quod rectæ BD, BC, in eodem sunt plano, in quo parallelæ AB, CD; cum puncta B, C, D, existant in parallelis AB, CD. Igitur & GB, recta rectæ BA, ad rectos erit angulos ex definitione 3. hujus lib. Quare cum AB, recta sit ad rectas BG, BD; *f* erit quoque AB, recta ad planum per BG, BD, ductum, hoc est, ad planum EF. Si duæ igitur sint parallelæ rectæ lineæ, quarum altera ad rectos cuidam plano sit angulos: Et reliqua eidem plano ad rectos angulos erit. Quod erat ostendendum.

ix. THEOR. 9. PROPOS. 9.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, sed

fed non in eodem cum illa plano : Hæ quoque sunt inter fe parallelæ.

Sint rectæ AB, CD, ipsi EF, parallelæ; non
sint autem in eodem cum EF, plano. Dico
AB, CD, parallelas quoque esse. Nam à quo-
libet puncto G, rectæ EF, ad ipsam EF, ducantur
duæ perpendiculares; GH, quidem in
plano parallelarum AB, EF, at GI, in plano
parallelarum CD, EF. Quoniam igitur EG,
recta est ad duas rectas GH, GI, se tangentes
mutuo in G; erit recta quoque ad planum per
ipsas GH, GI, ductum. Quamobrem cum sint
parallelæ AB, EF, & EF, sit recta ad planum
per GH, GI, ductum; erit quoque AB, ad
idem planum recta. Similiter cum sint parallelæ
CD, EF, sit autem EF, recta ad planum per
GH, GI, ductum; erit etiam CD, recta ad
idem planum; Atque proinde rectæ AB, CD,
cum rectæ sint ad idem planum per GH, GI,
ductum, parallelæ erunt. Quæ igitur eidem rectæ
lineæ sunt parallelæ, fed non in eodem cum illa
plano, hæ quoque sunt inter se parallelæ. Quod
erat demonstrandum.

THEOR. 10. PROPOS. 10.

Si duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes ad
duas rectas se mutuo tangentes sint paralle-
læ, non autem in eodem plano: Illæ an-
gulos æquales comprehendent.

Sint rectæ AB, AC, se tangentes in A, paral-
læ rectis DE, DF, se tangentibus in D;
non sint autem AB, AC, in eodem plano, in
quo DE, DF. Dico angulos BAC, EDF, ab
ipsis comprehensos esse æquales. Ponantur enim
AB, DE, inter se æquales, & AC, DF, inter
se, ducanturque rectæ BC, EF, BE, AD, CF.
Quoniam igitur AB, DE, parallelæ sunt & æ-
quales;

300 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

a 33. *primi* quales; *a* erunt quoque BE, AD, parallelæ & æquales. Simili argumento parallelæ erunt & æquales CF, AD. Quare cum BE, CF, parallelæ & æquales sint eidem AD, *b* erunt etiam BE, CF, inter se parallelæ & æquales; *c* Ac propterea parallelæ & æquales erunt rectæ BC, EF. Quia ergo latera AB, AC, trianguli ABC, æqualia sunt lateribus DE, DF, trianguli DEF, ex constructione; & basis BC, basi EF, æqualis, ut modo demonstravimus; *d* Erunt & anguli BAC, EDF, dictis lateribus comprehensi, æquales. Si igitur duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes, &c. Quod erat ostendendum.

P R O B L. I. P R O P O S. II.

A dato puncto in sublimi, ad subjectum planum perpendiculararem rectam lineam ducere.

TAB. XXVII. *fig. 13.* Sit a puncto A, in sublimi ad subjectum planum BC, ducenda perpendicularis. Ducatur in plano BC, recta utcumque DE, *a* ad quam ex A, deducatur perpendicularis AF. *b* Et in plano BC, per F, ad DE, perpendicularis ducatur GH, *c* ad quam ex A, perpendicularis demittatur AI. Dico AI, esse perpendiculararem ad planum subjectum BC. *d* Ducta enim in plano BC, per I, ipsi DE, parallela KL, cum DF, ad rectos angulos sit duabus FA, FH, ex constructione, *e* *ac* proinde recta ad planum per FA, FH, ductum, *f* ferit quoque KI, ad idem planum per FA, FH, ductum recta. *g* Quoniam vero AI, in eodem est cum rectis FA, FH, plano, tangitque rectam KI, in I; erit per definitionem 3. hujus lib. angulus KIA, rectus; atque adeo AI, *h* ad rectos angulos erit duabus KI, IF. *b* Igitur AI, ad planum BC, recta erit. A dato ergo puncto in sublimi, ad subjectum planum perpendiculararem rectam lineam duximus. Quod faciendum erat.

PROBL.

PROBL. 2. PROPOS. 12. xij.

Dato plano à puncto, quod in illo datum est, ad rectos angulos rectam lineam excitare.

Si à dato puncto A, in plano BC, ducenda perpendicularis ad datum planum BC, a Ex *XXVII.* quovis puncto D, in sublimi demittatur ad planum BC, perpendicularis DE, quæ si ceciderit in A, punctum, factum erit, quod proponitur: Si vero ceciderit in aliud punctum E; extensa recta per E, & A, b ducatur per A, ipsi DE, parallela AF, in plano GH, per DE, EA, ducto. Dico AF, rectam esse ad planum datum BC. Cum enim DE, AF, parallelæ sint; & DE, recta ad planum BC, ex constructione: erit quoque AF, ad idem planum BC, recta. c 8. *und.* Itaque dato plano, à puncto, quod in illo datum est, &c. Quod faciendum erat.

THEOR. II. PROPOS. 13. xij.

Dato plano, à puncto, quod in illo datum est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos non excitabuntur, ad easdem partes.

Si datum planum AB. Dico à dato ejus puncto C, ad easdem partes non posse educi duas perpendiculares ad planum AB. Ducantur enim si potest fieri, duæ perpendiculares CD, CE, ad planum AB, & per CD, CE, a quæ in uno, eodemque plano sunt, ducatur planum FG, secans planum AB, per rectam lineam GH. Cum igitur EC, DC, rectæ sint ad planum AB; erunt per defin. 3. hujus lib. anguli ECG, DCG, recti, ac proinde æquales pars, & totum. Quod est absurdum. Dato igitur plano, à puncto, quod in illo datum est, duæ rectæ lineæ ad rectos

302 *EUCLIDIS GEOMETRIÆ.*

Etos angulos non excitabuntur, ad eandem partes. Quod erat demonstrandum.

Aliter. Ducantur, si fieri potest, ex C, ad planum AB, duæ perpendiculares CD, CE. Cum igitur duæ DC, EC, rectæ sint ad idem planum AB; erunt ipsæ inter se parallelæ, cum tamen conveniant in puncto C. Quod est absurdum.

iv. THEOR. 12. PROPOS. 14.








Ad quæ plana, eadem recta linea recta est; illa sunt parallelæ.

TAB. XXVII. Sit recta AB, ad plana CD, EF, recta. Dico parallela esse plana CD, EF. Si enim non credantur esse parallelæ, producta inter se convenient. Convenient ad partes C, E, a & faciunt communem sectionem rectam lineam GH; In qua sumpto puncto utcumque I, ducantur rectæ IA, IB, in planis GCD, GEF. Quia igitur AB, recta ponitur ad plana GCD, GEF, erunt per defin. 3. hujus lib. duo anguli IAB, IBA, recti, in triangulo ABI. b Sed & minores duobus rectis sunt. Quod est absurdum. Igitur plana CD, EF, producta nunquam inter se conveniunt. Parallelæ ergo sunt. Ad quæ igitur plana, eadem recta linea recta est, &c. Quod erat demonstrandum.

xv. THEOR. 13. PROPOS. 15.

Si duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes, ad duas rectas se mutuo tangentes sint parallelæ, non in eodem consistentes plano: Parallelæ sunt, per quæ illa ducuntur, plana.

TAB. XXVII. Sint duæ rectæ lineæ AB, AC, se tangentes in A, parallelæ duabus rectis lineis DE, DF, se





se tangentibus in D, existentibusque in alio cum illis plano. Dico & plana BC, EF, per ipsas ducta, esse parallela. Ex A, a enim deducatur ad planum EF, perpendicularis AG, occurrens plano EF, in puncto G. b Deinde in plano EF, per G, ducantur GH, GI, ipsis DE, DF, parallelæ. Quoniam igitur rectæ AB, GH, parallelæ sunt ipsi DE; erunt & AB, GH, inter se parallelæ. d Ac proinde anguli BAG, AGH, duobus rectis æquales: Est autem AGH, rectus ex defin. 3. hujus lib. Rectus ergo erit & angulus BAG. Simili argumento concludes, angulum CAG, rectum esse. Itaque cum recta GA, sit recta duabus AB, AC, & recta quoque erit GA, ad planum BC, per ipsas ductum. Est autem & recta ad planum EF, ex constructione. f Igitur parallela sunt plana BC, EF. Si ergo duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes, &c. Quod erat demonstrandum.

S C H O L I U M.

Dato plano, per datum punctum, quod in eo non est, parallelum planum ducere.

Datum planum sit AB, punctumque extra ipsum sit C, per quod ducendum sit planum plano AB, parallelum. In plano AB, ducantur utrumque duæ rectæ DB, DA, se tangentes in D, puncto, à quo ad C, recta ducatur DC. Deinde in plano BC, per rectas DB, DC, ducto, sagatur GE, ipsi DB, parallela. Et in plano AC, per rectas DA, DC, ducto fiat quoque CF, ipsi DA, parallela. Dico planum EF, per rectas GE, CF, ductum, parallelum esse plano dato AB. Cum enim duæ rectæ DB, DA, se tangentes in D, duabus rectis CE, CF, se tangentibus in C, existentibusque in alio cum illis plano parallela sint, & parallela erunt plana AB, EF, per ipsas ducta. Quod est propositum.

THEOR.

xvi. THEOR. 14. PROPOS. 16.

Si duo plana parallela plano quopiam secantur : communes illorum sectiones sunt parallelae.

TAB. XXVII. **Fig. 4.** Secantur plana AB, CD, parallela plano EF, per rectas EH, GF. Dico communes sectiones eorum EH, GF, esse lineas parallelas. Si enim non sunt parallelae, productae inter se convenient, cum sint in plano EF, secante. Convenient igitur in puncto I. Quia ergo tota recta HEI, in uno est plano, nimirum in AB, producta; Item tota recta FGI, in uno quoque est plano, videlicet in CD, producta; convenient etiam plana AB, CD, producta ad I. Quod est absurdum, cum ponantur parallela. Sunt igitur rectae EH, GF, parallelae. Quare si duo plana parallela plano quopiam secantur, &c. Quod erat demonstrandum.

xvij. THEOR. 15. PROPOS. 17.

Si duae rectae lineae parallelis planis secantur; In eadem rationes secabuntur.

TAB. XXVIII. **Fig. 5.** Rectae lineae AB, CD, secantur planis parallelis EF, GH, IK, in punctis L, M, N, O, P, Q. Dico eas secari proportionaliter, hoc est, segmenta earum inter dicta plana intercepta esse proportionalia, ut quidem LM, ad MN, ita esse OP, ad PQ. Ducantur enim rectae LO, NQ, in planis EF, IK, & jungatur recta LQ, occurrens plano GH, in R, puncto, a quo ad puncta M, P, rectae ducantur RM, RP, in eodem plano GH. Eritque triangulum LNQ, in uno plano: similiter triangulum LOQ, in uno plano. Quoniam vero plana parallela GH, IK, secantur plano trianguli LNQ, erunt communes

LIBER UNDECIMUS. 305

nes sectiones eorum MR, NQ, parallelæ. Pari ratione parallelæ erunt RP, LO. Quam obrem erit ut LR, ad RQ, ita LM, ad MN; Item ut LR, ad RQ, ita OP, ad PQ; Ac proinde ut LM, ad MN, ita OP, ad PQ. Si igitur duæ rectæ lineæ parallelis planis secentur, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 16. PROPOS. 18.

Si recta linea plano cuiuspiam ad rectos sit angulos: Et omnia, quæ per ipsam, plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Si recta AB, ad planum CD, recta. Dico omnia plana per rectam AB, ducta, esse recta ad idem planum CD. Ductum enim sit per AB, planum EF, secans planum CD, per rectam lineam FG. Sumpto deinde puncto H, utcumque in recta FG, adducatur in plano EF, ipsi AB, parallela HI. Quoniam igitur AB, IH, parallelæ sunt; & AB, ponitur recta ad planum CD; erit quoque IH, ad idem planum CD, recta ac proinde per defin. 3. hujus lib. ad communem sectionem FG, perpendicularis. Eadem ratione omnes lineæ, quæ in plano EF, ipsi AB, ductentur parallelæ, erunt ad planum CD, rectæ; ac proinde per defin. 3. hujus lib. ad communem sectionem FG, perpendiculares. Quare rectum erit planum EF, ad planum CD, per defin. 4. hujus lib. Similique argumento ostendentur omnia alia plana per rectam AB, ducta ad planum CD, esse recta. Si igitur recta linea plano cuiuspiam ad rectos sit angulos, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 17. PROPOS. 19.

Si duo plana se mutuo secantia, plano cuidam ad rectos sint angulos, communis etiam

etiam illorum sectio ad rectos eidem plano angulos erit.

TAB. XXVII.
Fig. 7.
§ 4. mod. Sint duo plana AB, CD, se mutuo secantia per lineam rectam EF, ad planum GH, recta. Dico communem illorum sectionem EF, rectam quoque esse ad idem planum GH. Aut enim EF, ad BF, DF, communes sectiones planorum AB, CD, cum plano GH, recta est, aut non. Si recta est EF, ad BF, DF, a recta quoque erit ad planum GH, quod per ipsas ducitur. Si vero EF, concedatur recta ad alteram rectarum BF, DF, tantum sit ea recta ad BF. Quoniam igitur planum AB, ad planum GH, ponitur rectum; erit EF, quæ in plano AB, ad BF, communem ejus sectionem cum plano GH, ducitur perpendicularis, ad planum GH, recta, ex 4. defin. hujus lib. Idem concludes si EF, concedatur recta ad DF. Erit enim & tunc EF, ad planum GH, recta ex defin. 4. hujus lib. cum perpendicularis ponatur ad DF, communem sectionem plani CD, cum plano GH, ducaturque in plano CD, ad planum GH, recto. Si denique EF, ad neutram BF, DF, esse credatur recta; b ducatur ex F, in plano AB, ad BF, communem ejus sectionem cum plano GH, perpendicularis FI; Item in plano CD, ad DF, communem ejus sectionem cum plano GH, perpendicularis FK. Quoniam igitur planum AB, rectum ponitur ad planum GH, erit quoque perpendicularis IF, quæ in plano AB, ad BF, communem ejus sectionem cum plano GH, ducitur, recta ad planum GH; ex 4. defin. hujus lib. Eadem ratione erit KF, ad idem planum GH, recta; Ac proinde à puncto F, ad planum GH, duæ perpendiculares sunt excitatæ. Quod fieri non posse supra demonstratum est. Quare EF, recta erit ad planum GH. Si duo igitur plana se mutuo secantia plano cuidam ad rectos sint angulos, &c. Quod erat demonstrandum.

§ 11. prim.

§ 13. mod.

THEOR.

THEOR. 18. PROPOS. 20.

22

Si solidus angulus tribus angulis planis contineatur: Ex his duo quilibet ut ut assumpti tertio sunt majores.

Contineatur angulus solidus ad A , tribus angulis planis BAC , CAD , DAB . Dico quoslibet duos reliquo esse majores. Si enim omnes tres sint æquales, perspicuum est, quosvis duos majores esse reliquo: Si vero duo tantum sint æquales, & tertius utrovis minor, constat quoque quoslibet duos reliquo majores esse. Quod si unus, videlicet BAC , sit maximus, reliqui autem sive æquales, sive inæquales, manifestum etiam est, quemlibet horum cum maximo illo BAC , reliquo esse majorem. Dico jam hoc angulo maximo BAC , majores quoque esse angulos duos BAD , DAC . In plano enim per AB , AC , ducto fiat angulus BAE , angulo BAD , æqualis; & recta AE , æqualis rectæ, AD . Deinde in eodem plano per E , extendatur recta BC , secans rectas AB , AC , in B , & C ; junganturque rectæ BD , DC . Quoniam igitur latera AD , AB , trianguli BAD , æqualia sunt lateribus AE , AB , trianguli BAE ; & anguli quoque ipsis contenti, per constructionem æquales; erunt bases BD , BE , æquales. Quia vero latera DB , DC , majora sunt latere BC ; si demantur æquales rectæ BD , BE , relinquetur recta CD , major quam CE . Cum igitur latera AD , AC , trianguli DAC , æqualia sint lateribus AE , AC , trianguli EAC ; & basis CD , major base CE ; erit angulus CAD , angulo CAE , major. Additis ergo æqualibus angulis BAD , BAE , erunt duo anguli CAD , BAD , majores duobus angulis CAE , BAE , hoc est, toto angulo BAC , qui maximus omnium ponebatur. Ac proinde duo quilibet multo majores erunt reliquo non maximo. Quocirca si solidus angulus

TAB.
XXVIII.
fig. 8.

a 23. prim.

b 4. prim.
ca 0. prim.

ds 5. prim.

angulus tribus angulis planis contineatur, &c.
Quod erat ostendendum.

xxi. THEOR. 19. PROPOS. 21.

Omnis solidus angulus sub minoribus, quam quatuor rectis angulis planis continetur.

TAB. XXVIII. fig. 9. Sit angulus solidus A, contentus tribus planis angulis BAC, CAD, DAB. Dico hos tres angulos minores esse quatuor rectis. Ductis enim rectis BC, CD, DB, erunt constituti tres anguli solidi B, C, D, quorum quilibet sub tribus angulis planis continetur, nempe B, sub CBA, ABD, DBC. At C, sub BCA, ACD, DCB: *a 20. mod.* D, vero sub CDA, ADB, BDC. Quoniam vero duo anguli CBA, ABD, majores sunt angulo CBD; similiterque duo anguli BCA, ACD, majores angulo BCD; & duo anguli CDA, ADB, majores angulo CDB: erunt sex anguli CBA, ABD, BCA, ACD, CDA, ADB, tribus angulis CBD, BCD, CDB, majores. *b 32. primi* Hi autem tres æquales sunt duobus rectis. Illi ergo sex duobus rectis erunt majores. Cum igitur sex illi, una cum tribus ad A, æquales sint sex rectis propter triangula tria BAC, CAD, *c 32. primi* DAB, (c sunt enim anguli cujuslibet trianguli duobus rectis æquales) si auferantur sex illi duobus rectis majores, relinquentur tres ad A, solidum angulum constituentes, quatuor rectis minores. Omnis ergo solidus angulus, &c. Quod erat demonstrandum.

xxij. THEOR. 20. PROPOS. 22.

Si fuerint tres anguli plani, quorum duo ut libet assumpti reliquo sint majores; comprehendant autem ipsos rectæ lineæ æquales; fieri

fieri potest, ut ex lineis æquales illas rectas connectentibus triangulum constituatur.

Sint tres anguli plani A, B, C, contenti rectis æqualibus AD, AE, BF, BG, CH, CI, hac tamen lege, ut duo quilibet reliquo sint majores. Dico ex tribus rectis DE, FG, HI, quæ rectas illas æquales connectunt, triangulum posse constitui; hoc est, trium rectarum DE, FG, HI, quaslibet duas reliqua esse majores. Nam hoc posito, a ex ipsis triangulum facile conficietur. Quod enim duæ DE, FG, majores sint, quam HI, ita ostendetur. b Fiat angulus DAK, angulo B, æqualis, cadatque primum AK, ad partes AD, ita ut fiat totus quidam angulus EAK, ex duobus EAD, DAK, compositus; quod quidem contingeret, quando duo anguli DAE, & B, duobus rectis sunt minores. Ponatur AK, ipsi AD, æqualis, connectanturque rectæ KD, KE. Quoniam igitur latera AK, AD, trianguli AKD, æqualia sunt lateribus BF, BG, trianguli BFG; & anguli ipsis contenti DAK, & B, æquales; c erunt & bases KD, FG, æquales. Rursus quia latera AK, AE, trianguli AKE, æqualia sunt lateribus CH, CI; & angulus EAK, major angulo C, propterea quod duo anguli DAE, & B, majores ponuntur angulo C; d erit & basis EK, major base HI: e sunt autem rectæ ED, DK, majores recta EK. Igitur multo majores erunt ED, DK, quam HI. Cum ergo DK, ostensa sit æqualis rectæ FG; erunt quoque DE, FG, majores quam HI. Quod est propositum.

Cadat deinde AK, in rectum & continuum ipsi AE: quod quidem accidet, quando duo anguli DAE, & B, duobus rectis sunt æquales. Ponaturque AK, ipsi AD, æqualis rursus, & connectatur recta KD. f Erit, igitur ut prius f KD, ipsi FG; æqualis. g Quoniam vero rectæ ED, DK, majores sunt recta KE, & KE, æqualis est rectis CH, CI, ex hypothesi, & con-

TAB.

XXVIII.

fig. 10.

a22. primi

b23. primi

c 4. primi

d24. primi

e20. primi

TAB.

XXVIII.

fig. 11.

f 4. primi

g20. primi

310 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

structione; erunt quoque ED, DK, majores
 h10. primi duabus CH, CI: b Hæ autem majores sunt,
 quam HI. Igitur multo majores erunt ED,
 DK, quam HI. Cum ergo DK, ostensa sit æ-
 qualis ipsi FG; erunt quoque DE, FG, mayo-
 res quam HI. Quod est propositum.

TAB. Cadat postremo AK, ad partes AE, ita ut
 XXIX. nec angulus totus componatur ex angulis EAD,
 fig. 1. DAK, nec recta sit EAK; quod demum eveni-
 et, quando duo anguli DAE, & B, duobus
 rectis sunt majores. Ponaturque rursus AK,
 ipsi AD, æqualis, & ducantur rectæ KD, KE.

i 4. primi Erit igitur, ut prius, KD, ipsi FG, æqualis.
 ka 1. primi Quoniam vero duæ DE, DK, majores sunt
 duabus AE, AK, & AE, AK, æquales duabus
 CH, CI, ex hypothesi & constructione; erunt
 quoque DE, DK, majores quam CH, CI:

l 20. primi Hæ autem majores sunt, quam HI. Igitur
 multo erunt majores DE, DK, quam HI. Cum
 ergo DK, ostensa sit æquales ipsi FG; erunt
 quoque DE, FG, majores quam HI, quod est
 propositum. Eodem modo concludemus DE,
 HI, majores esse, quam FG, si angulus DAK,
 angulo C, fiat æqualis; Item FG, HI, mayo-
 res, quam DE, si angulo C, ad FB, constitua-
 tur angulus æqualis, &c. Quare ex tribus
 m22. primi rectis DE, FG, HI, triangulum constitui potest.
 Si igitur fuerint tres anguli plani, &c. Quod
 demonstrandum erat.

TAB. Aliter. Si tres anguli A, B, C, sunt æqua-
 XXIX. les; erunt quoque bases DE, FG, HI, æqua-
 fig. 2. les; Ac proinde quælibet duæ reliqua majores.
 n 4. primi Si vero duo tantum anguli sunt æquales, & ter-
 o 4. primi tius minor; erunt quoque duæ illorum bases
 p 14. primi æquales, & basis tertii utraque minor: Quare
 rursus quælibet duæ majores erunt reliqua. Quod
 si unus eorum, nempe A, sit maximus, sive
 reliqui B, & C, sint inter se æquales, sive ina-
 q 14. primi quales; erit quoque basis DE, omnium maxi-
 ma. Quare DE, FG, majores erunt quam HI:
 Item, DE, HI, majores quam FG. Dico jam
 &

TAB. XXVIII.

Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 7.







Fig. 11.





& rectas FG, HI, majores esse recta DE. ^{223. primi} Fiat enim angulus DAK, æqualis angulo B, ponaturque AK, ipsi AD, æqualis. Cadet ergo punctum K, infra DE; propterea quod per puncta D, K, E, transit circumferentia circuli ex A, ad intervallum AD, descripta, ob æqualitatem rectarum AD, AK, AE. Connectantur deinde rectæ DK, KE. Quoniam igitur duo anguli B, & C, majores ponuntur angulo DAE, & B, æqualis est angulo DAK, per constructionem; erit angulus C, major reliquo angulo KAE. Et quia latera AD, AK, trianguli AKD, æqualia sunt lateribus BF, BG, trianguli BFG; & anguli ipsi contenti DAK, & B, æquales; erit basis DK, basi FG, æqualis. Rursus quia ^{4. primi} latera CH, CI, trianguli CHI, æqualia sunt lateribus AK, AE, trianguli AKE, & angulus C, ostensus major angulo KAE; erit & basis ^{24. primi} HI, major base KE. Quare cum DK, ostensa sit æqualis ipsi FG, erunt FG, HI, majores quam DK, KE. ^{210. primi} Sed DK, KE, majores sunt, quam DE. Igitur multo majores erunt FG, HI, quam DE. Quod est propositum.

PROBL. 3. PROPOS. 23. xxiii.

Ex tribus angulis planis, quorum duo quomodocunque assumpti reliquo sunt majores, solidum angulum constituere. Oportet autem illos tres angulos quatuor rectis minores esse.

Sint tres anguli A, B, C, quatuor rectis ^{142.} minores, hac conditione, ut quilibet duo sint ^{xxix.} majores reliquo. Oportet jam ex tribus angulis ^{fig. 3.} A, B, C, angulum solidum conficere, qui nimirum contineatur tribus angulis planis, qui dictis tribus angulis sint æquales. Ponantur sex linee angulos dictos comprehendentes, nempe AD, AE, BF, BG, CH, CI, æquales; subdanturque

312 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

^{22. quod.} turque bases DE, FG, HI. a Fieri ergo potest, ut ex DE, FG, HI, triangulum constituatur. Constitutur ex ipsis igitur triangulum KLM, sitque latus KL, rectæ DE; latus LM, rectæ FG; & latus KM, rectæ HI, æquale. b Describatur circa triangulum KLM, circulus, cujus centrum N, à quo ducantur rectæ NK, NL, NM. Eritque quælibet rectarum angulos planos comprehendentium, nempe AD, AE, &c. major qualibet ductarum ex centro N. Quod ita ostendetur. Cadat primo centrum N, intra triangulum KLM; quod quidem fiet, quando triangulum est oxygonium, ut ex coroll. propos. 5. lib. 4. constat. Si igitur AD, AE, majores non credantur, quam NK, NL, erunt vel æquales, vel minores. Sint ergo æquales. Quoniam igitur latera AD, AE, trianguli ADE, æqualia sunt lateribus NK, NL, trianguli NKL; & basi DE, basi KL, æqualis: c erit angulus A, angulo KNL, æqualis. Eodem argumento erit angulus B, angulo LNM; & angulus C, angulo MNK, æqualis. Cum igitur tres anguli circa N, æquales sint quatuor rectis ex coroll. propos. 15. lib. 1. erunt quoque tres anguli A, B, C, quatuor rectis æquales. Quod est absurdum, ponuntur enim quatuor rectis minores. Non igitur æquales sunt AD, AE, ipsis NK, NL. Dico quod neque minores. Si enim minores sint AD, AE, quam NK, NL, abscindantur NO, NP, ipsis AD, AE, æquales, ducaturque recta OP. Quoniam igitur est ut NK, ad NO, ita NL, ad NP, cum & antecedentia inter se, & consequentia sint inter se æqualia; erunt latera NK, NL, trianguli NKL, secta proportionaliter, & ac proinde OP, ipsi KL, parallela erit. e Quare anguli NOP, NPO, angulis NKL, NLK, æquales erunt, & triangulum NOP, triangulo NKL, æquiangulum. f Igitur erit ut NK, ad KL, ita NO, ad OP. Est autem NK, major quam NO. g Igitur & KL, hoc est, DE, quæ æqualis est ipsi KL, major erit, quam OP. Quocirca cum la-
tera

LIBER UNDECIMUS. 313

tera AD, AE, trianguli ADE, sint æqualia lateribus NO, NP; trianguli NOP, & basis DE, major base OP, herit & angulus A, major angulo ONP. Eadem ratione angulus B, angulo LNM; & angulus C, angulo MNK, major esse ostendetur. Cum igitur tres anguli ad N, quatuor sint rectis æquales, ex corol. propof. 15. lib. 1. erunt tres anguli A, B, C, majores quatuor rectis. Quod est absurdum, ponuntur enim quatuor rectis minores. Non igitur minores sunt AD, AE, quam NK, NL; sed neque æquales. Igitur majores.

Cadat deinde centrum N, in latus LM, quod tum continget, quando triangulum KLM, angulum LKM, habuerit rectum, ut ex eodem corol. propof. 5. lib. 4. manifestum est. Si igitur AD, AE, dicantur esse æquales ipsis NK, NL; erunt quoque BF, BG, æquales eisdem NK, NL. Cum ergo NK, æqualis sit ipsi NM; æquales erunt BF, BG, rectæ LM: Posita autem fuit LM, æqualis ipsi FG. Igitur BF, BG, æquales quoque sunt rectæ FG. Sunt autem & majores BF, BG, quam FG. Quod est absurdum. Non igitur æquales sunt AD, AE, ipsis NK, NL. Quod si AD, AE, minores credantur, quam NK, NL; erunt quoque BF, BG, minores quam NK, NL. Cum ergo NK, æqualis sit ipsi NM; minores erunt BF, BG, quam recta LM: posita autem fuit LM, ipsi FG; æqualis. Igitur BF, BG, minores quoque sunt rectæ FG. Quod est absurdum, cum sint majores. Non ergo minores sunt AD, AE, quam NK, NL; sed neque æquales: Igitur majores.

Cadat postremo centrum N, extra triangulum KLM, infra latus LM, quod dentum accidit, quando angulus LKM, fuerit obtusus, ut ex corol. dicto propof. 5. lib. 4. liquet. Si igitur dicantur AD, AE, esse æquales ipsis NK, NL; cum & basis DE, basi KL, ponatur æqualis; herit angulus A, angulo KNL, æqualis. Eadem ratione angulus C, angulo KNM, æqualis erit.

has primas

TAB. XXIX. fig. 4.

120. primas

120. primas

TAB. XXX. fig. 1.

18. primas

314 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Quare totus angulus LNM, angulis A, & C, æqualis erit. Sed hi duo majores sunt ex hypothesi, angulo B. Igitur & angulus LNM, angulo B, erit major. Rursus quia latera NL, NM, trianguli NLM, æqualia sunt lateribus BF, BG, trianguli BFG, & basis LM, basi FG, æqualis; *m*erit angulus LNM, angulo B, æqualis; Sed & majorem ostendimus esse. Quod est absurdum. Non igitur æquales sunt AD, AE, ipsi NK, NL. Quod si AD, AE, credantur esse minores, quam NK, NL; si abscendantur NO, NP, ipsis AD, AE, æquales, & ducatur recta OP, demonstrabitur, ut in primo casu, angulus A, major angulo ONP; & eadem ratione angulus C, major angulo KNM. *n* Fiat angulus ONQ, angulo A; & angulus ONR, angulo C, æqualis, ponanturque NQ, NR, æquales ipsis AD, AE, & connectantur OQ, OR, cadetque OQ, infra OP, propterea quod perpendicularis O, P, Q, transit circumferentia circuli ex N, ad intervallum NO, descripta, cum æquales sint rectæ NO, NP, NQ. *o* Quare cum angulus PON; æqualis sit angulo LKN, externus interno; erit angulus QON, minor angulo LKN. Eadem ratione ostendetur angulus NOR, minor angulo NKM, si ducatur OS, parallela ipsi KM. Cadet enim similiter OR, infra OS. Igitur totus angulus LKM, toto angulo QOR, major erit. Quoniam vero latera NO, NQ, trianguli NOQ, æqualia sunt lateribus AD, AE, trianguli ADE; Est autem & angulus ONQ, angulo A, æqualis, per constructionem; *p* erit OQ, ipsi DE, hoc est, ipsi KL, æqualis. Eodem modo erit OR, ipsi KM, æqualis. Connexa jam recta QR, cum latera KL, KM, trianguli LKM, æqualia sint lateribus OQ, OR, trianguli OQR, & angulus LKM, major angulo QOR, ut ostendimus; *q* erit basis LM, hoc est, FG, major base QR. Quoniam igitur latera BF, BG, trianguli BFG, æqualia sunt lateribus NQ, NR, trianguli NQR; & basis FG, major base QR;

q erit

erit angulus B, major angulo QNR. Rursus quia angulus ONQ, angulo A; & angulus ONR, angulo C, factus est æqualis, erit angulus totus QNR, duobus A, & C, æqualis: Sed A, & C, majores ponuntur angulo B. Igitur & angulus QNR, major erit angulo B. Quod est absurdum, cum B, ostensus sit major angulo QNR. Non ergo minores sunt AD, AE, quam NK, NL; sed neque æquales: Igitur majores.

Jam vero, cum rectæ AD, AE, majores sint rectis NK, NL, ubicunque centrum N, existat; possit recta AD, plus quam recta NK, quadrato lineæ T, per lemma annexum, ita ut quadratum rectæ AD, æquale sit quadratis rectarum NK, & T. Ex centro N, excitetur ad planum circuli KLM, perpendicularis NV, rectæ T, æqualis, connectanturque rectæ KV, LV, MV. Quoniam igitur NV, recta est ad planum circuli KLM, recta quoque eadem erit, ex defin. 3. hujus lib. ad rectas NK, NL, NM, ac proinde de quadratum rectæ VK, quadratis rectarum KN, NV, æquale erit. Cum ergo & quadratum rectæ AD, æquale sit ex constructione, eadem quadratis rectarum KN, NV; æqualia erunt inter se quadrata rectarum VK, & AD. Ac propterea æquales erunt rectæ VK, AD. Rursus quia latera VN, NK, trianguli VNK, æqualia sunt lateribus VN, NL, trianguli VNL; & anguli ipsis contenti VNK, VNL, recti; erit basis VK, æqualis basi VL; Atque eadem ratione rectæ VM. Quare tres rectæ VK, VL, VM, æquales sunt inter se: Ostensa est autem recta VK, æqualis rectæ AD. Tres ergo rectæ VK, VL, VM; æquales sunt rectæ AD, & ob id, rectis AE, BF, BG, CH, CI. Quamobrem, cum latera VK, VL, trianguli VKL, æqualia sunt lateribus AD, AE, trianguli ADE; & basis KL, basi DE; erit angulus KVL, angulo A, æqualis. Non secus demonstrabimus, angulum LVM, angulo B; & angulum KVM, angulo C, esse æqualem. Quare angulus solidus V, cont-

316 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

continentur tribus angulis planis KVL , LVM , MVK , qui æquales sunt datis tribus angulis planis A , B , C . Ex tribus itaque angulis planis, &c. Quod erat faciendum.

LEMMA.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus, invenire id, quo major plus potest, quam minor.

TAB. *Sint data dua recta linea inæquales AB , & C , quarum AB , major, oporteatque invenire, quo AB , plus possit quam C . Divisa AB , bisariam in D , describatur ex centro D , & intervallo DA , vel DB , semicirculus AEB , a in quo aptetur recta AE , ipsi C , æqualis, jungaturque recta ER . Dico rectam AB , plus posse quam C , quadrato recta EB . Cum enim angulus E , in semicirculo rectus sit; cerit quadratum ex AB , æquale quadratis AE , & EB ; atque idcirco AB , plus poterit quam AE , hoc est, quam C , quadrato recta EB . Quod est propositum.*

xxiv. THEOR. 21. PROPOS. 24.

Si solidum parallelis planis contineatur; adversa illius plana, parallelogramma sunt similia & æqualia.

TAB. *Sit parallelepipedum $ABEF$, (de hoc enim intelligenda est propositio) contentum juxta defin. 30. hujus lib. sex figuris quadrilateris AC , CF , FH , HA , AF , BE , quarum adversa quælibet sint parallelæ. Dico quævis opposita plana esse parallelogramma similia, & æqualia. Cum enim parallelæ plana BG , CF , secentur plano AC ; Erunt communes sectiones AB , CD , paral-*

parallelæ. Similiter cum plana parallela AF, BE, secentur plano AC; erunt communes sectiones AD, BC, parallelæ. Ac proinde parallelogrammum est figura quadrilatera ABCD. Non aliter ostendemus, reliquas figuras quadrilateras esse parallelogramma. Dico jam opposita parallelogramma esse similia, & æqualia. Cum enim rectæ AB, BH, parallelæ sint rectis DC, CE, & non in eodem plano, sed in oppositis; b erunt b 10. *aud.* anguli ABH, DCE, æquales; eodemque argumento reliqui anguli parallelogrammi BG, æquales erunt reliquis angulis parallelogrammi CF. c Quoniam vero AB, ipsi DC, in parallelogrammo AC; & BH, ipsi CE, in parallelogrammo BE, æqualis est; erit ut AB, ad BH, ita DC, ad CE. Ac propterea ut BH, ad HG; ita CE, ad EF, &c. eadem de causa: Erunt latera parallelogrammorum BG, CF, circa angulos æquales, proportionalia; ac proinde parallelogramma ipsa similia. Duëtis jam diametris AH, DE, d cum latera AB, BH, trianguli ABH, æqualia d 34. *primi* sint lateribus DC, CE, trianguli DCE; e & angulus ABH, angulo DCE, æqualis, ut ostensum est, ferunt triangula ABH, DCE, æqualia inter se. f Quare cum triangula ABH, DCE, dimidia sint parallelogrammorum BG, CF, inter se æqualia. Similiter demonstrabimus similia & æqualia esse parallelogramma opposita AC, GE; & AF, BE. Si solidum ergo parallelis planis continetur, adversa illius plana, parallelogramma sunt similia, & æqualia, &c. Quod erat demonstrandum. e 10. *aud.* f 4. *primi* g 34. *primi*

THEOR. 22. PROPOS. 25. xxv.

Si solidum parallelepipedum plano secetur adversis planis parallelo: Erit quemadmodum basis ad basim, ita solidum ad solidum.

Secetur parallelepipedum ABCD, plano EF, 7 *ad* parallelo oppositis planis AD, BC. Dico ut XXX. est fig. 3;

318 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

est basis AG, ad basin BG, ita esse solidum AEFD, ad solidum BEFC. Intelligatur enim parallelepipedum ABCD, productum in utramque partem quantumlibet, sumanturque in AB, protracta quotcunque rectæ AK, KL, ipsi AE; & quotcunque rectæ BM, MN, NO, ipsi EB, æquales. Deinde per puncta K, L, M, N, O, ducantur plana KP, LQ, MR, NS, OT, parallela planis AD, EF, BC, per scholium propos. 15. hujus lib. Quoniam igitur solidum AEFD, continetur planis parallelis ex hypothesi; a 24. *ind.* ipsum parallelepipedum erit, ex definitione, & habebitque plana opposita, parallelogramma similia, & æqualia. Eodem modo erunt parallelepipeda AKPD, KLOP, EBCF, BMRC, MNSR, NOTS, ELQF, EOTF; habebuntque plana opposita, parallelogramma similia, & æqualia. b 36. *primi* Quoniam vero parallelogramma AG, KV, LX, cum sint super æquales bases AE, AK, KL, c 39. *primi* æqualia sunt; & similia quoque cum anguli unius sint æquales angulis aliorum, & latera circa angulos unius æqualia lateribus circa angulos aliorum, ideoque proportionalia. Eademque ratione æqualia & similia sunt parallelogramma AY, KZ, La. Cum igitur æqualia quoque sint, & similia parallelogramma AD, KP, LQ: Erunt tria plana AG, AY, AD, solidi AEFD, æqualia, & similia tribus planis KV, KZ, KP, solidi AKPD, & tribus planis LX, La, LQ, solidi KLQP: a 24. *ind.* Sunt autem tria in unoquoque solido æqualia, & similia tribus reliquis oppositis in eodem, nempe AG, ipsi ZF; & AY, ipsi VF; & AD, ipsi EF, &c. Igitur per definit. 10. hujus lib. æqualia sunt solida AEFD, AKPD, KLQP. Eodem argumento æqualia ostendentur solida EBCF, BMRC, MNSR, NOTS. Quare quam multiplex est basis LG, basis AG, tam multiplex erit solidum LEFQ, solidi AEFD. Et quam multiplex est basis OG, basis BG, tam multiplex erit solidum OEFT, solidi BEFC. Quoniam vero si basis LG, (multiplex



LIBER UNDECIMUS. 319

triplex basis AG, primæ magnitudinis,) æqualis est basi OG, (multiplici basis BG, secundæ magnitudinis,) æquale quoque est solidum LEFQ, (multiplex solidi Aefd, tertiæ magnitudinis) solido OEFT, (multiplici solidi BEFC, quartæ magnitudinis,) propterea quod basibus LG, OG, æqualibus existentibus; æqualia quoque sunt & similia sex parallelogramma solidi LEFQ, sex parallelogrammis solidi OEFT: Si autem basis major est base, solidum quoque solido majus est; & si minor, minus; in quacunque hoc fiat multiplicatione: Erit per defin. 6. lib. 5. ut basis AG, prima magnitudo, ad basin BG, secundam magnitudinem, ita solidum Aefd, tertia magnitudo, ad solidum BEFC, quartam magnitudinem. Eadem ratione demonstrabitur esse solidum ad solidum, ut est basis DY, ad basin CY, & ut basis AY, ad basin BY, & ut basis DG, ad basin, CG. Si solidum igitur parallelepipedum piano secetur, &c. Quod erat ostendendum.

P R O B L. 4. P R O P O S. 26. xxvi.

Ad datam rectam lineam, ejusque punctum angulum solidum constituere solido angulo dato æqualem.

Si ad punctum A, in data recta AB, constituendus angulus solidus æqualis angulo solido C, contento tribus angulis planis DCE, DCF, FCE, non in eodem plano existentibus. Ducatur ex F., ad planum per CD, CE, ductum perpendicularis FG, connectanturque rectæ DF, DG, EF, EG, CG. Deinde abscindatur AH., æqualis ipsi CD., fiatque angulus HAJ, angulo DCE, æqualis; & recta AI, rectæ CE, æqualis. Rursus in plano per AH, AI, ducto constituatur angulus HAL., æqualis angulo DCG, qui in plano per CD, CE., ducto existit; & recta AL, rectæ CG, æqualis. Ex L, vero

TAB.
XXX.
c. 11. und.
b23. primus
c 12. und.
ro

ro ad planum, in quo sunt tres AH, AL, AI, erigatur perpendicularis LK, quæ ipsi FG, æqualis ponatur, & jungatur recta KA. Dico angulum solidum A, contentum tribus angulis HAI, HAK, KAI, æqualem esse dato angulo solido C. Connexis enim rectis HK, HL, IK, IL; cum latera AH, AL, trianguli AHL, æqualia sint lateribus CD, CG, trianguli CDG, & anguli HAL, DCG, æquales, per constructionem; *d 4. primi* Erunt bases HL, DG, æquales. Rursus quia ablatiis angulis æqualibus HAL, DCG, ab æqualibus HAI, DCE, reliqui æquales sunt LAI, GCE: Cum igitur & latera AL, AI, trianguli ALI, æqualia sint lateribus CG, CE, *e 4. primi* trianguli CGE, per constructionem; *e* æquales quoque erunt LI, GE. Quia igitur latera LH, LK, æqualia sunt lateribus GD, GF; & anguli, HLK, DGF, recti ex defin. 3. hujus lib. *f 4. primi* ferunt & bases HK, DF, æquales. Quare cum & latera AH, AK, trianguli AHK, sint æqualia lateribus CD, CF, trianguli CDF, ex constructione, (cum enim AL, LK, latera lateribus CG, GF, æqualia sint ex constructione, comprehendantque angulos æquales, nimirum rectos, *g 4. primi* ex defin. 3. hujus lib. gerunt bases AK, CF, *h 8. primi* æquales.) *h* Erunt quoque anguli HAK, DCF, æquales. Denique quia latera LI, LK, sunt æqualia lateribus GE, GF, & anguli ILK, EGF, *i 4. primi* recti ex defin. 3. hujus lib. *i* Erunt bases IK, EF, æquales: Cum igitur & latera AI, AK, trianguli AIK, lateribus CE, CF, trianguli CEF, *h 8. primi* sint æqualia ex constructione; *k* erunt quoque anguli IAK, ECF, æquales. Sunt ergo tres anguli plani HAI, HAK, KAI, solidum angulum A, componentes, æquales tribus angulis planis DCE, DCF, FCE, angulum solidum C, componentibus. Atque proinde solidus angulus A, solido angulo C, æqualis. Ad datam itaque rectam lineam, ejusque punctum, angulum solidum constituimus solido angulo dato æqualem. Quod erat faciendum.

PROBL.

PROBL. 5. PROPOS. 27.

XXVII

A Data recta linea, dato solido parallelepipedo simile & similiter positum solidum parallelepipedum describere.

SIt à data recta AB, describendum parallelepipedum simile, similiterque positum parallelepipedo CD. ^{TAM} ^{XXX.} ^{fig. 5.} ^{a 16. mod.} Fiat ad rectam AB, ejusque punctum A, angulus solidus æqualis angulo solido C, ita ut tres anguli plani HAI, IAB, BAH, æquales sint tribus angulis planis, ECG, GCF, FCE. Deinde ut est CF, ad CG, ^b sic fiat AB, ^{bis.} ^{sent.} ad AI, & ut CG, ad CE, ita AI, ad AH, eritque ex æquo, ut CF, ad CE, ita AB, ad AH. Post hæc, perficiatur parallelepipedum AK, completis nimirum parallelogrammis BH, HI, IB, & per I, B, H. ductis planis IK, BK, HK, quæ parallela sint parallelogrammis BH, HI, IB. Dico parallelepipedum AK, parallelepipedo CD, simile esse similiterque positum. Cum enim anguli BAH, FCE, sint æquales, & latera circa ipsos proportionalia, nempe ut BA, ad AH, ita FC, ad CE, ex constructione, erunt parallelogramma HB, EF, similia, similiterque posita. Eadem ratione similia erunt, similiterque posita parallelogramma HI, EG, & IB, GF. Tria igitur plana BH, HI, IB, solidi AK, similia sunt, similiterque posita tribus planis FE, EG, GF, solidi CD. ^{c 14. mod.} Sunt autem tria cujuslibet æqualia & similia tribus reliquis oppositis. Quare sex plana solidi AK, similia sunt, similiterque posita sex planis solidi CD. Ac proinde ex defn. 9. hujus lib. similia sunt, similiterque posita solida AK, CD. A data ergo recta linea dato solido parallelepipedum simile, & similiter positum descripsimus. Quod erat faciendum.

X

THEOR.

THEOR. 23. PROPOS. 28.

Si solidum parallelepipedum plano secetur per diagonos aduerforum planorum: Bifariam secabitur solidum ab ipso plano.

TAB. Sit parallelepipedum AB, in quo plana opposita
XX. sint AH, EB, quorum diagonii, seu diamet-
fig. 6. tri, sint rectæ lineæ CG, DF. Quoniam igitur
234. primi utraque CD, GF, parallela est, & æqualis ipsi
29. und. AE, cum sint parallelogramma CE, GE; erunt
233. primi & inter se parallela, & æquales CD, GF. Ac
 proinde, quæ ipsas conjungunt CG, DF; pa-
 rallela erunt & æquales, idcirco in uno plano.
 Dico planum, quod per CG, DF, ducitur, secare
d. 24. und. bifariam parallelepipedum AB. Cum enim pla-
 na AH, EB, sint parallelogramma æqualia, &
 similia; erunt dimidia, nimirum triangula AGC,
 GCH; EFD, FDB, æqualia inter se: sunt au-
 tem & latera circa angulos æquales GAC, CHG,
e. 6. sexti. FED, DBF, proportionalia. Igitur similia quo-
f. 24. und. que erunt dicta triangula. Cum igitur & paral-
 lelogrammum AF, æquale sit & simile parallelo-
 grammo CB; & AD, ipsi GB; & CF, commu-
 ne: Erunt duo triangula AGC, EFD, & paral-
 lelogramma AP, AD, CF, prismatis ACGFED,
 æqualia & similia duobus triangulis HCG, BDF,
 & parallelogramm's CB, BG, CF, prismatis
 HGCDBF, proptereaque prismata æqualia erunt,
 ex defn. 10. hujus lib. Quæ cum componant
 parallelepipedum AB, sectum erit parallelepi-
 pedum AB, bifariam. Itaque si solidum parallelepi-
 pedum plano secetur, &c. Quod erat demon-
 strandum.

THEOR. 24. PROPOS. 29.

Solida parallelepipeda super eandem basin constituta, & in eadem altitudine, quorum infi-

insistentes lineæ in iisdem collocantur rectis lineis, sunt inter se æqualia.

Super basin AB , in eadem altitudine, hoc est, TAM
inter eadem plana parallela, sint constituta XXX.
duo parallelepipeda $ACDE$, $AFGE$, quorum fig. 75
insistentes lineæ ex quatuor angulis basis exeuntes
in iisdem collocantur lineis, nempe AI , AK ,
 EL , EM , in recta IM ; & HC , HF , BD , BG ,
in recta CG . Dico parallelepipeda $ACDE$,
 $AFGE$, esse inter se æqualia. *a* Cum enim æ a 35. primi
qualia sint parallelogramma AL , AM , super
eadem basi AE , & in eisdem parallelis constituta;
erunt, ablato communi trapezio $AELK$, æqualia
quoque triangula AIK , ELM . *b* Quoniam vero b 34. primi
omnia latera trianguli AIK , æqualia sunt omni-
bus lateribus trianguli HCF ; erit triangulum
 AIK , triangulo HCF , æquiangulum, & æquale,
per ea, quæ in collario 8. propos. lib. 1. ostendimus;
c Ac propterea latera circa æquales angulos habebunt c 4. sect.
proportionalia, ideoque inter se erunt similia.
Eadem ratione triangulum ELM , triangulo BDG ,
æquale erit & si nile. *d* Rursus parallelogrammum da 4. un.
 AC , æquale est & simile parallelogrammo ED ;
& eadem ratione parallelogrammum AF , pa-
rallelogrammo EG : *e* Sed & IF , ipsi LG , e 36. primi
æquale est cum bases IK , LM , sint æqua-
les. (*f* Nam cum rectæ, IL , KM , æquales sint f 34. primi
ipsi AE , erunt quoque inter se æquales: quare
communi dempta KL , æquales erunt IK , LM .)
Erunt ergo omnia plana prismatis $AIKFCH$,
æqualia & similia omnibus planis prismatis
 $ELMGDB$. Igitur ex defin. 10. hujus lib. æqua-
lia erunt dicta prismata; Ac propterea addito
communi solido $AHFCLDBE$, æqualia fient
parallelepipeda super eandem basin, &c. Quod
erat demonstrandum.

xxx. THEOR. 25. PROPOS. 30.

Solida parallelepipeda super eandem basin constituta, & in eadem altitudine, quorum insistentes lineæ non in iisdem collocantur rectis lineis: inter se sunt æqualia.

TAB. XXXI. **fig. 1.** Super basin AB, in eadem altitudine, hoc est, inter eadem plana parallela, sint constituta parallelepipeda AIDK, AMFK, quorum insistentes lineæ ex quatuor angulis basis exeuntes AC, AE, KG, KL, HI, HM, BD, BF, non sint in eisdem rectis, hoc est, neque CI, GD, protractæ transeant per puncta M, E, F, L, neque CG, ID, productæ &c. Dico parallelepipeda AIDK, AMFK, esse æqualia. Cum enim plana CD, EF, opposita basi AB, sint in eodem plano, ob eandem altitudinem parallelepipedorum; producantur in eo plano rectæ CG, ID, quarum CG, secet EM, LF, protractæ in punctis N, O; Et ID, eandem in punctis P, Q; adjunganturque rectæ AN, KO, HP, BQ. *a* Quia igitur rectæ PQ, MF, sunt æquales, cum opponantur in parallelogrammo FP; & MF, ipsi HB, est æqualis; erunt & PQ, HB, æquales: Sunt autem & parallelæ, propter parallelogrammum HIBD. *b* Igitur & HP, BQ, parallelæ sunt & æquales, ideoque parallelogrammum est HPQB. Eadem ratione parallelogramma erunt HPNA, ANOK, KOQB: Est autem & parallelogrammum NOQP. Igitur parallelepipedum est APQK. *c* Quamobrem parallelepipedum AIDK, æquale est parallelepipedo APQK, cum utriusque eadem sit basis AB, & insistentes lineæ sint in rectis eisdem CO, IQ. Eodem modo eidem parallelepipedo APQK, æquale erit parallelepipedum AMFK, quum utriusque eadem sit basis AB, & insistentes lineæ sint in rectis eisdem NM, OF. Quare parallelepipeda AIDK, AMFK, inter se
sua




Fig. 4.





Fig. 6.





Fig. 7.



sunt æqualia. Solida igitur parallelepipedum super eandem basim, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 26. PROPOS. 31.

xxxi:
xxxij:

Solida parallelepipedum super æquales bases constituta, & in eadem altitudine; æqualia sunt inter se.

Super æquales bases AB, CD, in eadem altitu- TAB.
dine sint constituta parallelepipedum AEBG, XXXI.
CHIK. Dico hæc parallelepipedum esse æqualia fig. 2.
inter se. Sint enim primum insistentes lineæ
AM, GN, LE, BF, ad basim AB; & insistentes
CP, KQ, OH, DI, ad basim CD, perpendicula-
res. Quo posito, erunt omnes dictæ perpendicu-
larum inter se æquales, propter eandem parallele-
pedorum altitudinem. Producat CK, in re-
ctum, sitque KR, æqualis ipsi LB, & fiat angu-
lus RKS, in plano OK, extenso æqualis angulo
BLA, ponaturque KS, æqualis ipsi LA; & per-
ficiatur parallelogrammum KT, super quod ad
altitudinem perpendicularis KQ, construatur pa-
rallelepipedum QSTV. Quoniam igitur latera
KR, KS, æqualia sunt lateribus LB, LA, &
anguli RKS, BLA, æquales; erunt parallelo-
gramma KT, LG, æqualia & similia; Rursus
quia latera KQ, KS, æqualia sunt lateribus LE,
LA, & anguli QKS, ELA, recti, per defin. 3.
hujus lib. eo quod KQ, LE, rectæ ponantur
ad plana KT, LG, erunt & parallelogramma
QS, EA, æqualia & similia. Eodem modo cum
latera KR, KQ, æqualia sint lateribus LB, LE,
& anguli QKR, ELB, recti, ex eadem defin. 3.
hujus lib. erunt quoque parallelogramma KV,
LF, æqualia & similia. Quare cum tria plana,
KT, QS, KV, parallelepipedum QSTV, æqualia
sint & similia, tribus planis LG, EA, LF, pa-
rallelepipedum AEBG, tam autem illa, quam hæc b 24. gnd.
æqualia sint & similia tribus reliquis oppositis.

X 3

Erunt,

326 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Erunt, per defin. 10. hujus lib. parallelepipedum QSTV, EAGF, inter se æqualia.

Convenient rectæ DK, TS, productæ in d, & IQ, XY, in e, compleaturque parallelepipedum QdgV, Item HI, bV, protractæ convenient in a; & OD. gR, in Z, perficiaturque parallelepipedum IKRa. Quoniam igitur parallelepipedum QSTV, QdgV, eandem habent basin KV, suntque in eadem altitudine, nempe inter eadem plana parallela KV, dX, & insistentes ipsorum linearum KS, Kd, RT, Kg, QY, Qe, VX, Vb, collocantur in eisdem rectis dT, eX, ipsa inter se æqualia erunt. Est autem parallelepipedum QSTV, parallelepipedo EAGF, æquale: Igitur eidem parallelepipedo EAGF, æquale erit parallelepipedum QdgV.

335. primi. Quoniam vero parallelogramma KT, Kg, æqualia sunt inter se; & KT, æquale est ipsi LG, erit & Kg, ipsi LG, hoc est, ipsi CD, æquale; cum bases LG, CD, ponantur æquales.

e 7. quint. Quare erit, ut CD, ad DR, ita Kg, ad DR:

f 25. und. Ut autem CD, basis ad basin DR, ita est solidum CHIK, ad solidum KIaR; cum parallelepipedum CHaR, secetur plano IK, planis oppositis CH, aR, parallelo. Et eadem ratione ut Kg, ad DR, ita est solidum QdgV, ad solidum IKRa; cum & parallelepipedum Idga, secetur plano KV, oppositis planis Da, db, parallelo. g Igitur æqualia erunt parallelepipedum CHIK, QdgV, cum eandem habeant proportionem ad idem solidum IKRa, nimirum eandem, quam habent bases æquales CD, Kg, ad eandem basin DR. Quare cum parallelepipedum QdgV, sit ostensum æquale parallelepipedo AEFG; æqualia quoque erunt parallelepipedum AEFG, CHIK. Quod est propositum.

TAB. Sint jam neque insistentes lineæ AM, GN, XXXI. LE, BF, ad basin AB, neque CP, KQ, OH, fig. 3. DI, ad basin CD, perpendiculares: h Et à punctis E, F, M, N, demittantur ER, FS, MT, NV, ad planum, in quo basis AB, perpendiculares;

lares; Item à punctis, H, I, P, Q, ad planum, in quo basis, CD, perpendiculares HX, IY, PZ, Qa. Erunt autem omnes hæ perpendiculares inter se æquales, cum sint altitudines dictorum parallelepipedorum æquales. Ducantur rectæ RS, SV, VT, TR: Item rectæ XY, Ya, aZ, ZX, ut fiant parallelepipeda ETVF, HZaI, quæ cum sint ejusdem altitudinis, habeantque insistentes lineas perpendiculares, erunt inter se æqualia, ut ostensum est. Sed parallelepipedum ETVF, æquale est parallelepipedo ACFG, cum hoc eandem cum illo habeat basin EN, eandemque altitudinem; Et parallelepipedum HZaI, æquale est eadem ratione parallelepipedo CHIK; cum hoc eandem cum illo basin HQ, eandemque altitudinem possideat. Igitur & inter se æqualia sunt parallelepipeda ACFG, CHIK. Idemque ostendetur, si unius parallelepipedi insistentes lineæ sint perpendiculares ad basin, alterius vero non. Quocirca solida parallelepipeda super æquales bases constituta, &c. Quod demonstrandum erat.

S C H O L I U M.

Solida parallelepipeda æqualia super æquales bases, in eadem sunt altitudine. Ex parallelepipeda æqualia in eadem altitudine super æquales sunt bases, si non habuerint eandem basin.

Si enim unum altero credatur altius, si ab eo abscindatur parallelepipedum in eadem cum altero altitudine præsent æqualia abscissum, & alterum. Cum ergo & totum ponatur æquale alteri, æquale erit abscissum toti. Quod est absurdum.

Quod si in eadem sint altitudine, & basis unius credatur major base alterius, si ab ea abscindatur basis æqualis alteri, & super abscissam intelligatur parallelepipedum ejusdem altitudinis, demonstrabimus eodem modo partem toti esse æqualem. Quod est absurdum.

xxxij. THEOR. 27. PROPOS. 32.

Solida parallelepipeda sub eadem altitudine, inter se sunt, ut bases.

TAB. Sint duo parallelepipeda ABCD, EFGH, eju-
XXXI dem altitudinis super bases AB, EF. Dico
fig. 4 esse solidum ab solidum, ut est basis ad basi.
245 prim Super rectam enim EK, construatur parallelo-
grammum IK, æquale parallelogrammo AB, in
angulo IEK, qui sit æqualis angulo ENF. Con-
stituunt autem parallelogramma EF, IK, totum
parallelogrammum unum FI, ut in 45. propos.
lib. 1. demonstratum est. Si igitur aīia plana
parallelepipedi EFGH, producantur ad partes
EG, perficiaturque totum unum parallelepipedum
231. mod. IFLH; erunt parallelepipeda ABCD, IKLM,
æqualia, cum habeant æquales bases, per con-
structionem AB, IK, & eandem altitudinem, ex
67. quist. hypothesi. Quare erit ut solidum IKLM, ad
solidum EFGH, ita solidum ABCD, ad idem
235. mod. solidum EFGH: Est autem solidum IKLM,
ad solidum EFGH, ut basis IK, hoc est, illi
æqualis basis AB, ad basin EF. Igitur & soli-
dum ABCD, erit ad solidum EFGH, ut basis AB,
ad basin EF. Solida ergo parallelepipeda sub ea-
dem altitudine inter se sunt, ut bases. Quod
erat demonstrandum.

xxxvi. THEOR. 28. PROPOS. 33.

Similia solida parallelepipeda, inter se
sunt in triplicata ratione homologorum la-
terum.

TAB. Sint similia parallelepipeda ABCD, FEGH, su-
XXXI per bases similes AB, EF, in quibus latera
fig. 5. homologa sint AI, EK. Dico proportionem
parallelepipedi ABCD, ad parallelepipedum EFGH,
esse

esse triplicatam proportionis laterum homologorum AI, EK. Producatur enim AI, ad L, & fit IL, æqualis ipsi EK, vel GR; Item DI, ad M, & fit IM, æqualis ipsi HK, vel GO; Item BI, ad N, & fit IN, æqualis ipsi KF, vel GS. Deinde completis parallelogrammis LM, LN, IT, perficiatur parallelepipedum TXIV. Quoniam vero latera IL, IM, æqualia sunt lateribus GR, GO; & anguli contenti æquales, cum angulus LIM, sit æqualis angulo AID, æqui ob similitudinem parallelepipedorum æqualis est angulo EKH, seu RGO; erunt parallelogramma IX, GF; similia, & æqualia. Eadem ratione similia erunt, & æqualia LN, RS; item IT, GE. Quare tria plana IX, LN, IT, parallelepiedi TXIV, similia sunt, & æqualia tribus planis GF, RS; GE, parallelepiedi EFGH: Sunt autem tria cuiusque similia & æqualia tribus reliquis oppositis. Igitur æqualia sunt & similia parallelepipeda TXIV, EFGH, ex definitio. hujus lib. Rursus completis parallelogrammis MB, BL, LM, perficiatur parallelepipedum MPBL; Item completis parallelogrammis IY, DL, IQ, perficiatur parallelepipedum IYQZ. Quoniam igitur ob similitudinem parallelepipedorum ABCD, EFGH, est ut AI, ad EK, hoc est, ad IL, ita DI, ad HK, hoc est, ad IM; & BI, ad FK, hoc est, ad IN. Ut autem AI, ad IL, ita est parallelogrammum AD, ad DL; Et ut DI, ad IM, ita parallelogrammum DL, ad LM; & ut BI, ad IN, ita parallelogrammum BL, ad LN. Igitur erit ut AD, ad DL, ita DL, ad LM; & BL, ad LN. Sed ut AD, basis ad DL, basin, ita est parallelepipedum ADCB, ad parallelepipedum DLYQ: & ut basis DL, ad basin LM, ita parallelepipedum DLYQ, ad parallelepipedum LMBP; & ut basis BL, ad basin LN, ita parallelepipedum LMBP, ad parallelepipedum LNTX. Quare erit, ut parallelepipedum ADCB, ad parallelepipedum DLYQ, ita parallelepipedum DLYQ, ad parallelepipedum LMBP,

X y

330 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

LMBP, & parallelepipedum LMBP, ad parallelepipedum LNTX. Ac proinde quatuor quantitates sunt continue proportionales ADCB, DLYQ, LMBP, LNTX, ideoque proportio primæ ADCB, ad quartam LNTX, hoc est, ad EFGH, erit triplicata proportionis primæ ADCB, ad secundam DLYQ, ex defin. 10. lib. 5. Ut autem ADCB, ad DLYQ, ita est basis AD, ad basin DL; Et ut AD, ad DL, ita est recta AI, ad IL, hoc est, ad EK. Igitur proportio parallelepipedum ADCB, ad parallelepipedum EFGH, est triplicata proportionis homologorum laterum, nimirum AI, ad EK. Quapropter similia solida parallelepipeda, inter se sunt in triplicata ratione laterum homologorum. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M.

Ex hoc perspicuum est, si fuerint quatuor lineæ rectæ continue proportionales, ut est prima ad quartam, iam esse parallelepipedum super primam descriptum ad parallelepipedum simile, similiterque descriptum super secundum. Quia tam parallelepipedum ad parallelepipedum, ut demonstratum est, quam prima linea ad quartam, ex defin. 10. lib. 5. habet proportionem triplicatam proportionis primæ lineæ ad secundam, nimirum laterum homologorum.

THEOR. 29. PROPOS. 34.

Equalium solidorum parallelepipedorum bases, & altitudines reciprocantur; Et quorum solidorum parallelepipedorum bases, & altitudines reciprocantur; illa sunt æqualia.

TAB. XXXI. FIG. 6. Sint æqualia parallelepipeda ADCB, EHGF, super bases AD, EH. Dico bases AD, EH, & altitudines parallelepipedorum ADCB, EHGF, esse reciprocas, hoc est, esse ut AD, ad EH, ita altitudinem solidi EHGF, ad altitudinem solidi ADCB. Sint enim primum insistentes lineæ AI,

AI, EK, perpendiculares ad bases AD, EH, ita ut AI, EK, sint per defn. 4. lib. 6. altitudines parallelepipedorum. Si igitur altitudines AI, EK, sunt æquales; cum & parallelepipeda æqualia ponantur; erunt & bases AD, EH, æquales, per ea, quæ ad finem propos. 31. hujus lib. ostendimus. Quare erit, ut basis AD, ad basin EH, ita altitudo EK, ad altitudinem AI: Ac proinde bases & altitudines sunt reciprocæ.

Quod si altitudines AI, EK, inæquales fuerint; sit EK, major, ex qua abscindatur EL, ipsi AI, æqualis; & per L, ducatur planum LM, parallelum basi EH, per scholium propos. 15. hujus lib. Quoniam igitur æqualia sunt solida ADCB, EHGF; erit ut ADCB, ad solidum EHML, ita EHGF, ad idem solidum EHML: Ut autem solidum ADCB, ad solidum EHML, ita est basis AD, ad basin EH, cum æquales ponantur altitudines AI, EL, ut solidum EHGF, ad solidum EHML, ita est eadem ratione basis KN, ad basin LN, cum hac ratione solida EHGF, EHML, eandem habeant altitudinem, si nimirum bases ponantur KN, LN; erunt enim inter eadem plana parallela KN, GH. Igitur erit ut basis AD, ad basin EH, ita basis KN, ad basin LN: Sed ut KN, ad LN, ita est recta EK, ad rectam EL, hoc est, ad AI, ipsi EL, æqualem. Quare erit ut basis AD, ad basin EH, ita altitudo EK, ad altitudinem AI; Ac propterea reciprocæ sunt bases, & altitudines.

Sint jam bases & altitudines reciprocæ. Dico parallelepipeda esse æqualia. Si enim altitudines EK, AI, sunt æquales; cum sit basis AD, ad basin EH, ut altitudo EK, ad altitudinem AI, ex hypothesi; erunt & bases AD, EH, æquales. Quare parallelepipeda ADCB, EHGF, cum æquales habeant bases, & altitudinem eandem, inter se æqualia erunt.

Quod si altitudo EK, major fuerit, abscindatur EL, ipsi AI, æqualis, & per L, ducatur planum LM, parallelum basi EH. Quia igitur

333 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

ex hypothesi est, ut basis AD, ad basin EH, ita altitudo EK, ad altitudinem AI, hoc est, ad
 e32. und. EL, ipsi AI, æqualem; Et autem basis AD, ad basin EH, ita est solidum ADCB, ad solidum EHML, cum altitudines AI, EL, æquales ponantur. f Et ut EK, ad EL, ita est, KN, ad
 f 1. sext. LN; g Ut autem basis KN, ad basin LN, ita est solidum EHGF, ad solidum EHML, cum solida EHGF, EHML, eandem habeant altitudinem, si bases ponantur KN, LN; erunt enim hac ratione inter plana parallela KN, GH; Erit ut solidum ADCB, ad solidum EHML, ita solidum
 h9. quint. EHGF, ad idem solidum EHML; b ideoque æqualia erunt solida ADCB, EHGF.

F A B. Sed proponantur jam parallelepipeda ABCD, XXXII. EFGH, æqualia, quorum insistentes lineæ AI, KD, BM, LC; EN, OH, PQ, PG, non sint perpendicularares ad bases AB, EF. Demittantur autem à punctis I, D, M, C, ad planum basis AB, perpendicularares IR, DS, MV, CT; n Item à punctis N, H, Q, G, ad planum basis EF, perpendicularares NX, HY, Qa, GZ: connectanturque rectæ RS, TV, RT, SV; XY, Za, XZ, Ya: Eruntque perpendicularares RI, XN, parallelepipedorum altitudines, ex defin. 4. lib. 6. Dico rursus, ut basis AB, ad basin EF, ita esse altitudinem XN, ad altitudinem RI. Cum enim æqualia sint solida ABCD, EFGH, ex hypothesi, sit autem ABCD, æquale solido RVCD, quod habeant eandem basin CD, eandemque altitudinem RI; & EFGH, eadem ratione, æquale solido XaGH: Erunt & parallelepipeda RVCD, XaGH, æqualia. Quare cum habeant insistentes lineas perpendicularares ad bases CD, GH; erit, ut jam demonstratum est, ut basis CD, ad basin GH, hoc est, ut basis AB, ad basin EF, ita altitudo XN, ad altitudinem RI. Ac propterea bases & altitudines sunt reciproca.
 i 29. vel 30. und. Sint jam bases atque altitudines reciproca. Dico parallelepipeda esse æqualia. Constructa enim figura, ut prius; Cum sit ut basis AB, ad basin EF,

Fig. 2.






Fig. 5.






Fig. 7.





EF, ita altitudo XN, ad altitudinem RI; / Sit ^{124. m. d.} autem AB, ipsi CD, & EF, ipsi GH, æqualis; erit quoque ut basis CD, solidi RVCD, ad basin GH, solidi XaGH, ita altitudo XN, ad altitudinem RI. Quare cum XN, RI, sint insistentes lineæ perpendiculares ad bases CD, GH; erunt; ut jam ostensum est, æqualia parallelepipeda RVCD, XaGH. ^{m 29. vel 30. m. d.} Sunt autem hæc parallelepipeda parallelepipedis ABCD, EFGH, æqualia. Igitur quoque æqualia erunt parallelepipeda ABCD, EFGH: Idemque ostendetur, si insistentes lineæ unius parallelepipedi fuerint perpendiculares ad basin, alterius vero non. Quamobrem, Æqualium solidorum parallelepipedorum bases, & altitudines reciprocantur, &c. Quod erat ostendendum.

S C H O L I U M.

Omnia hæc quæ demonstrata sunt in sex proximis propositionibus, nimirum 29, 30, 31, 32, 33, & 34. conveniant quoque prismatis, quæ habent duo plana opposita triangularia, si prædictæ hypotheses serventur. Nam si duobus prismatis ejusmodi ejusdem altitudinis, & super eandem basin, vel super æquales bases constitutis, apponantur duo alia prismata illis æqualia & similia, conscribentur duo parallelepipeda ejusdem altitudinis, & super eandem, vel æquales bases existentia. ^{m 19, 30. vel 31. m. d.} Quare æqualia erunt ejusmodi parallelepipeda; ac prout & data prismata, eorum videlicet dimidia.

Rursus, si duobus prismatis prædictis ejusdem altitudinis, & super diversas bases constitutis adjiciantur duo alia prismata illis æqualia & similia, conscribentur iterum duo parallelepipeda ejusdem altitudinis. ^{o 31. m. d. o 15. quind.} Quare erit parallelepipedum ad parallelepipedum, ut basis ad basin; & Atque adeo prisma ad prisma, nempe dimidium unius parallelepipedi, ad dimidium alterius, ut eadem basis ad basin, si prismatum bases fuerint parallelogramma, vel certe ut triangulum ad triangulum, dimidium scilicet unius basis ad dimidium alterius, si bases prismatum fuerint triangula.
Præte-

334 EUCLIDIS GEOMETRIA.

- Præterea, si duobus prismatis præfatis similibus addantur alia duo prismata illis equalia & similia, p 33. und. confluentur duo parallelepipeda similia, quæ inter se habent proportionem triplicatam proportionis laterum homologorum, Igitur & prismata, eorum nimis- ruz dimidia, quæ eandem habeant proportionem eam parallelepipedis, proportionem habebunt triplicatam proportionis eorundem laterum homologorum, quæ quoque sunt latera homologa prismatum.
- Denique si dictis duobus prismatis equalibus ad- jungantur alia duo prismata illis equalia & similia, componantur duo parallelepipeda equalia eorundem r 34. und. altitudinum cum prismatis. Quare cum bases, & altitudines parallelepipedorum sint reciproca; & bases prismatum eadem sint, vel certe triangula earum r 15. quim. dimidia se eandem habentia proportionem; Erunt quoque bases prismatum & eorum altitudines reciproca.

xxxvii. THEOR. 30. PROPOS. 35.

Si fuerint duo plani anguli æquales, quo- rum verticibus sublimes rectæ lineæ insistant, quæ cum lineis primo positis angulos conti- neant æquales, utrumque utrique; In subli- mibus autem lineis quælibet sumpta fuerint puncta, & ab his ad plana, in quibus con- stant anguli primum positi, ductæ fuerint perpendiculares; à punctis vero, quæ in pla- nis à perpendicularibus fiunt, ad angulos primum positos adjunctæ fuerint rectæ lineæ: Hæ cum sublimibus æquales angulos com- prehendunt.

T. AB. **XXXII.** Sint duo anguli plani æquales BAC, EDF, quorum verticibus A, & D, insistant extra ipforum plana sublimes rectæ lineæ, AG, DH, ita ut angulus BAG, angulo EDH, & angulus CAG, angulo FDH, sit æqualis: à sumptis au- tem punctis G, H, in rectis AG, DH, demit- tantur

tantar ad plana, in quibus anguli BAC, EDF, existunt, perpendiculares GI, HK, incidentes in puncta I, K, & adjungantur rectæ IA, KD. Dico angulos GAI, HDK, esse æquales inter se; Nam si AG, DH, sunt inæquales auferatur à majori AG, ipsi DH, æqualis linea AL, & ex L, in plano trianguli AGI, ducatur ipsi GI, parallela LM. Quoniam igitur parallele sunt GI, LM, & est GI, ad planum anguli BAC, recta; erit quoque LM, ad idem planum recta: ducantur autem ex punctis M, K, ad rectas AB, AC, DE, DF, perpendiculares MB, MC, KE, KF, & connectantur rectæ BC, BL, LC, EF, EH, HF. Et quia LM, recta est ad planum anguli BAC, ipsa rectum angulum efficiet cum recta AM, in eodem plano ducta per desin. 3. hujus lib. *b47. primæ*

Quare quadratum rectæ AL, æquale erit quadratis rectarum AM, ML; Est autem quadratum rectæ AM, æquale quadratis rectarum AC, CM, cum & angulus ACM, rectus sit, ex constructione. Quadratum ergo rectæ AL, æquale est quadratis rectarum AC, CM, ML: At quadratis rectarum CM, ML, æquale est quadratum rectæ CL, cum angulus CML, rectus sit per desin. 3. hujus lib. Igitur quadratum rectæ AL, æquale est quadratis rectarum AC, CL; Ac proinde angulus ACL, rectus erit. *c48. primæ*

Rursus quia quadratum rectæ AL, æquale est quadratis rectarum AM, ML: Est autem quadratum rectæ AM, æquale quadratis rectarum AB, BM, cum angulus ABM, per constructionem, sit rectus. Igitur quadratum rectæ AL, æquale est quadratis rectarum AB, BM, ML: At quadratis rectarum BM, ML, æquale est quadratum rectæ BL, quod & angulus BML, sit rectus ex desin. 3. hujus lib. Quadratum ergo rectæ AL, æquale est quadratis rectarum AB, BL; proptereaque angulus ABL, erit rectus. *f47. primæ*

Non aliter ostendentur recti anguli DFH, DEH. Quoniam igitur anguli ABL, LAB, trianguli ABL, æquales sunt angulis DEH, *g47. primæ*

h47. primæ

i48. primæ

DEH, HDE; trianguli DEH; suntque latera
26. primi AL, DH, æqualia; Erunt & reliqua latera AB,
 BL, reliquis lateribus DE, EH, æqualia. Eodem
 argumento æquales erunt rectæ AC, CL, rectis
 DF, FH. Quare cum latera AB, AC, triangu-
 li ABC, æqualia sint lateribus DE, DF, trian-
 guli DEF; & anguli contenti BAC, EDF, æ-
 quales, ex hypothesi; Erunt & bases BC, EF,
 inter se, & anguli ABC, ACB, angulis DEF,
 DFE, æquales. Sunt autem & toti anguli ABM,
 ACM, totis angulis DEK, DFK, æquales; cum
 omnes sint recti. Igitur & reliqui anguli MBC,
 MCB, reliquis angulis KEF, KFE, æquales
 erunt; Ac propterea cum & latera BC, EF,
 sint ostensa æqualia; Erunt latera BM, CM,
 lateribus EK, FK, æqualia. Quia igitur latera
 AC, CM, trianguli ACM, æqualia sunt ostensa
 lateribus DF, FK, trianguli DFK, & anguli
 ACM, DFK, sunt recti; Erunt & bases AM,
 DK, inter se æquales. Cum autem æquales sint
 ostensa rectæ BL, EH, erunt etiam earum qua-
 drata æqualia. Quia vero quadratum rectæ
 BL, æquale est quadratis rectarum BM, ML,
 & quadratum rectæ EH, quadratis rectarum EK,
 KH, quod anguli BML, EKH, recti sint, ex
 defin. 3. hujus lib. Erunt & quadrata rectarum
 BM, ML, æqualia quadratis rectarum EK, KH.
 Ablatis ergo quadratis rectarum BM, EK, quæ
 æqualia sunt, quod rectæ BM, EK, ostensa sint
 æquales; reliqua quadrata rectarum LM, HK,
 æqualia erunt; ac proinde rectæ LM, HK, æ-
 quales. Quam ob rem cum latera AL, AM,
 trianguli ALM, æqualia sint lateribus DH, DK,
 trianguli DHK, & basis LM, basi HK, æqua-
 lis; Erunt & anguli LAM, HDK, æquales.
8. primi Si igitur fuerint duo anguli plani æquales, quo-
 rum verticibus sublimes rectæ lineæ insistant, &c.
 Quod ostendendum erat.

COROLLARIUM.

Itaque, si fuerint duo anguli plani æquales, quorum verticibus sublimes rectæ lineæ æquales insistant, quæ cum lineis primo positis angulos contineant æquales, utramque utrique. Erunt à punctis extremis linearum sublimium ad planum angulorum primo positum demissæ perpendiculares inter se æquales. Nam propterea quod anguli plani BAC, EDF, ponuntur æquales, & sublimes æquales AL, DH, constituent angulos æquales LAB, HDE. Item LAC, HDF: demonstratum fuit, demissas perpendiculares LM, HK, esse æquales.

THEOR. 31. PROPOS. 36. xxxvij.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint: Quod ex his tribus fit solidum parallelepipedum, æquale est descripto à media lineæ solido parallelepipedo, quod æquilaterum quidem sit, æquiangulum vero prædicto.

Sint continue proportionales rectæ A, B, C. TAB. XXXII.
 Constituaturque angulus solidus E, ex tribus fig. 3.
 angulis planis quibuscunque DEF, DEG, FEG, ita ut recta DE, ipsi A; & EF, ipsi B; & EG, ipsi C, sit æqualis. Completis autem parallelogrammis DF, FG, GD, perficiatur parallelepipedum DH; quod sub tribus rectis A, B, C, dicitur contineri, aut ex ipsis fieri. a 16. sum.
 Deinde ad rectam IK, ejusque punctum K, fiat solidus angulus K, æqualis solido angulo E, ex tribus angulis planis IKL, IKM, LKM, qui æquales sint tribus DEF, DEG, FEG, ita ut rectæ IK, KL, KM, æquales sint mediæ lineæ B. Completis vero parallelogrammis IL, LM, MI, perficiatur parallelepipedum IN, quod contineri dicitur sub lineæ B, seu ex ipsa describi. Dico solidum DH, æquale esse solido IN. Cum enim sit ut DE, ad IK, ita KM, ad EG, (quod DE, ipsi A; & IK, KM, ipsi B; & EG, ipsi C, sumpta
Y

338 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

sumpta sit æqualis,) & anguli DEG, IKM, æ-
 b 14. *cas.* quales. 6 Erunt parallelogramma DG, IM, æ-
 qualia, propterea quod latera habent circa æqua-
 les angulos reciproca: Quoniam vero anguli
 plani DEG, IKM, sunt æquales, quorum ver-
 ticibus insunt sublimes lineæ æquales EF, KL,
 quæ æquales angulos comprehendunt cum lineis
 primo positis, ex constructione, utrumque utri-
 que; Erunt perpendiculares ex F, L, ad planâ
 basium DG, IM, demissæ, nimirum altitudines
 parallelepipedorum DH, IN, si bases sint DG,
 IM, inter se æquales, per coroll. propof. præ-
 cedentis. c Quare parallelepipeda DH, IN; (Cum
 f 31. *cas.* habeant bases DG, IM, æquales, & æquales
 quoque altitudines,) inter se æqualia erunt. Si
 tres igitur rectæ lineæ proportionales fuerint, &c.
 Quod erat demonstrandum.

xxxix. THEOR. 32. PROPOS. 37.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fue-
 rint: & solida parallelepipeda quæ ab ipsis
 & similia, & similiter describuntur, pro-
 portionalia erunt. Et si solida parallelepipe-
 da, quæ & similia, & similiter describun-
 tur, fuerint proportionalia: Et ipsæ rectæ
 lineæ proportionales erunt.

TAB. XXXII.
 fig. 4. Sint quatuor rectæ proportionales A, B, C, D;
 ut quidem A, ad B, ita C, ad D; constitu-
 anturque super A, & B, duo parallelepipeda A,
 & B, similia, similiterque descripta; item super
 C, & D, alia duo C, & D, similia similiterque
 posita, sive hæc sint illis similia, sive non. Dico
 esse quoque solida A, B, C, D, proportionalia;
 Ut quidem solidum A, ad solidum B, ita soli-
 dum C, ad solidum D. Inveniantur enim per
 scholium propof. 11. lib. 6. duabus rectis A, B,
 aliz duæ continue proportionales E, F. Item
 duabus C, D, aliz G, H. Quoniam igitur sunt
 quatuor

quatuor lineæ A, B, E, F, & quatuor lineæ alia C, D, G, H, quæ binæ in eadem ratione sumuntur; erit ex æquo, ut A, ad F, ita C, ad H. Ut autem A, ad F, ita est solidum A, ad solidum B, & ut C, ad H, ita solidum C, ad solidum D, ex coroll. propof. 33. hujus lib. Igitur erit ut solidum A, ad solidum B, ita solidum C, ad solidum D. Quod est propositum.

Sint jam è contrario solida A, B, C, D, proportionalia. Dico rectas A, B, C, D, esse quoque proportionales: a Tribus enim rectis A, B, C, inveniatur quarta proportionalis I, b super quam describatur parallelepipedum ipsi D, vel C, simile, similiterque positum. Quoniam igitur est, ut recta A, ad rectam B, ita recta C, ad rectam I; erit quoque, ut jam est ostensum, ut solidum A, ad solidum B, ita solidum C, ad solidum I. Ut autem solidum A, ad solidum B, ita ponitur quoque solidum C, ad solidum D: Igitur erit ut solidum C, ad solidum I, ita idem solidum C, ad solidum D. c Atque idcirco æqualia erunt solida I, & D. Quæ cum sint similia similiterque descripta, continebuntur planis æqualibus, per defn. 10. hujus lib. Sed plana æqualia, & similia habent latera homologa æqualia, per lemma propof. 22. lib. 6. Igitur rectæ I, & D, æquales sunt. Ac propterea erit, ut recta C, ad I, rectam, ita eadem C, ad rectam D. Posita est autem C, ad I, ut recta A, ad B. Quare erit ut recta A, ad rectam B, ita recta C, ad rectam D. Itaque si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, &c. Quod erat demonstrandum.

Brevius tota hæc propositio demonstrabitur cum Theone, hoc modo. Ponatur primum ut recta A, ad rectam B, ita recta C, ad rectam D. Dico esse quoque ut solidum A, ad solidum B, ita solidum C, ad solidum D. d Cum enim sit proportio solidi A, ad solidum B, triplicata proportionis rectæ A, ad rectam B; Item proportio solidi C, ad solidum D, triplicata proportionis

30 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

rectæ C, ad rectam D: erunt proportionēs solidi A, ad solidum B, & solidi C, ad solidum D, æquales; quandoquidem triplicatæ sunt proportio-
 num æqualium, nempe rectæ A, ad rectam B, & rectæ C, ad rectam D. Quod est primum.
 Rurſus ponatur ſecundo eſſe ut ſolidum A, ad ſolidum B, ita ſolidum C, ad ſolidum D. Dico eſſe quoque, ut rectam A, ad rectam B, ita re-
 ctam C, ad rectam D. Cum enim ſit propor-
 tio ſolidi A, ad ſolidum B, triplicata proportio-
 nis rectæ A, ad rectam B. Item proportio ſoli-
 di C, ad ſolidum D, triplicata proportionis rectæ C, ad rectam D: erunt proportionēs rectarum A, ad B, & C, ad D, æquales; quandoquidem earum proportionēs triplicatæ, nimirum ſolidi A, ad ſolidum B; & ſolidi C, ad ſolidum D, æqua-
 les ponuntur. Quod eſt ſecundum.

THEOR. 33. PROPOS. 38.

Si planum ad planum rectum fuerit; & ab aliquo puncto eorum, quæ in uno ſunt planorum, ad alterum planum perpendicularis ducta fuerit: in communem ſectionem cadet planorum ducta perpendicularis.

T. A. B. PLANUM enim AB, rectum ſit ad planum AC, **XXXII.**
 ſitque eorum communis ſectio recta AD; & **Fig. 5.**
 ab E, puncto plani AB, ad planum AC, per-
 pendicularis demittatur: quam dico cadere in
 communem ſectionem AD. Nam ſi fieri poteſt,
 cadat extra ad punctum F, & ab F, in plano
 AC, ducatur ad rectam AD, perpendicularis
 FG; connectaturque recta EG, in plano AB.
 Quoniam igitur FG, perpendicularis eſt ad com-
 munem ſectionem AD, erit quoque perpendicu-
 laris ad planum AB, ex defin. 4. huius lib. at-
 que adeo & ad rectam GE, per 3. defin. huius
 lib. Eſt autem & EF, recta ad FG, per eandem
 3. defin. Igitur in triangulo EFG, duo anguli
 EFG,

EFG, EGF, recti sunt, quod est absurdum, cum duobus rectis sint minores. Perpendicularis ergo ex E, demissa ad planum AC, non extra communem sectionem AD, cadet, ergo in ipsam cadat, necesse est. Quamobrem, si planum ad planum rectum fuerit, &c. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 34. PROPOS. 39. XXXI.

Si solidi parallelepipedum eorum, quæ ex adverso, planorum latera bifariam secta sint; per sectiones autem plana sint extensa: communis sectio planorum, & solidi parallelepipedum diameter, bifariam se mutuo secabunt.

Sint parallelepipedum AB, plana opposita AC, TAB; BD, quorum omnia latera bifariam secta sint in punctis I, K, L, M, N, O, P, Q, per quæ extensa sint duo plana IN, KO, quorum sectio communis sit recta RS: Ducatur item diameter AB. Dico rectam RS, & diametrum AB, se mutuo secare bifariam. Connexis enim rectis RB, RD, SA, SC; considerentur duo triangula AQS, COS. Quoniam igitur latera AQ, QS, trianguli AQS, æqualia sunt lateribus CO, OS, trianguli COS; (Sunt enim AQ, CO, dimidia rectarum æqualium AG, CH, & QS, OS, duabus æqualibus AN, HN, æquales, cum sint parallelogramma AS, HS,) & angulus AQS, æqualis alterno angulo COS: Erunt & bases AS, CS, æquales; & anguli ASQ, CSO, æquales. Atqui anguli ASQ, ASO, æquales sunt duobus rectis. Igitur & CSO, ASO, duobus sunt rectis æquales: Ac propterea AS, CS, unam rectam lineam constituent. Eodem modo ostendentur esse æquales BR, DR, & unam ex eis compositi lineam rectam. Rursus quia utraq; AD, BC, parallela est, & æqualis recta FH, ob parallelogramma

342 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

f. 9. und. *g. 3. primi* gramma AF, FC, ipsæ quoque inter se parallelæ erunt, & æquales. Quare & rectæ AC, BD, earum extrema conjungentes, parallelæ sunt & æquales; Ac proinde ipsarum dimidiæ AS, BR, æquales sunt. Quia vero AC, BD, parallelæ sunt; berunt rectæ AB, RS, in eodem cum ipsis plano, ideoque se mutuo secabunt, in puncto videlicet T. Cum autem duo anguli AST, ATS, trianguli AST, æquales sint duobus angulis BRT, BTR, trianguli BRT; & latus AS, lateri BR: Erunt reliqua latera TA, TS, reliquis lateribus TB, TR, æqualia; Ac propterea AB, RS, se mutuo secant bifariam in T. Si igitur solidi parallelepipedorum, quæ ex adverso, &c. Quod erat ostendendum.

C O R O L L A R I U M.

Hinc efficitur, in omni parallelepipedo diametros omnes se mutuo bifariam secare in uno puncto, nimirum in puncto T, in quo bifariam dividunt, ut hic demonstratum est, rectam RS.

xxxii. T H E O R. 35. P R O P O S. 40.

Si fuerint duo prismata æqualis altitudinis, quorum hoc quidem habeat basim, parallelogrammum; illud vero, triangulum; duplum autem fuerit parallelogrammum trianguli: Æqualia erunt ipsa prismata.

TAB. XXXIII. *fig. 1.* SINT duo prismata æqualis altitudinis ABCDEF, GHIKLM, quorum illud basim habeat parallelogrammum ABCD, hoc vero, triangulum GHI; sitque parallelogrammum AC, trianguli GHI, duplum. Dico hæc prismata esse æqualia. Perficiantur enim parallelepipeda AN, GQ; Quod quidem fiet, si plana triangulorum extendantur, perficianturque parallelogramma BN, AO; GP, MQ. Si enim connectantur rectæ NO, PQ, con-

Fig. 6.









Fig. 5.



G

H

constituta erunt duo parallelepipeda AN, GQ, ejusdem altitudinis cum prismatis. Nam plana horum solidorum opposita esse parallela, facile colligetur ex propos. 15. hujus lib. *a* Quoniam *a* 34. *prism* igitur parallelogrammum GP, duplum est trianguli GHI; Ponitur autem & parallelogrammum AC, ejusdem trianguli GHI, duplum: æqualia erunt parallelogramma AC, GP. *b* Quare paral- *b* 31. *mut* lelepipeda AN, GQ, ejusdem altitudinis super æquales bases AC, GP, inter se sunt æqualia; Atque propterea eorum dimidia, nimirum prismata ABCDEF, GHIKLM, (*c* nam parallelepiped- *c* 28. *mut* a AN, GQ, per diametros CF, DE, HI, LK, planorum adversorum secantur bifariam, in bina scilicet prismata) æqualia quoque sunt inter se. Itaque si fuerint duo prismata æqualis altitudinis, &c. Quod erat demonstrandum,





E U C L I D I S

E L E M E N T U M

D U O D E C I M U M.

Et solidorum secundum.

U N D E T H E O R. I. P R O P O S. I.

Quæ in circulis polygonæ similia ; inter se sunt , ut à diametris quadrata.

TAB.
XXXIII.
fig. 2.

Sint duo polygonæ similia ABCDE, FGHIK, descripta in circulis, quorum diametri AL, FM. Dico ita esse polygonum ABCDE, ad polygonum FGHIK, ut quadratum diametri AL, ad quadratum diametri FM. Subtendantur enim angulis æqualibus ABC, FGH, rectæ AC, FH, & connectantur rectæ BL, GM. Quoniam igitur ob similitudinem polygonorum est, ut AB, ad BC; ita FG, ad GH; erunt triangula ABC, FGH, æquiangula, cum circa angulos æquales ABC, FGH, habeant latera proportionalia : *b* Est autem angulus ALB, angulo ACB; & angulus FMG, angulo FHG, æqualis. Igitur & anguli ALB, FMG, æquales erunt. Cum ergo & anguli ABL, FGM, æquales sint, *c* nempe recti in semicirculis existentes; *d* erunt & reliqui BAL, GFM, æquales. *e* Quare erit ut AL, ad AB, ita FM, ad FG; & permutando, ut AL, ad FM, ita AB, ad FG.

LIBER DUODECIMUS. 345

FG. figitur est ut quadratum ex AL; ad qua- ^{f 22. fens.}
 dratum ex FM, ita polygonum ABCDE, super
 AB, ad polygonum FGHK, super FG; cum
 tam quadrata, quam polygona sint figuræ simi-
 les, similiterque descriptæ. Quæ itaque in circulis
 polygona similia; inter se sunt, ut à diametris
 quadrata. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 2. PROPOS. 2. ¶.

Circuli inter se sunt, quemadmodum
 à diametris quadrata.

Sint duo circuli ABCD, EFGH, quorum dia- ^{TAB.}
 metri AC, EG. Dico esse, ut quadratum ^{XXXIII,}
 diametri AC, ad quadratum diametri EG, ita ^{f. 3.}
 circumulum ABCD; ad circumulum EFGH. Si enim
 res non ita se habet; Sit ut quadratum diametri
 AC, ad quadratum diametri EG, ita circumulus
 ABCD, ad aliquam magnitudinem, nempe ad I,
 quæ vel minor erit, vel major circulo EFGH.
 Si enim esset æqualis, haberet circumulus ABCD, ^{a 7. quæ.}
 ad circumulum EFGH, & ad I, eandem propor-
 tionem; ac propterea esset circumulus ABCD, ad
 circumulum EFGH, ut quadratum diametri AC,
 ad quadratum diametri EG, quod non concedi-
 tur. Sit ergo primum I, minor, quam circumulus
 EFGH, magnitudine scilicet K, ita ut circumulus
 EFGH, æqualis sit magnitudinibus I, & K, si-
 mul. Inscrubatur in circulo EFGH, quadratum
 EFGH; quod quia dimidium est quadrati cir-
 ca eundem circumulum descripti, ut ad propos.
 9. lib. 4. ostendimus, majus erit, quam di-
 midium circuli EFGH. Secentur bifariam per
 ripheriæ EF, FG, GH, HE, in punctis L,
 M, N, O, adjunganturque rectæ LE, LF,
 MF, MG, NG, NH, OH, OE. Ducatur per
 L, recta TV, tangens circumulum in L, quæ pa-
 rallela erit ipsi EF, ut ad propos. 27. lib. 3.
 ostendimus, occurratque rectis HE, GF, pro-
 ductis in T, & V. Quia ergo triangulum ^{b 4. f. 1.}
 Y 5 ELF,

ELF, dimidium est parallelogrammi TEFV; majus erit triangulum ELF, quam dimidium segmenti circuli ELF. Eadem ratione sunt reliqua triangula majora, quam dimidia segmentorum, in quibus sunt. Omnia igitur triangula simul majora sunt, quam dimidium omnium segmentorum simul. Quod si rursus peripherie EL, LF, &c. secentur bifariam, & adjungantur rectae lineae, constituentur eodem modo triangula, quae majora erunt simul, quam dimidium omnium segmentorum simul, in quibus sunt; & sic deinceps. Quoniam vero, si à circulo EFGH, auferatur plus quam dimidium, nempe quadratum EFGH; & à reliquis segmentis plus quam dimidium, nempe triangula ELF, FMG, &c. atque in hunc modum semper fiat detractio; relinquitur tandem minor magnitudo, quam K, recessus inter circumulum EFGH, & magnitudinem I, uti ex subiecto lemmate constat. Si jam circuli segmenta relicta EL, LF, FM, &c. simul sumpta minor, quam magnitudo K. Cum igitur circumulus EFGH, aequalis ponatur magnitudinibus I, & K, simul; si ex circumulo detrahantur dicta segmenta, & ex I, & K, ipsa magnitudo K, quae major est praefatis circuli segmentis; erit reliquum polygonum ELFMGNHO, majus reliqua magnitudine I. Inscribebatur in circulo ABCD, polygonum APBQCRDS, simile polygono ELFMGNHO. Quod quidem facile fiet, si semicirculi ABC, ADC, bifariam secentur in B, & D; & rursus circumferentiae AB, BC, CD, DA, bifariam in P, Q, R, S; & sic deinceps, donec in tot partibus aequales divisa sit circumferentia ABCD, in quot distributa est circumferentia EFGH. Nam junctis rectis AP, PB, BQ, &c. erit figura inscripta similis figurae ELFMGNHO, ut patet.

à i. dicit. Quoniam igitur est polygonum APBQCRDS, ad polygonum ELFMGNHO, ut quadratum diametri AC, ad quadratum diametri EG, hoc est, per hypothesin, ut circumulus ABCD, ad I: Est autem polygonum APBQCRDS, minus erit

erit circulo ABCD. Igitur & polygonum ^{14. quatuor} ELFMGNHO, minus erit quam I. Ostensum autem est & majus. Quod est absurdum. Non igitur minor est magnitudo I, circulo EFGH.

Quamquam autem in figura confertur major circulus cum minore; eodem tamen modo demonstrabimus, minorem circulum EFGH, non posse ad magnitudinem, quæ minor sit, quam major circulus ABCD, habere eandem proportionem, quam habet quadratum diametri minoris EG, ad quadratum majoris diametri AC; Ita ut generaliter & universe demonstratum sit, nunquam quadratum diametri alicujus circuli ad quadratum diametri alterius circuli eandem habere posse proportionem, quam habet prior circulus ad magnitudinem posteriore circulo minorem: sive prior circulus major sit posteriore, sive minor.

Sit deinde magnitudo I, major circulo EFGH. Cum ergo ponatur circulus ABCD, ad I, esse ut quadratum diametri AC, ad quadratum diametri EG; erit & convertendo I, ad circulum ABCD, ut quadratum diametri EG, ad quadratum diametri AC. Ponatur ut I, ad circulum ABCD, ita circulus EFGH, ad magnitudinem aliquam, nempe ad K. Et quia I, major ponitur circulo EFGH, ^{14. quatuor} major quoque erit circulus ABCD, magnitudine K. Quare erit ut quadratum diametri EG, ad quadratum diametri AC, ita circulus EFGH, ad magnitudinem K, quæ minor est circulo ABCD. Quod est absurdum. Ostensum enim est jam in priori parte generaliter, non posse esse ut quadratum diametri ad quadratum diametri, ita circulum ad magnitudinem circulo minorem: sive prior circulus major sit posteriore, sive minor. Quamvis autem circulus ABCD, major est, & EFGH, minor; eadem tamen ratione ostendemus, quadratum diametri circuli EFGH, ad quadratum diametri circuli ABCD, non posse habere eandem proportionem, quam habet circulus EFGH, ad magnitudinem circulo

343 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

circulo ABCD, majorem: quia eodem modo probabimus, (si illud concedatur) quadratum diametri AC, ad quadratum diametri EG, eandem habere proportionem, quam habet circulus ABCD, ad magnitudinem circulo EFGH, minorem, quod falsum esse jam in priori parte generaliter demonstratum est: Ita ut generaliter & univérse quoque demonstratum sit, nunquam quadratum diametri alicujus circuli ad quadratum diametri alterius circuli eandem habere posse proportionem, quam habet prior circulus ad magnitudinem posterioris circulo majorem, sive prior circulus major sit posteriore, sive minor. Non ergo major est magnitudo I, circulo EFGH: Sed neque minor est ostensa, æqualis igitur est. Quare cum ponatur, ut quadratum diametri AC, ad quadratum diametri EG, ita circulus ABCD, ad I; *g7. p. 16.* sit autem ut circulus ABCD, ad I, ita idem circulus ABCD, ad circulum EFGH, qui æqualis est magnitudini I; Erit quoque ut quadratum diametri AC, ad quadratum diametri EG, ita circulus ABCD, ad circulum EFGH, sive circulus ABCD, circulo EFGH, major sit, sive minor. Circuli igitur inter se sunt, quemadmodum à diametris quadrata. Quod erat ostendendum.

C O R O L L A R I U M.

Hinc fit, ita esse circulum ad circulum, ut polygonum in illo descriptum ad polygonum simile in hoc descriptum. Quoniam tam circulus ad circulum, quam polygonum ad polygonum est, ut quadratum diametri ad quadratum diametri, veluti demonstratum est.

L E M M A.

Duabus magnitudinibus inæqualibus propositis si à majore auferatur major quam dimidium; & ab eo, quod reliquum est, rursus detrahatur major quam

quam dimidium; & hoc semper fiat: relinquatur tandem quadam magnitudo, qua minor erit proposita minore magnitudine.

Proposita sint duae magnitudines inaequales AB , TAB ,
 & C , quarum AB , sit major. Dico si ex AB , $XXXIII$,
 auferatur majus quam dimidium; & ab eo, quod $fig. 4$.
 reliquum est, rursus majus quam dimidium; atque
 hoc semper fiat: relinquitur tandem magnitudinem quan-
 dam, qua minor sit quam C . Multiplicetur enim
 C , toties, donec magnitudo facta DE , major sit
 quam AB , ita ut DE , sit multiplex ipsius C ,
 proxime major quam AB . Divisa autem DE , in
 partes DF , FG , GE , ipsi C , aequales, detrahatur
 ex AB , majus quam dimidium AH , & ex reli-
 qua HB , majus quam dimidium HI ; atque hoc
 semper fiat, donec partes ipsius AB , multitudine
 aequales sint partibus ipsius DE . Sint ergo jam par-
 tes AH , HI , IB , ut, quot sunt ipsa DF , FG ,
 GE . Quia igitur DE , major est quam AB ; At
 ex DE , ablatum est DF , minus quam dimidium,
 vel certe dimidium; si DE , ipsius C , sit duplex;
 ex AB , vero majus quam dimidium AH : Erit re-
 liquum FE , reliquo HB , majus. (Cum enim
 DE , major sit quam AB ; si ex DE , dimidium
 auferetur, nec non & ex AB , dimidium, esset
 quoque reliquum ex DE , majus reliquo ex AB .
 Si ergo ex DE , auferatur minus quam dimidium,
 vel certe dimidium, & ex AB , majus quam di-
 midium; erit reliquum ex DE , majus reliquo ex
 AB .) Rursus quoniam FE , major est quam HB ,
 auferaturque ex FE , dimidium FG , vel certe minus
 quam dimidium, si FE , major sit quam duplex
 ipsius C , at ex HB , majus quam dimidium HI ,
 erit eodem modo reliquum GE , majus reliquo IB :
 atque

30 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

atque ita procedendo ostendimus tantam postremam partem ipsius DE, qualis hic est GE, majorem esse postrema parte ipsius AB, qualis hic est IB. Cum ergo GE, postrema pars ipsius DE, equalis sit GE, erit quoque C, major quam IB, postrema pars ipsius AB. Relicta igitur est IA, magnitudo, que minor est magnitudine C. Quare duobus magnitudinibus inæqualibus propositis, si à majore auferatur majus, &c. Quod erit demonstrandum.

Idem demonstrabitur, si ex AB, auferatur dimidium AH, & ex reliqua HB, rursus dimidium HI, &c. Nam eadem ratione erit reliquum FE, majus reliquo IB, nec non & reliquum GE, majus reliquo IB; cum ex majore DE, ablatum sit DF, minus quam dimidium, vel certe dimidium; & ex minori AB, dimidium AH, &c.

15. THEOR. 3. PROPOS. 3.

Omnis pyramis triangularem habens basim, dividitur in duas pyramides æquales, & similes inter se, triangulares habentes bases; & similes toti; Et in duo prismata æqualia, quæ duo prismata majora sunt dimidio totius pyramidis.

TAB. XXXIII. fig. 5, 6. Sit pyramis, cujus basis triangulum ABC, vertex D. Secentur omnia ejus latera bitariam in E, F, G, H, I, K, connectanturque rectæ EF, FG, GE, HI, IK, KH, HG, HE, EI, IF. Divisa itaque est pyramis in duas pyramides AEGH, HIKD, quarum bases triangula AEG, HIK, vertexes H, D; nec non in duo solida prismata, quorum illius basis est parallelogrammum ECFG, & triangula opposita EHG, BIF; hujus vero basis est triangulum CFG, cui oppositum

LIBER DUODECIMUS. 353

ntur triangulum KIH , habentque hæc prismata terminum communem, parallelogrammum $FGHI$; & cum duabus illis pyramidibus componunt totam pyramidem, ut constat, si recte concipiatur pyramidis vertex D , in sublimi, nec non ejus triangula circumjacentia. Dico igitur duas illas pyramides esse æquales, & similes inter se; & similes toti; Item duo hæc prismata esse inter se æqualia, & majora dimidio totius pyramidis. Cum enim latera AD , BD , trianguli ADB , secta sint bifariam, ac proinde proportionaliter, *a 2. sect.* erunt HI , AB , parallele. Eadem ratione parallele erunt IK , BC , & HK , AC ; & EG , BC ; & EF , AC ; & FG , AB ; & EH , BD ; & EI , AD ; & IF , DC ; & HG , DC . *b 9. sect.* Sunt autem & rectæ FG , HI , cum parallele sint ipsi AB ; inter se parallele; Atque eadem ratione parallele sunt GH , FI , cum sint parallele ipsi DC . Quare parallelogramma sunt $AETH$, $HEBI$, $IDHE$, $EBFG$, $GHKC$, $CKIF$, $FGHI$. Quoniam vero rectæ HE , HG , rectis DB , DC , sunt parallele; erunt anguli EHG , BDC , æquales: Ac eadem *c 10. sect.* ratione æquales erunt anguli HEG , DBC ; & HGE , DCB . *d 4. sect.* Proportionalia igitur sunt latera trianguli HEG , lateribus trianguli DBC , circa æquales angulos; ac proinde simile est triangulum HEG , triangulo DBC . Sunt autem & triangula HAE , HAG , AEG , triangulis DAB , DAC , ABC , similia per coroll. propof. 4. lib. 6. Pyramis ergo $AEGH$, pyramidi $ABCD$, similis est, per defin. 9. lib. 13. Rursus quia rectæ HI , HK , rectis AB , AC , sunt parallele, erunt anguli IHK , BAC , æquales. Eadem ratione æquales erunt anguli HIK , ABC ; & HKI , ACB . Quare latera trianguli HIK , lateribus trianguli ABC , circa æquales angulos sunt proportionalia; ac propterea triangulum HIK , triangulo ABC , simile est: Sunt autem & triangula DHI , DIK , DKH , triangulis DAB , DBC , DCA , similia, per idem coroll. propof. 4. lib. 6. Pyramis ergo $HIKD$, similis est quoque eidem pyramidi $ABCD$, per

350 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

per defn. 9. lib. 11. Quoniam autem, triangula
 AHE, HDI, similia sunt triangulo ADB, ut
 g 21. fecit. ostensum est ex coroll. propof. 4. lib. 6. & ipsa
 quoque inter se similia erunt. Cum igitur sint
 super rectas æquales AH, HD, constituta; ipsa
 erunt æqualia, per lemma propof. 22. lib. 6.
 Simili argumento æqualia erunt & similia trian-
 gula AHG, HDK, cum similia sint ostensa tri-
 angulo ADC, & constituta super æquales rectas
 AH, HD. Pari ratione æqualia, & similia erunt
 triangula AEG, HIK, cum similia sint ostensa
 triangulo ABC, & super rectas posita AE, HI,
 h 34. primi b quæ æquales sunt, ob parallelogrammum AEIH.
 Non secus æqualia erunt & similia triangula
 134. primi EHG, IDK, cum sint ostensa similia triangulo
 BDC, & habeant rectas HE, DI, quæ æquales
 sunt, ob parallelogrammum HEID. Pyramides
 igitur AEGH, HIKD, æquales sunt & similes,
 per 10. defn. lib. 11. quandoquidem omnia tri-
 angula unius æqualia sunt & similia omnibus
 triangulis alterius, ut demonstratum est.
 h 34. primi Rursus, & quia rectæ EH, HG, GE, æquales
 sunt, & parallelæ rectis BI, IF, FB, ob paral-
 lelogramma EHIB, FGHI, BFGE; erunt trian-
 gula EHG, BIF, æquiangula inter se, & æqua-
 lia, per coroll. propof. 8. lib. 1. Ac propterea
 135. unid. & similia: Sunt autem & parallelæ; cum EH,
 HG, per quas ducitur planum EHG, parallelæ
 sint rectis BI, IF, per quas planum BIF, duci-
 tur. Igitur solidum BIFGHE, contentum duo-
 bus triangulis EHG, BIF, ex aduerso æqualibus
 & similibus, & parallelis; & tribus parallelo-
 grammis EGFB, BEHI, IFGH, prisma est, ex
 defn. Eodem modo prisma ostendetur solidam
 234. primi CFGHIK. Cum enim rectæ FC, CG, GF,
 æquales sint, & parallelæ rectis IK, KH, HI, ob
 parallelogramma CFIK, CGHK, FGHI; erunt
 triangula CFG, HIK, æqualia, & æquiangula in-
 135. unid. ter se, ac propterea similia: Sunt autem & parallelæ,
 quod rectæ CF, CG, per quas ducitur planum CFG,
 parallelæ sint rectis KI, KH, per quas planum
 KIH,

KIH, ducitur. Igitur solidum CFGHIK, contentum duobus triangulis CFG, KIH, ex adverso æqualibus & similibus, & parallelis; atque tribus parallelogrammis CFIK, KHGC, IFGH, prisma est. Quoniam vero prismata EBFGHI, CFGHIK, sunt ejusdem altitudinis, nempe inter plana parallela BCGE, HIK, & parallelogrammum ECFG, basis illius, duplum est trianguli CFG, basis hujus, per scholium propof. 41. lib. 1. Ipsa inter se æqualia erunt.

o 40. ruz;

Denique quia prisina EBFGHI, majus est pyramide EBFI, totum parte; Est autem pyramis EBFI, æqualis & similis pyramidi AEGH, nec non pyramidi HIKD, ut perspicuum est ex æqualitate & similitudine triangulorum: Majora erunt prismata EBFGHI, CFGHIK, pyramidibus AEGH, HIKD. Ac proinde illa quidem dimidium pyramidis ABCD, excedent, hæ vero à dimidio ejusdem deficient. Quando enim totum in duas partes inæquales secatur, major dimidium ejus superat, minor vero à dimidio deficit. Omnis igitur pyramis triangularem habens basin, &c. Quod erat ostendendum.

T H E O R. 4. P R O P O S. 4.

iv;

Si fuerint duæ pyramides ejusdem altitudinis, triangulares habentes bases; sit autem illarum utraque divisa & in duas pyramides æquales inter se, & similes toti; & in duo prismata æqualia; Ac eodem modo divisa sit utraque pyramidum, quæ ex superiore divisione natæ sunt, idque semper fiat; erit ut unius pyramidis basis ad alterius pyramidis basim, ita & omnia, quæ in una pyramide, prismata, ad omnia, quæ in altera pyramide, prismata multitudine æqualia.

¶ Int super bases triangulares ABC, EFG, duæ pyramides ABCD, EFGH, ejusdem altitudinis, T A B:
XXXIII.
fig. 7.

Z

nis,

nis, quarum latera bifariam dividantur in punctis I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, connectanturque rectæ IL, LK, KN, NO, OM, MN, LM, MI; PR, RQ, QT, TV, VS, ST, RS, SP, ita ut pyramis utraque secta sit in binas pyramides æquales inter se, & similes toti, nimirum in AILM, MNOD; EPRS, STVH; & in bina prismata æqualia IBKLMN, CKLMNO; PFQRST, GQRSTV; ut vult propositio præcedens: eodemque modo intelligantur esse divisæ pyramides factæ AILM, MNOD; EPRS, STVH, & sic deinceps. Dico ita esse omnia prismata facta in pyramide ABCD, ad omnia prismata generata in pyramide EFGH, illis multitudine æqualia, ut est basis ABC, ad basin EFG. Cum enim sit ut BC, ad CK, ita FG, ad GQ, eo quod utraque linea divisa est bifariam, sint autem triangula ABC, LKC, similia similiterque posita; Item triangula EFG, RQG, ex coroll. propos. 4. lib. 6. *a* Erit quoque ut triangulum ABC, ad triangulum LKC, ita triangulum EFG, ad triangulum RQG. Et permutando, ut ABC, ad EFG, ita LKC, ad RQG, ita est prisma CKLMNO, ad prisma GQRSTV, ut mox ostendemus, atque ideo ita prisma IBKLMN, ad prisma PFQRST, cum hæc illis sint æqualia: Et ut unum prisma, videlicet IBKLMN, ad unum prisma PFQRST, *b* ita sunt duo prismata IBKLMN, CKLMNO, ad duo prismata PFQRST, GQRSTV. Igitur erunt quoque, ut basis ABC, ad basin EFG, ita duo prismata in pyramide ABCD, ad duo prismata in pyramide EFGH. Simili argumento ostendemus, ita esse bina prismata in pyramidibus AILM, MNOD, factis in pyramide ABCD, ad bina prismata in pyramidibus EPRS, STVH, factis in pyramide EFGH, ut sunt bases AIL, MNO, illarum pyramidum ad bases EPR, STV, harum pyramidum; & sic deinceps eadem semper facta divisione. Sed ut illæ bases ad has, ita est LKC, basis quæ illis est æqualis & similis, ad basin RQG, quæ his est

a 22. *sent.*

b 25. *quint.*

est æqualis, & similis, ut in præcedenti est demonstratum, hoc est, ita est basis ABC, ad basin EFG. Igitur erunt quoque, ut basis ABC, ad basin EFG, ita prismata cujuslibet pyramidis factæ in pyramide ABCD, ad prismata cujuslibet pyramidis factæ in pyramide EFGH: Ac propterea erunt quoque, ut prismata pyramidis ABCD, ad prismata pyramidis EFGH, ita prismata tam pyramidis AILM, ad prismata pyramidis EPRS, quam prismata pyramidis MNOD, ad prismata pyramidis STVH; & ita deinceps. Quare cum sint, ut duo prismata pyramidis ABCD, ad duo prismata pyramidis EFGH, & ita omnia prismata in pyramidibus ABCD, AILM, MNOD, simul ad omnia prismata in pyramidibus EFGH, EPRS, STVH, &c. simul, si hæc illis multitudine sint æqualia; Erunt quoque, ut basis ABC, ad basin EFG, ita omnia prismata in pyramide ABCD, ad omnia prismata in pyramide EFGH. Quocirca si fuerint duæ pyramides ejusdem altitudinis, triangulares habentes bases, &c. Quod erat demonstrandum.

L E M M A.

Quod autem sit LKC, ad QRG, ita prisma CKLMNO, ad prisma GQRSTV, ita ostendemus. Intelligentur ex verticibus D, H, ad bases ABC, EFG, demissa perpendiculares, que erunt altitudines æquales pyramidum ABCD, EFGH. Quoniam igitur plana parallela ABC, MNO, dsecant duas rectas, nempe DC, & perpendicularem ex D, demissam proportionaliter, secatur autem DC, bisariam in O; secabitur quoque perpendicularis ex D, demissa bisariam in puncto, cui planum MNO, occurrat. Eadem ratione perpendicularis ex H, demissa bisariam secabitur à plano STV. Quare cum tota perpendiculares ponantur æquales, erunt & dimidia, nempe prismatum altitudines, æquales; Ac

d. 17. sub.

Z 2 proinde

proinde prismata $CKLMNO$, $GQRSTV$, cum habeant altitudines æquales, inter se erunt, ut bases LKC , RQG , per ea, quæ ad propof. 34. lib. 11. demonstravimus.

THEOR. 5. PROPOS. 5.

Sub eadem altitudine existentes pyramides, & triangulares habentes bases, inter se sunt, ut bases.

TAB. XXXIII. fig. 7. Sint pyramides ejusdem altitudinis $ABCD$, $EFGH$, quarum bases triangula ABC , EFG . Dico esse pyramidem ad pyramidem, ut est basis, ad basin. Si enim non ita sit, ponatur ut basis ABC , ad basin EFG , ita pyramis $ABCD$, ad solidum X ; quod vel minus erit, vel majus pyramide $EFGH$. Sit primo minus, magnitudine Y . Dividatur pyramis $EFGH$, in duas pyramides æquales, & duo prismata æqualia, juxta propof. 3. hujus lib. Rursus eodem modo factæ pyramides in pyramide $EFGH$, in binas pyramides æquales, & in bina prismata æqualia, & sic deinceps. Quoniam igitur, si à pyramide $EFGH$, auferatur plus quam dimidium, nempe duo prismata $PFQRST$, $GQRSTV$; quæ majora sunt dimidio pyramidis $EFGH$: Item à reliquis pyramidibus $EPRS$, $STVH$, plus quam dimidium, earum scilicet prismata, & sic deinceps; relinquetur tandem minor magnitudo quam Y , excessus pyramidis $EFGH$, supra solidum X . per lemma propof. 2. hujus lib. Sit ergo jam relicta magnitudo minor. Cum autem pyramis $EFGH$, æqualis ponatur solidis X , Y ; erunt reliqua prismata in pyramide $EFGH$, majora solido X . Dividatur pyramis $ABCD$, in duas pyramides æquales, & duo prismata æqualia, & eodem modo factæ pyramides $AILM$, $MNOD$, in binas pyramides æquales, & bina prismata æqualia; Atque hoc toties fiat, quoties id factum fuit in pyramide

de EFGH. Quoniam igitur sunt omnia prismata in pyramide ABCD, ad omnia prismata numero æqualia in pyramide EFGH, ut basis ABC, ad basin EFG, hoc est, ut pyramis ABCD, ad solidum X: Sunt autem omnia prismata in pyramide ABCD, minora, quam tota pyramis ABCD; erunt quoque omnia prismata in pyramide EFGH, minora quam solidum X. Ostensa vero sunt & majora. Quod est absurdum. Non ergo minus est solidum X, pyramide EFGH. c 4. duod. d 14. quinq.

Sit deinde solidum X, pyramide EFGH, majus. Quoniam igitur ponitur pyramis ABCD, ad solidum X, ut basis ABC, ad basin EFG: Erit convertendo solidum X, ad pyramidem ABCD, ut basis EFG, ad basin ABC. Ponatur, ut solidum X, ad pyramidem ABCD, ita pyramis EFGH, ad solidum Y. Et quia solidum X, majus ponitur pyramide EFGH, erit & pyramis ABCD, major solido Y. Quare erit, ut basis EFG, ad basin ABC, ita pyramis EFGH, ad solidum Y, quod minus est pyramide ABCD. Quod est absurdum. Ostensum enim est jam, non posse esse, ut est, basis ad basin, ita pyramidem ad solidum pyramide minus. Non ergo majus est solidum X, pyramide EFGH, sed neque minus, est ostensum. Igitur æquale est. Quare cum ponatur ut basis ABC, ad basin EFG, ita pyramis ABCD, ad solidum X; fit autem pyramis ABCD, ad solidum X, ut ad pyramidem EFGH, solido X, æqualem: Erit quoque ut basis ABC, ad basin EFG, ita pyramis ABCD, ad pyramidem EFGH. Sub eadem ergo altitudine existentes pyramides, &c. Quod erat ostendendum. e 14. quinq. f 9. quinq.

C O R O L L A R I U M:

Hinc fit, pyramides ejusdem altitudinis supra eandem, vel æquales bases triangulares constitutas, esse inter se æquales; propterea quod eandem proportionem habent cum basibus, quæ æquales ponantur, vel certe una & eadem;

Z 3

THEOR.

E THEOR. 6. PROPOS. 6.

Sub eadem altitudine existentes pyramides, & polygonas habentes bases, inter se sunt, ut bases.

TAB. XXXIII. fg. 8. SINT pyramides ABCDEF, GHIKLM, quarum bases polygonæ ABCDE, GHIKL, latera multitudine æqualia habentes. Dico esse pyramidem ad pyramidem, ut est basis ad basin. Resolutis enim basibus in triangula numero æqualia; erit quælibet pyramis in totidem pyramides triangulares divisa. *a* Quia vero est, ut basis ABC, ad basin ACD, ita pyramis ABCF, ad pyramidem ACDF; erit componendo ut basis ABCD, ad basin ACD, ita pyramis ABCDF, ad pyramidem ACDF: *b* Sed rursus est ut basis ACD, ad basin ADE, ita pyramis ACDF, ad pyramidem ADEF. Igitur ex æquo ut basis ABCD, ad basin ADE, ita pyramis ABCDF, ad pyramidem ADEF. Componendo ergo erit ut basis ABCDE, ad basin ADE, ita pyramis ABCDEF, ad pyramidem ADEF. Simili argumento erit ut basis GHIKL, ad basin GKL, ita pyramis GHIKLM, ad pyramidem GKLM; & convertendo ut basis GKL, ad basin GHIKL, ita pyramis GKLM, ad pyramidem GHIKLM. *c* Rursus quoniam est, ut basis ADE, ad basin GKL, ita pyramis ADEF, ad pyramidem GKLM; Erunt quatuor bases ABCDE, ADE, GKL, GHIKL, in eisdem proportionibus cum quatuor pyramidibus ABCDEF, ADEF, GKLM, GHIKLM, ut manifestum est ex demonstratione. Quare ex æquo, erit ut basis ABCDE, ad basin GHIKL, ita pyramis ABCDEF, ad pyramidem GHIKLM: Ac propterea, sub eadem altitudine existentes pyramides, &c. Quod erat demonstrandum.

SCHO.

S C H O L I U M.

Quamvis hujus propositionis demonstratio de illis duntaxat pyramidibus ejusdem altitudinis loquatur, secundum interpretes, quarum bases polygonae latera habent multitudine aequalia, facile tamen idem etiam demonstrabimus de pyramidibus ejusdem altitudinis quarum unius basis plura continet latera quam basis alterius. Sint enim duae pyramides ejusdem altitudinis $ABCDEF$, $GHIK$, quarum illius basis sit polygonae, nempe pentagonae, hujus vero triangularis. Dico esse pyramidem ad pyramidem, ut est basis ad basin. Refutato enim pentagono in triangula, erit pyramis in pyramides numero aequales divisae. Quoniam vero est, ut basis ABC , prima quantitas, ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ABCF$, tertia quantitas ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem; & eodem modo, ut basis ACD , quinta quantitas, ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ACDF$, sexta quantitas, ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem: e Erit ut basis $ABCD$, prima quantitas cum quinta, ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ABCDF$, tertia quantitas cum sexta, ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem. Rursus quia est, ut basis $ABCD$, prima quantitas, ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ABCDF$, tertia quantitas, ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem, ut modo est ostensum: f & ut basis ADE , quinta quantitas ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ADEF$, sexta quantitas ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem; g Erit etiam basis $ABCDE$, prima quantitas cum quinta, ad basin GHI , secundam quantitatem, ita pyramis $ABCDEF$, tertia quantitas cum sexta, ad pyramidem $GHIK$, quartam quantitatem. Quod est propositum. Eodem modo semper procedendum est, si plura fuerint triangula in basi polygonae.

THEOR. 7. PROPOS. 7.

Omne prima triangularem habens basim,

Z 4

divi-

dividitur in tres pyramides æquales inter se, triangulares bases habentes.

TAB. XXXIV. **fig. 1.** **234. prima b. g. d. d. d.** **S**It prisma ABCDEF, cujus duo triangula opposita, æqualia, ac similia ABF, DCE. Dico ipsum prisma secari in tres pyramides triangulares inter se æquales. Ducantur enim in tribus parallelogrammis tres diametri, nempe AC, in ABCD; CF, in BCEF, FD, in ADEF. Quoniam igitur triangula ABC, ADC, æqualia sunt; *a* estque ut basis ABC, ad basin ADC, ita pyramis ABCF, ad pyramidem ADCF, cum hæ pyramides eandem habeant altitudinem, nempe perpendicularem ex F, vertice ad planum ABCD, demissam; Erunt & pyramides ABCF, ADCF, inter se æquales. Eadem ratione æquales erunt pyramides ADFC, EFDC, super æquales bases ADF, EFD, constitutæ, & sub eadem altitudine, nempe perpendiculari à vertice C, ad planum ADEF, demissa. Est autem pyramis ADCF, eadem pyramidi ADFC, cum illa contineatur quatuor planis, nempe basi ADC, & triangulis ADF, ACF, DCF; hæc vero eisdem quatuor planis, nimirum basi ADF, & triangulis ADC, ACF, DCF. Igitur tres pyramides ABCF, ADCF, EFDC, seu CDEF, (quæ eadem est pyramidi EFDC, cum tam EFDC, quam CDEF, contineatur planis CDE, EFD, DCF, FCE,) totum prisma componentes, ut perspicuum est, æquales sunt inter se; Ac propterea prisma ABCDEF; in tres pyramides æquales est divisum. Quo circa omne prisma triangularem habens basin, &c. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M.

Hinc colligitur, quamlibet pyramidem esse tertiam partem prismatis, quod eandem cum illa habet & basin, & altitudinem: Sive prismæ quodlibet triplum esse pyramidis, quæ eandem cum ipso habet & basin, & altitudinem.

TAB. XXXIII.




Fig. 2.







Fig. 4.




Fig. 7.








Fig. 9.





Sit enim primum pyramis ABFC, triangulari habens TAB. XXXIX,
 basin ABF; & prisma ABCDEF, sub eadem altitudine fig. 2.
 eandem habens basin triangularem ABF. Dico pyramidem esse tertiam partem prismatis. Nam si iucatur r. & DF, erit prisma divisum in tres pyramides æquales ABCF, ADCF, CDEF, & ut demonstratum est; Ac propterea pyramis ABCF, hoc est, pyramis ABFC, (cum hæc illi sit æqualis, immo eadem, quod eisdem planis comprehendatur ABF, FCA, ABC, CBF,) tertia pars erit prismatis ABCDEF. Cum igitur pyramis ABFC, æqualis sit cuicumque alteri pyramidi sub eadem altitudine, & super eandem basin ABF, constituta, ex coroll. propof. 5. hujus lib. manifestum est, quamlibet pyramidem esse tertiam partem prismatis, quod eandem cum illa habet basin triangularem & altitudinem; ac propterea prisma è contrario esse pyramidis triplum. c. 7. descript.

Sit deinde pyramis ABCDE, cujus basis rectilineum quodcunque ABCD, quotlibet laterum; & prisma ABCDEFGH, sub eadem altitudine eandem habens basin. Dico rursus pyramidem esse prismatis partem tertiam. Resoluta enim basi ABCD, & plano opposito EFGH, in triangula numero æqualia ADB, BCD, EHF, FGH, erit prisma in totidem prismata bases habentia triangularia divisum. Ductis ergo rectis AH, BH, DF, CF, erit, ut demonstratum est, pyramis ADBH, tertia pars prismatis ABFEGH. Item pyramis BCDF, tertia pars prismatis CDHGFB. Quare erit ut pyramis ADBH, ad prisma ABFEGH, ita pyramis BCDF, ad prisma CDHGFB; & Ac propterea ut una pyramis ad suum prisma; ita omnes pyramides ad omnia prismata, hoc est, ad prisma ABCDEFGH. Igitur pyramides ADBH, BCDF, simul tertiam partem constituent prismatis ABCDEFGH. Sunt autem pyramides ADBH, BCDF, æquales pyramidi ABCDE; propterea quot pyramides ADBH, ADBE, super eandem basin, & super eandem altitudine, nimirum inter plana parallela, sunt æquales, ex coroll. propof. 5. hujus lib. Eademque ratione æquales sunt pyramides BCDF, BCDE, super eandem basin, & super eandem altitudine. Quapropter cum pyramides ADBE, BCDE, component totam pyramidem ABCDE, erit & pyramis ABCDE, tertia pars prismatis ABCDEFGH. Cum igitur pyramis ABCDE, æqualis sit cuicumque alteri pyramidi sub eadem altitudine & super eandem basin ABCD, constituta, per coroll. propof. 5. hujus lib. perspicuum est, quamlibet pyramidem esse tertiam partem prismatis. TAB. XXXIX, fig. 2.

prismatis, quod eandem cum illa habet basim multilateram, eandemque altitudinem.

Quod si basim pyramidis, ac prismatis plura habeat latera, eodem modo ostendetur, pyramidem esse prismatis partem tertiam. Nam divisus polygonis in triangula, sectum erit prisma in totidem prismata bases habentia triangulares. Unde singulæ pyramides triangulares horum prismatum erunt tertie partes singulorum prismatum. Com igitur omnes hæ pyramides æquales sint pyramidibus basim habenti polygonum prismatis propositi, constat propositum.

S C H O L I U M.

Sub eadem altitudine existentia prismata, quas-
cunque habeant bases, inter se sunt, ut bases.

Quamvis enim hoc demonstratum sit in lib. 11. de
prismatis, quarum duo plana opposita, parallela, &
æqualia, sunt triangula, licet eorum bases sint pa-
rallelogramma, vertices vero linea recta: nec non
de parallelepipedis, quæ nomine prismatum contineri
dicimus: Nunc tamen id ipsum demonstrabimus uni-
versè de omnibus prismatis, quorum duo plana ad-
versa, sive bases, sunt polygonæ, quamvis plura late-
ra, seu anguli in unius base reperiantur, quam in
base alterius. Sint igitur duo prismata ejusdem al-
titudinis $ABCDEFHGHIK$, $LMNOPQRS$, quorum
bases sint figura multilatera. Dico ut est basis
 $ABCDE$, ad basim $LMNO$, ita esse prisma ad
prisma. Si enim ex omnibus angulis utriusque basis
ad unum punctum superioris plani, quod basi oppo-
nitur, linea recta ducantur, confluentur due py-
ramides sub eadem altitudine cum prismatis habentes
easdem bases; Ac proinde per coroll. prædictum hu-
jus propos. qualibet pyramis tertia pars erit sui
prismatis. Quam ob rem erit, ut pyramis ad py-
ramidem, ita prisma ad prisma: Sed pyramis ad py-
midem est, ut basis ad basim, ut ostensum est propos.
6. ejusque scholio. Igitur erit quoque ut basis ad
basim, ita prisma ad prisma. Quod est propositum.

THEOR.

THEOR. 8. PROPOS. 8. viii.

Similes pyramides, quæ triangulares habent bases, in triplicatâ sunt homologorum laterum ratione.

Sint pyramides similes triangulares ABCD, EFGH, ita ut bases ABC, EFG, sint similes, & reliqua triangula unius similia reliquis triangulis alterius. Dico proportionem pyramidum esse triplicatam proportionis, quam habent latera homologa, nempe BC, FG. Extendantur enim plana triangulorum ABC, CBD, DAB, perficianturque parallelogramma BI, BK, BL. Deinde ducantur LM, IM, rectis AI, AL, parallelæ convenientes in M, connectaturque recta KM. Erit igitur completum parallelepipedum BM, ejusdem cum pyramide altitudinis; cum plana solidi BM, sint parallelæ, ut facile colligitur ex propos. 15. lib. 11. Rursus eodem modo perficiatur parallelepipedum FQ. Quoniam igitur ob similitudinem pyramidum, anguli plani ABC, EFG, sunt æquales, estque ut AB, ad BC, ita EF, ad FG; erunt parallelogramma BI, FN, similia. Eodem modo cum anguli ABD, EFH, sint æquales, sitque ut AB, ad BD, ita EF, ad FH; Item anguli DBC, HFG, æquales, & ut DB, ad BC, ita HF, ad FG: erunt & parallelogramma BL, BK, parallelogrammis FP, FO, similia. Sed tam tria BI, BK, BL, parallelepi-
 edi BM, reliquis tribus oppositis DM, AM, CM, quam tria FN, FO, FP, parallelepiedi FQ, reliquis oppositis tribus HQ, EQ, GQ, sunt æqualia, & similia. Igitur sex plana circumferentia solidum BM, similia sunt sex planis solidum FQ, ambientibus; Ac propterea ex defin. 9. lib. 11. similia sunt parallelepipeda BM, FQ. Quoniam vero ductis rectis LI, PN, perimata DBCILA, HFGNPE, habent eandem proportionem, quam parallelepipeda BM, FQ, eorum dupla; & pyramides ABCD, EFGH, eandem

TAB.
XXXIV,
fig. 5.

a 24. mod.

b 24. mod.

c 15. mod.

GHLM, LHIM, IKLM, singulæ ad singulas, triplicatam proportionem habebunt laterum homologorum AB, BC, CD, ad GH, HI, IK, singulorum ad singula. Cum igitur AB, BC, CD, ad GH, HI, IK, habeant unam & eandem proportionem, ob similitudinem basium ABCDE, GHIKL; habebunt quoque pyramides ABEF, EBCF, CDEF, ad pyramides GHLM, LHIM, IKLM, unam eandemque proportionem, triplicatam scilicet illius; Atque idcirco erit ut una pyramis ABEF, ad unam ^{i 12. quælibet} pyramidem GHLM, ita omnes pyramides, nempe pyramis ABCDEF, ad omnes pyramides, nimirum ad pyramidem GHIKLM. Quam ob rem, & cum pyramis ^{h 2. dicitur} ABEF, ad pyramidem GHLM, habeat triplicatam proportionem homologorum laterum AB, GH; habebit quoque pyramis ABCDEF, ad pyramidem GHIKLM, triplicatam proportionem eorundem laterum homologorum AB, GH. Quod est propositum.

THEOR. 9. PROPOS. 9. vñ.

Æqualium pyramidum, & triangulares bases habentium, recipiuntur bases & altitudines. Et quarum pyramidum triangulares bases habentium recipiuntur bases & altitudines, illæ sunt æquales.

Sint æquales pyramides triangulares ABCD, ^{TAB.} EFGH. Dico earum bases ABC, EFG, & ^{XXXIV.} altitudines esse reciprocas, hoc est, esse ut ABC, ^{fig. 7.} ad EFG, ita altitudinem pyramidis EFGH, ad altitudinem pyramidis ABCD. Si enim perficiantur, ut in præcedenti propositione dictum est, parallelepipeda BM, FQ, earundem altitudinum cum pyramidibus, connectanturque rectæ LI, PN; erunt prismata DBCILA, HFGNPE, cum sint tripla pyramidum, quæ æquales ponuntur, inter se æqualia; Ac proinde parallelepipeda BM, FQ, cum sint prismatum dupla, æqualia quoque erunt. Quare bases eorum & altitudines reci- ^{a 34. quælibet} procabuntur, hoc est, erit ut basis BI, ad basin FN, ita altitudo solidi FQ, ad altitudinem solidi BM: Ut autem basis BI, ad basin FN, ita est ^{h 17. quælibet} trian-

363 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

triangulum ABC, ad triangulum EFG. Igitur erit quoque, ut basis ABC, ad basin EFG, ita altitudo pyramidis EFGH, ad altitudinem pyramidis ABCD, cum altitudines pyramidum eadem sint, quæ parallelepipedorum; Ac propterea bases & altitudines pyramidum æqualium reciprocantur.

Sint jam bases & altitudines reciprocæ. Dico pyramides esse æquales. Constructa enim figura, *ex 15. quins.* ut prius; cum sit ut ABC, ad EFG, ita parallelogrammum BI, ad parallelogrammum FN; sintque eadem altitudines parallelepipedorum, & pyramidum; erunt quoque bases parallelepipedorum, & altitudines eorundem reciprocæ; *d 34. und.* & AC propterea inter se æqualia erunt parallelepipeda BM, FQ. Quare & prismata DBCILA, HFGNPE, eorum dimidia, æqualia erunt: Atque propterea pyramides quoque, prismatum tertiæ partes, æquales erunt. Æqualium igitur pyramidum, & triangulares bases habentium, &c. Quod erat demonstrandum.

vii. THEOR. 10. PROPOS. 10.

Omnis conus tertia pars est cylindri eandem cum ipso basin habentis, & altitudinem æqualem.

TAB. XXXIV. fig. 8. HAbent conus & cylindrus basin eandem circumulum ABCD, & altitudinem eandem. Dico conum cylindri esse tertiam partem. Si enim conus non credatur esse tertia pars cylindri, non erit cylindrus conii triplus, sed vel major, vel minor triplo conii. Sit primum major quam triplus conii, magnitudine E, ita ut cylindrus sit æqualis triplo conii & magnitudini E, simul. Inscríbetur in circulo quadratum ABCD, & circa eundem, quadratum FGHI; intelliganturque super hæc quadrata sub altitudine conii, & cylindri, erecta duo parallelepipeda. Quoniam igitur quadratum ABCD, dimidium est quadrati FGHI, ut

ut ad propof. 9. lib. 4. offendimus; *a* estque ut *a* 31. *ind.*
 basis ad basin, ita parallelepipedum ad parallelepipedum
 ejusdem altitudinis; Erit & parallelepipedum basis
 ABCD, dimidium parallelepipedum basis FGHI; Ac proinde
 parallelepipedum basis ABCD, majus erit, quam dimidium
 cylindri, cujus basis circulus ABCD. Secentur bifariam
 peripheriæ AB, BC, CD, DA, in punctis K, L, M, N,
 adjunganturque rectæ KA, KB, LB, LC, MC, MD, ND, NA.
 Ducatur quoque per K, recta OP, tangens circulum in K, quæ
 parallela erit ipsi AB, ut ad propof. 27. lib. 3. offendimus,
 occurratque rectis DA, CB, productis in P, & O; & super
 AKB, ABOP, intelligantur prismata sub altitudine conii &
 cylindri. *b* 41. *primi*
 Quia ergo triangulum AKB, dimidium est parallelogrammi
 ABOP; erit quoque prisma basis AKB, dimidium prismatis,
 seu parallelepipedum basis ABOP: cum sit prisma, ad
 prisma ut basis ad basin, quemadmodum, ad propof. 7.
 hujus lib. demonstravimus; Ac propterea prisma basis
 AKB, majus erit, quam dimidium segmenti cylindri,
 cujus basis figura contenta linea recta AB, & periph-
 eria AKB. Eadem ratione erunt prismata, quorum
 bases reliqua triangula BLC, CMD, DNA, & altitudo
 eadem, quæ conii & cylindri, majora, quam dimidia
 segmentorum cylindri, quorum bases circuli segmen-
 ta. Omnia igitur hæc prismata simul majora sunt,
 quam dimidia omnium segmentorum cylindri simul.
 Quod si rursus peripheriæ AK, KB, &c. secentur
 bifariam, & adjungantur rectæ lineæ, constituentur
 eodem modo prismata ejusdem altitudinis cum cono,
 & cylindro, quæ majora erunt simul, quam dimidia
 omnium segmentorum cylindri simul, quorum
 bases circuli segmenta, & sic deinceps.
 Quoniam vero si à cylindro, cujus basis circulus
 ABCD, auferatur plus quam dimidium, nempe
 parallelepipedum basis ABCD; & à reliquis seg-
 mentis plus quam dimidium, nimirum prismata
 basium AKB, BLC, &c. atque in tunc modum
 semper

semper fiat detractio; relinquatur tandem minor magnitudo, quam E , excessus cylindri supra triplum conii, per lemma propos. 2. hujus lib. Sint jam segmenta cylindri relicta basium AK , KB , BL , &c. (quæ quidem bases sunt circuli segmenta,) simul sumpta, minora quam E . Cum igitur cylindrus æqualis ponatur triplo conii & magnitudini E , simul; Si ex cylindro auferantur segmenta dicta, & ex triplo conii una cum magnitudine E , ipsa magnitudo E , quæ major est dictis cylindri segmentis, erit reliquum prisma basis multangulæ $AKBLCMDN$, eandem habens altitudinem cum cono, & cylindro, majus quam reliquum triplum conii; ideoque conus minor erit, quam tertia pars prismatis. Quare cum dicti prismatis sit tertia pars pyramidis, cujus eadem cum ipso basis & altitudo, ex coroll. propos. 7. hujus lib. Erit conus minor dicta pyramide, totum parte. Quod est absurdum. Non igitur major est cylindrus triplo conii.

Sit deinde cylindrus minor triplo conii, ac proinde conus major quam tertia pars cylindri. Sit ergo conus major quam tertia pars cylindri, magnitudine E ; ita ut conus æqualis sit tertiæ parti cylindri, & magnitudini E , simul. Inscríbetur rursus in circulo quadratum $ABCD$, & circa eundem, quadratum $FGHI$; intelligenturque super hæc quadrata, pyramides sub altitudine conii & cylindri. Quoniam igitur quadratum $ABCD$, dimidium est quadrati $FGHI$, ut ad propos. 9. lib. 4. demonstravimus, æstque ut basis ad basin, ita pyramis ad pyramidem ejusdem altitudinis; Erit quoque pyramis super $ABCD$, dimidium pyramidis super basin $FGHI$; ac proinde pyramis super basin $ABCD$, major erit dimidio conii, cujus basis circulus $ABCD$. Secentur peripheriæ AB , BC , CD , DA , bisariam in K , L , M , N , adjunganturque rectæ AK , KB , BL , LC , CM , MD , DN , NA . Ducatur quoque per K , recta OP , tangens circulum in K , quæ parallela erit ipsi AB , ut ad propos. 27. lib. 3. demonstravimus,

stravimus, occurratque rectis DA , CB , productis in P , & O , & super AKB , $ABOP$, intelligantur pyramides sub altitudine conii & cylindri. Quia ergo triangulum AKB , dimidium est parallelogrammi $ABOP$, erit quoque pyramis super basim AKB , dimidium pyramidis super basim $ABOP$, f cum pyramides habeant proportionem eandem, f 6. 4. 4. quam bases; ac proinde pyramis super basim AKB , major erit dimidio segmenti conii, cujus basis figura contenta linea recta AB , & peripheria AKB . Eadem ratione erunt pyramides, quarum bases reliqua triaungula BLC , CMD , DNA , & altitudo eadem cum cono & cylindro, majores, quam dimidia segmentorum conii, quorum bases circuli segmenta. Omnes igitur hæ pyramides simul majores sunt, quam dimidia omnium segmentorum conii simul. Quod si rursus peripheriæ AK , KB , BL , LC , CM , MD , DN , NA , secentur bifariam, & adjungantur rectæ lineæ in eodem circulo, constituentur eodem modo pyramides ejusdem altitudinis cum cono & cylindro, quæ majores erunt simul, quam dimidia omnium segmentorum conii simul, quorum bases circuli segmenta; & sic deinceps. Quoniam vero si à cono, cujus basis circulus $ABCD$, auferatur plus quam dimidium, nempe pyramis super basim $ABCD$, quam majorem esse ostendimus, quam dimidium conii, cujus basis est circulus $ABCD$; & à reliquis segmentis plus quam dimidium, nimirum pyramides basium AKB , BLC , CMD , DNA ; atque in hunc modum semper fiat detractio; relinquitur tandem minor magnitudo, quam E , excessus conii supra tertiam partem cylindri: per lemma propof. 2. hujus lib. Sint jam segmenta conii relicta basium AK , KB , BL , LC , CM , MD , DN , NA , (quæ quidem bases sunt circuli segmenta,) simul sumpta minima, quam E . Cum igitur conus æqualis ponatur tertię parti cylindri, & magnitudini E , simul; si ex cono detrahantur segmenta prædicta, & ex tertis parte cylindri una cum magnitudine

E, ipsa magnitudo E, quæ major est præfatis
 conii segmentis; erit reliqua pyramis, cujus basis
 polygonum $AKBLCMDN$, eandem habens alti-
 tudinem cum cono & cylindro, major quam
 tertia pars cylindri reliqua; ac proinde triplum
 dictæ pyramidis majus erit cylindro. Quocirca,
 cum prisma eandem habens basim cum dicta py-
 ramide, eandemque altitudinem cum cono &
 cylindro, triplum sit ipsius pyramidis, ut supra
 in coroll. propos. 7. hujus lib. à nobis est de-
 monstratum, erit hujuscemodi prisma majus cy-
 lindro, pars toto. Quod est absurdum. Non
 ergo cylindrus minor est triplo conii: Sed neque
 major triplo est ostensus. Igitur æqualis est tri-
 plo conii, proptereaque conus tertia pars est cy-
 lindri, Omnis igitur conus tertia pars est cylin-
 dri, eandem cum ipso basim habentis, & altitu-
 dinem æqualem. Quod erat demonstrandum.

THEOR. II. PROPOS. II.

Sub eadem altitudine existentes conii &
 cylindri, inter se sunt, ut bases.

TAB. XXXIV.
 fig. 9.
 Sicut sub eadem altitudine conii & cylindri, quo-
 rum bases circuli $ABCD$, $EFGH$, altitudines
 æquales IK , LM . Dico ut est basis ad
 basim, ita esse conum ad conum, & cylindrum
 ad cylindrum. Si enim hoc non credatur, sit ut
 basis $ABCD$, ad basim $EFGH$, ita conus
 $ABCDK$, ad aliquam magnitudinem, nempe ad
 N , quæ vel major erit, vel minor cono $EFGHM$.
 Si enim esset æqualis, haberet conus $ABCDK$,
 ad conum $EFGHM$, & ad N , proportionem
 eandem; ac propterea esset conus ad conum, ut
 basis ad basim: quod non conceditur. Sit ergo
 primum N , minor quam conus $EFGHM$, mag-
 nitudine O , ita ut conus $EFGHM$, æqualis sit
 magnitudinibus N , & O , simul. Inscrubatur in
 circulo $EFGH$, quadratum $EFGH$, dividantur-
 que

que peripheria. EF, FG, GH, HE, bifariam in P, Q, R, S, & adjungantur recta EP, PF, FQ, &c. Quoniam igitur si ex cono EFGHM, detrahatur pyramis super basin EFGH, ejusdem altitudinis, & à reliquis segmentis auferatur pyramides ejusdem altitudinis basium EPF, FQG, &c. atque in hunc modum semper fiat detractio, semper plus dimidio subtrahitur, ut in posteriore parte præcedentis propositionis ostensum est; reliquetur tandem minor magnitudo, quam O, excessus cono EFGHM; super N, per lemma propos. 2. hujus lib. Sint ergo jam segmenta cono relicta basium EP, PF, FQ, &c. (quæ quidem bases sunt circuli segmenta) simul lumpata, minora quam O. Cum igitur conus EFGHM, ponatur æqualis magnitudinibus N, & O, simul; si ex cono detrahantur dicta con. segmenta, & ex N, & O, ipsa magnitudo O, quæ prædicti cono segmentis major est, erit reliqua pyramis, cujus basis polygonum EPFQGRHS, ejusdem altitudinis cum cono; major quam N, reliqua magnitudo. Inscribebatur in circulo ABCD, polygonum ATBVCXDY, simile polygono EPFQGRHS, ut in propos. 2. hujus lib. docuimus; ducanturque circulorum diametri BD, FH. Quoniam igitur per coroll. præpos. 2. hujus lib. est ut circulus ABCD, ad circulum EFGH, ita polygonum ATBVCXDY, ad polygonum EPFQGRHS: Ut autem circulus ABCD, ad circulum EFGH, ita ponitur conus ABCDK, ad magnitudinem N, & ut polygonum, ad po-

c. 6. dimid)

lygonum, ita est pyramis ad pyramidem ejusdem altitudinis cum conis; Erit quoque ut pyramis ATBVCXDY, ad pyramidem EPFQGRHSM, ut conus ABCDK, ad N. Cum igitur pyramis ATBVCXDYK, minor sit cono ABCDK, pars toto, erit & pyramis EPFQGRHSM, minor quam N: Ostensa autem fuit & major. Quod est absurdum. Non igitur minor est magnitudo N, cono EFGHM.

d. 14. quib)

Si secundo N, major cono EFGHM. Cum

A r 2. igitur

igitur ponatur ut circulus ABCD, ad circulum EFGH, ita conus ABCDK, ad N; Er̄it & convertendo ut circulus EFGH, ad circulum ABCD, ita N, ad conum ABCDK. Ponatur ut N, ad conum ABCDK, ita conus EFGHM, ad magnitudinem O. Et quia N, major ponitur cono EFGHM; major quoque erit conus ABCDK, quam O. Quare erit ut circulus EFGH, ad circulum ABCD, ita conus EFGHM, ad magnitudinem O, quæ minor est cono ABCDK. Quod est absurdum. Ostensum enim est jam, non posse esse conum ad magnitudinem minorem alio cono, ut est basis illius conī ad basin hujus conī. Non ergo major est N, magnitudo cono EFGHM. Sed neque minor est ostensa; Æqualis igitur est. Quapropter cum ponatur, ut basis ABCD, ad basin EFGH, ita conus ABCDK, ad N; e Sit autem, ut conus ABCDK, ad N, ita idem conus ABCDK, ad conum EFGHM, erit quoque ut basis ABCD, ad basin EFGH, ita conus ABCDK, ad conum EFGHM.

e 7. quint. f Quoniam autem, ut conus ABCDK, ad conum EFGHM, ita est cylindrus ABCDK, (qui triplus est conī ABCDK,) ad cylindrum EFGHM; (qui triplus est conī EFGHM.) Erit quoque ut basis ABCD, ad basin EFGH, ita cylindrus ABCDK, ad cylindrum EFGHM. Quod tamen eodem modo confirmari potest, quo usi sumus in conis, si loco conorum, & pyramidum, concipiantur cylindri, & prismata. Sub eadem ergo altitudine existentes conī & cylindri, inter se sunt, ut bases. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M.

Hinc sit, conus & cylindros ejusdem altitudinis super eandem, vel æquales bases constitutos, esse inter se æquales: propterea quod eandem proportionem habent, quam bases, quæ æquales ponuntur, vel certe una & eadem.

Item sequitur, conos & cylindros æquales super eandem, vel æquales bases, in eadem esse altitudine: Et æquales

Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 7.










Fig. 9.





æquales in eadem altitudine, super æquales bases esse, si non habuerint eandem. Quod ostendemus non aliter, ac conuersum propof. 31. lib. 11. demonstratum fuit.

THEOR. 12. PROPOS. 12. x.

Similes conii, & cylindri, in triplicata ratione sunt diametrorum, quæ in basibus.

Sint similes conii, & cylindri, quorum bases TAB.
 circuli ABCD, EFGH, axes vero IK, LM, XXXV.
 & diametri basium BD, FH. Dico conum ad fig. 1.
 conum, & cylindrum ad cylindrum, habere proportionem triplicatam diametri ad diametrum. Si enim hoc non credatur, habeat conus ABCDK, ad aliquam magnitudinem N, proportionem triplicatam diametri BD, ad diametrum FH. Eritque N, vel minor, vel maior cono EFGHM. Si enim esset æqualis, haberet conus ABCDK, a 7. quint.
 ad conum EFGHM, & ad N, proportionem eandem; Ac proinde proportio conii ABCDK, ad conum EFGHM, esset quoque triplicata proportionis diametri BD, ad diametrum FH; quod non conceditur. Sit ergo primum N, minor quam conus EFGHM, magnitudine O; Fiatque eadem prorsus constructio figuræ, quæ in præcedenti propositione, ita ut rursus pyramis EPFQGRHSM, major ostendatur, quam N. Ducantur deinde rectæ KB, KT, MF, MP, ut habeantur duo triangula BKT, FMP, pyramidum ATBVCXDYK, EPFQGRHSM; & connectantur rectæ TI, PL. Quoniam igitur conii ABCDK, EFGHM, similes ponuntur; erit, ex 24. defn. lib. 11. ut diameter BD, ad diametrum FH. b 15. quint.
 hoc propterea ut semidiameter BI, ad semidiametrum FL, ita axis IK, ad axem LM; Ac permutando ut BI, ad IK, ita FL, ad LM. Cum igitur anguli BIK, FLM, recti sint; ex defn. 3. lib. 11. quod conii recti ponantur, proptereaque axes recti ad eorum bases; c Erunt triangula BIK, FLM, æquiangu- c 6. sext.
 la; d Ac propterea ut KB, ad BI, ita erit MF, d 4. sext.

ad FL. Ut autem BI, ad BT, ita FL, ad FP, ob similitudinem triangulorum BIT, FLP. (Cum enim anguli BIT, FLP, insistentes similibus arcibus BT, FP, sint æquales, ut in scholio propof. 22. lib. 3. ostensum est; sicque ut BI, ad IT, ita FL, ad LP, ob æqualitatem tam linearum BI, IT, quam FL, LP; erunt triangula BIT, FLP, similia.) Igitur ex æquo, ut KB, ad BT, ita MF, ad FP. Rursus quia latera KI, IB, trianguli KIB, æqualia sunt lateribus KI, IT, trianguli KIT, & anguli dictis lateribus comprehensæ, recti, ex defin. 3. lib. 11. cum axis IK rectus ponatur, ad circumulum, ABCD, fertur bases KB, KT, æquales. Eodem modo æquales erunt rectæ MF, MP; Ac proportio rectæ KB, KT, rectis MF, MP, proportionales erunt, cum utrobique sit proportio æqualitatis. Quoniam vero ut KB, ad BT, ita KT, ad eandem BT; Item ut MF, ad FP, ita MP, ad eandem FP: Erat autem ut KB, ad BT, ita MF, ad FP; Erit quoque ut KT, ad BT, ita MP, ad FP; Et convertendo ut BT, ad TK, ita FP, ad PM. Quare cum sit ut TK, ad KB, ita PM, ad MF, & ut KB, ad BT, ita MF, ad FP; Et ut BT, ad TK, ita FP, ad PM, veluti ostensum est; habebunt triangula BKT, FMP, latera proportionalia, & ideoque æquiangula erunt. Ac proinde similia, ex definitione. Non aliter ostendentur reliqua triangula ambientia pyramides ATBVCDYK, EPFQGRHSM, inter se similia esse: Quæ cum sint multitudine æqualia, erunt dictæ pyramides similes, ex defin. 9. lib. 11. Quocirca in triplicata proportione erunt homologorum laterum BT, FP, ex coroll. propof. 8. hujus lib. Ut autem BT, ad FP, ita est, BI, ad FL, ob similitudinem triangulorum BIT, FLP; Et ut BI, ad FL, ita BD, ad FH. Igitur pyramis ad pyramidem habebit quoque proportionem triplicatam diametrorum BD, FH: Ponebatur autem & proportio conii ABCDK, ad N, eandem diametrorum triplicata. Igitur

est ut pyramis $ATBVCXDYK$, ad pyramidem $EPFQGRHSM$, ita conus $ABCDK$, ad N . Quare cum pyramis $ATBVCXDYK$, minor sit cono $ABCDK$, pars toto; erit & pyramis $EPFQGRHSM$, minor quam N . Olfensa autem est & major. Quod est absurdum. Non igitur minor est magnitudo N , cono $EFGHM$. 114. quib.

Sit deinde N , major cono $EFGHM$. Cum ergo ponatur conus $ABCDK$, ad N , habere proportionem triplicatam diametri BD , ad diametrum FH ; Habeat autem & pyramis $ATBVCXDYK$, ad pyramidem $EPFQGRHSM$, triplicatam proportionem earundem diametrorum, ut proxime ostendimus: Erit ut conus $ABCDK$, ad N , ita pyramis $ATBVCXDYK$, ad pyramidem $EPFQGRHSM$; & convertendo ut N , ad conum $ABCDK$, ita pyramis $EPFQGRHSM$, ad pyramidem $ATBVCXDYK$. Quare cum ex coroll. propof. 8. hujus lib. pyramis $EPFQGRHSM$, ad pyramidem $ATBVCXDYK$, habeat proportionem triplicatam homologorum laterum PF , ad TB , hoc est, diametri FH , ad diametrum BD ; habebit quoque N , ad conum $ABCDK$, proportionem triplicatam diametri FH , ad diametrum BD : Ponatur ut N , ad conum $ABCDK$, ita conus $EFGHM$, ad magnitudinem O . Habebit igitur & conus $EFGHM$, ad O , proportionem triplicatam diametri FH , ad diametrum BD . Et quia N , major ponitur quam conus $EFGHM$, erit quoque conus $ABCDK$, major quam O . Quapropter conus $EFGHM$, ad magnitudinem O , minorem cono $ABCDK$, proportionem habet triplicatam diametri FH , ad diametrum BD . Quod est absurdum: Ostensum est enim, non posse conum ad magnitudinem alio cono minorem, proportionem habere triplicatam ejus, quam habent basium diametri. Non ergo major est magnitudo N , cono $EFGHM$. Sed neque minor est ostensa. Aequalis igitur est; ita ac proinde conus $ABCDK$, eandem habet proportionem ad conum $EFGHM$, & ad N . Cum ergo ponatur conus $ABCDK$, ad N , in triplicata m 7. quib.

376 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

proportionē diametrorum BD , & FH ; erit quoque conus $ABCDK$, ad conum $EFGHM$, in earundem diametrorum proportionē triplicata.

U. quib. Quoniam vero, quam proportionem habent conī, eandem quoque obtinent cylindri, eorum tripli; habebit quoque cylindrus ad cylindrum proportionem diametrorum in basibus triplicatam. Quod tamen eodem modo demonstrabitur, quo nisi sumus in conis, si modo loco conorum, & pyramidum assumantur cylindri, atque prismata. Similes igitur conī, & cylindri in triplicata ratione sunt diametrorum, quæ in basibus. Quod ostendendum erat.

II. THEOR. 13. PROPOS. 13.

Si cylindrus plano secetur adversis planis parallelo: Erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

TAB. XXXV. fig. 2. SECetur cylindrus $ABCD$, plano GH , parallelo adversis planis AB , CD , quod quidem secet axem EF , in I . Dico ut est cylindrus $ABHG$, ad cylindrum $GHCD$, ita esse axem EI , ad axem IF . Intelligatur enim cylindrus $ABCD$, in utramque partem, una cum ejus axe & rectangulo EC , ad cujus revolutionem descriptus est cylindrus, protractus quantumlibet: Sumanturque in axe producto quotcunque rectæ EK , KL , æquales ipsi EI : Item quotcunque rectæ FM , MN , NO , æquales ipsi FI . Deinde per puncta I , K , L , M , N , O ducantur rectæ IH , KP , LQ , MT , NV , OX , & æquales rectis EB , FC ; quæ quidem ad revolutionem rectanguli EC , describent circulos GH , PR , QS , Ta , VZ , XY , parallelos & æquales circulis AB , CD , ob æqualitatem semidiametrorum, quæ semper inter se æquidistantes circumferuntur. Ac propterea cylindri erunt SP , PA , AH , HD , DT , TZ , ZX , ex definitione, componen-

LIBER DUODECIMUS. 377

ponentes totam cylindrum $SOXY$. Quoniam vero tam cylindri SP , PA , AH , super bases æquales QS , PR , BA , & sub altitudinibus æqualibus KL , EK , IE , æquales sunt, quam cylindri XZ , ZT , TD , DH , super æquales bases XY , VZ , Ta , CD , & sub altitudinibus æqualibus NO , MN , FM , IF , ex coroll. propos. 11. hujus lib. Erit tam multiplex cylindrus SH , cylindri AH , quam multiplex est axis IL , ipfius axis IE ; Item tam multiplex cylindrus XG , cylindri CG , quam multiplex est axis IO , ipfius axis IF . Quoniam autem si axis IL , (multiplex IE , primæ magnitudinis) æqualis est axi IO , (multiplici axis IF , secundæ magnitudinis) æqualis quoque est cylindrus SH , (multiplex cylindri AH , tertæ magnitudinis) cylindro XG , (multiplici cylindri CG , quartæ magnitudinis) ut ex coroll. propos. 11. hujus lib. liquet. Si vero axis major est axe, cylindrus quoque cylindro major est; Et si minor, minor in quacunque hoc contingat multiplicatione; Erit per defin. 6. lib. 5. ita axis IE , prima magnitudo ad axem IF , secundam magnitudinem, ut cylindrus AH , tertia magnitudo ad cylindrum CG , quartam magnitudinem. Si cylindrus igitur plano secetur adversis planis paralelo; erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. Quod erat demonstrandum.

THEOR. 14. PROPOS. 14. xi.

Super æqualibus basibus existentes coni, & cylindri; inter se sunt, ut altitudines.

Sint super bases æquales AB , CD , duo coni ABE , CDF , & duo cylindri $ABGH$, $CDIK$, quorum axes, seu altitudines, (Nam in conis & cylindris rectis axes ipsi sunt altitudines) LE , MF . Dico esse conum ABE , ad conum CDF , & cylindrum $ABGH$, ad cylindrum $CDIK$, ut est altitudo LE , ad altitudinem MF . Extenda-

38 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

tur enim cylindrus ABGH; ad partes GH, una cum ejus axe LE; & rectangulo AG; abscindaturque axis EN, æqualis atri MF, & circa centrum N, intelligatur circulus OP, æqualis & parallelus circulo GH, ut fiat cylindrus GHOP, ejusdem altitudinis cum cylindro CDIK. Quoniam igitur cylindri HP, CI; cum habeant æquales bases & altitudines, æquales sunt, ex coroll.

a7. quod. b13. duod. *propos. 14. hujus lib. a cylindrus AG, ad ipsos eandem habebit proportionem. b Est autem cylindrus AG, ad cylindrum HP, ut axis, seu altitudo LE, ad axem, seu altitudinem EN, hoc est, altitudinem MF, sibi æqualem. Igitur & cylindrus AG, ad cylindrum CI, erit quoque, ut altitudo LE, ad altitudinem MF.*

c10. duod. d15. quod. *Quia vero coni ABE, CDF, sunt tertie partem cylindrorum AG, CI; ipsi habebunt eandem cum cylindris proportionem; Ac proinde erit quoque conus ABE, ad conum CDF, ut altitudo LE, ad altitudinem MF. Super æqualibus igitur basibus existentes coni & cylindri, inter se sunt, ut altitudines. Quod ostendendum erat.*

xij: P R O P O S. 15. P R O P O S. 15.

Equalium conorum, & cylindrorum reciprocantur bases & altitudines: & quorum conorum, & cylindrorum reciprocantur bases & altitudines, illi sunt æquales.

748. XXXV. *Sint æquales coni ABC, DEF, & æquales cylindri ABGH, DEIK, quorum bases AB, DE; axes altitudinesve LC, MF. Dico bases & altitudines esse reciprocas, hoc est, esse: ut AB, ad DE, ita MF, ad LC. In cylindris quidem sic propositum ostendetur. Si altitudines LC, MF, sint æquales, cum cylindri ponantur quoque æquales, erunt & bases æquales, ex coroll. propos. 11. hujus lib. Quare erit ut bases AB, ad basin æqualem DE, ita altitudo MF,*

ad altitudinem æqualem LC. Ac proinde bases atque altitudines sunt reciprocz.

Quod si altitudines LC, MF, inæquales fuerint, sit MF, major, ex qua abscindatur MN, ipsi LC, æqualis; & per N, ducatur planum ON, basi DE, parallelum, ut in scholio propof. 15. lib. 11. docuimus, ut fiant duo cylindri DO, OK. Quoniam igitur æquales ponuntur cylindri ABGH, DEIK; erit ut cylindrus ABGH, ad cylindrum DO, ita cylindrus DEIK, ad eundem cylindrum DO. Est autem ut cylindrus ABGH, ad cylindrum DO, ita basis AB, ad basin DE, cum æquales sint altitudines: Item ut cylindrus DEIK, ad cylindrum DO, ita altitudo MF, ad altitudinem MN, cum bases sint æquales, immo una & eadem DE. Igitur erit quoque ut basis AB, ad basin DE, ita altitudo MF, ad altitudinem MN, hoc est, ad hanc æqualem LC; Ac propterea reciprocz sint bases & altitudines.

In conis vero ita concludemus propositum. Si conus ABC, DEF, sint æquales; erunt & cylindri ABGH, DEIK, æquales, cum conus sit cylindrorum tertiæ partes. Quare ut ostensum est, ex æqualitate cylindrorum sequetur, bases & altitudines esse reciprocas; Ac propterea, ex æqualitate conorum etiam sequetur, bases & altitudines reciprocas esse. Quod tamen eodem prorsus modo demonstrari potest, quo usi sumus in cylindris, si modo sub altitudinibus MN, NF, constituantur duo conus, ut in figura apparet.

Sed jam bases atque altitudines reciprocentur. Dico conos & cylindros esse æquales. Quod quidem in cylindris confirmabitur, hac ratione. Si altitudines LC, MF, sint æquales, cum sit ut basis AB, ad basin DE, ita altitudo MF, ad altitudinem æqualem LC; erunt & bases AB, DE, æquales; Ac propterea cylindri super æquales bases AB, DE, & sub altitudinibus æqualibus LC, MF, æquales erunt, ex coroll. propof. 11. hujus lib.

Quod

380 **EUCLIDIS GEOMETRIÆ.**

Quod si altitudines fuerint inæquales, fiat constructio, ut prius. Quia igitur ponitur, ut basis AB, ad basin DE, ita altitudo MF, ad altitudinem LC, hoc est, ad huic æqualem MN.

¶ 11. *dem.* Est autem ut basis AB, ad basin DE, ita cylindrus ABGH, ad cylindrum DO, cum altitudines sint æquales: sicut ut altitudo MF, ad altitudinem MN, ita cylindrus DEIK, ad cylindrum DO, cum bases sint æquales: erit ut cylindrus ABGH, ad cylindrum DO, ita cylindrus DEIK, ad eundem cylindrum DO; & ideoque cylindrus ABGH, cylindro DEIK, æqualis erit.

¶ 14. *dem.* At vero in conis hæc erit demonstratio. Si conorum ABC, DEF, bases & altitudines reciprocentur, recipiuntur quoque bases, & altitudines cylindrorum ABGH, DEIK, cum eadem sint bases, altitudinesque conorum, & cylindrorum. Quam ob rem, ut ostendimus fuit, cylindri, ideoque conii, eorum tertiarum partes, æquales erunt. Demonstrari tamen potest eodem modo conos esse æquales, quod ostendimus cylindros æquales esse. Æqualium igitur conorum & cylindrorum recipiuntur bases & altitudines; &c. Quod erat demonstrandum.

PROBL. I. PROPOS. 16.

Duobus circulis circa idem centrum existentibus, in majori circulo polygonum æquilaterum, & parium laterum inscribere, quod non tangat minorem circulum.

TAB.
XXXV.
fig. 5.

Sint duo circuli ABC, DE, circa idem centrum F, oporteatque in majori ABC, inscribere polygonum æquilaterum, cuius latera numero pari continentur, non tangens minorem DE. Extendatur per centrum F, recta AC, secans circulum DE, in E, puncto, & per E, ducatur GH, ad AC, perpendicularis, quæ tanget circulum DE, in E, ex coroll. propos. 16. lib.

lib. 3. Quoniam igitur arcus AGC , major est arcu GC ; si ex AGC , auferatur dimidium AB , & ex residuo BC , dimidium BI , & ex residuo IC , dimidium IK , & sic deinceps; relinquetur tandem minor arcus quam CG , per lemma proposit. 2. hujus lib. Sit igitur jam arcus CK , arcu CG , minor, & subtendatur recta CK . Dico rectam CK , esse unum latus polygoni inscribendi. Si enim arcus BI , dividatur in partes numero & magnitudine æquales partibus arcus CI ; & quadrans AB , in totidem partes æquales dividatur, in quot divisus est quadrans BC ; nec non semicirculus AHC , in totidem partes, quot continet semicirculus ABC ; deinde omnibus arcibus rectæ lineæ subtendantur, hæc æquales quidem erunt ipsi rectæ CK , eo quod arcus arcui CK , æquales subtendant: Descriptum erit polygonum in circulo ABC , & æquilaterum, & parium laterum. Quod quidem non tangere circulum minorem DE , ita ostendetur. Ex K , ad AG , demittatur perpendicularis KL , secans ipsam AC , in M . Quoniam igitur anguli GEM , KME , recti sunt; & erunt rectæ GH , KL , parallelæ. Quare cum recta GH , tangat circulum DE , in solo puncto E ; recta KL , erit tota extra dictum circulum, nec unquam ipsam continget, quod nunquam cum recta GH , conveniat. Multo igitur minus recta CK , quæ longius à circulo DE , abest, quam KL , circulum DE , tanget. Ac propterea neque alia latera polygoni inscripti, cum æqualia sint lateri CK , & ideoque æqualiter eum CK , à centro F , distent, circulum DE , contingent. Duobus itaque circulis circa idem centrum existentibus, in majori circulo, &c. Quod erat faciendum.

C O R O L L A R I U M.

Hæc est manifestum, si ab extremitate lateris polygoni inscripti, quod cum diametro convenit, ad diametrum ducatur perpendicularis, hæc nullo modo circulum minorem posse contingere, sed tota extra ipsam ostenditur.

Hu.

364 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

Hujusmodi enim est linea KL, que cum ducatur ab extrema puncto K, lateris CK, cum diametro AC, convenientis ad AC, diametrum perpendicularis, ostensa est non tangere circulum DE.

xiv. PROBL. 2. PROPOS. 17.

Diabus sphaeris circa idem centrum existentibus, in majori sphaera solidum polyedrum inscribere, quod non tangat minoris sphaerae superficiem.

TAB. XXXVII
Fig. 1. Sint duæ sphaerae ABCD, EFGH, circa idem centrum I, oporteatque in majori ABCD, inscribere solidum polyedrum, seu multilaterum, quod non tangat minorem sphaeram EFGH. Secentur ambæ sphaerae plano aliquo per centrum, sintque communes sectiones factæ in sphaeris plana ABCD, EFGH, quæ circuli erunt, ex descriptione sphaerae, habentes idem centrum sphaerarum I. Nam semicirculi, ad quorum circumvolutionem sphaera describuntur, circumducti congruent sectionibus ABCD, EFGH. Quare dictæ sectiones circuli erunt. Vel certe, quia omnes lineæ rectæ cadentes ex I, ad peripherias sectionum sunt æquales, cum ducantur ex centro sphaerarum, ad earum superficiem; erunt ipsæ sectiones circuli, ex definitione circuli. Ducantur in his circulis diametri AC, BD, sese in centro I, secantes ad angulos rectos, ut sint quadrantes AB, BC, CD, DA, &c. Deinde in majori circulo ABCD, inscribatur polygonum non tangens minorem circulum EFGH. Quod quidem ut facilius omnia demonstrentur, in huic modum efficiatur. Ex G, ad EG, ducatur perpendicularis Gg, ad circumferentiam usque circuli ABCD, quæ circulum EFGH, tanget in G, ex coroll. **propof. 16. lib. 3.** Et rectæ Gg, applicetur in circulo ABCD, recta æqualis Ac. Quia vero si maximi Cg, intelligatur subtendi recta, ut fiat tri-
angulum GCg, & latus Cg, oppositum majori angulo,





Fig. 3.




Fig. 4.



angulo, nempe recto, majus est latere Gg, quod
 minori angulo opponitur; nimirum acuto; erit
 quoque recta Cg, major recta Ae; ac proinde
 arcus Cg, arcu Ae, major erit, ut constat ex
 scholio propof. 28. lib. 3. Abfcindatur ergo arcus Cd, arcui Ae, æqualis. Quod si ex qua-
 drante CD, dimidium auferatur DL, & ex resi-
 quo CL, dimidium LK, & sic deinceps; relin-
 quetur tandem arcus minor arcu Cd, seu arcu
 Ae, per lemma propof. 2. lib. hujus. Sit ergo
 jam arcus CK, minor; Eritque recta CK, sub-
 tensa minor quam recta Ae, hoc est, quam Gg,
 ex scholio propof. 29. lib. 3. Dico igitur, re-
 ctam CK, esse unum latus polygoni æquilateri
 inscribendi. Nam cum recta subtendens arcum
 Cd, minorem arcu Cg, non tangat circum-
 ferentiam EFGH, ut ex demonstratione præcedentis propof.
 patet; multo minus recta CK, subtendens arcum
 minorem arcu Cd, eandem circumferentiam tanget.
 Rursum ducta diametro KN, erigatur ex centro
 I, ad plana circulorum ABCD, EFGH, per-
 pendicularis IO, occurrens superficiæ sphaeræ
 majoris in O; Et per rectas OI, AC, & OI,
 KN, plana ducantur, squæ ad circumferentiam ABCD, &
 recta erunt, efficientque communes sectiones
 circulos, ut jam dictum est, quorum semicirculi
 sunt AOC, NOK. Quia vero anguli OIC, OIK,
 recti sunt, ex defin. 3. lib. 11, & quadrantes
 erunt OC, OK; atque adeo cum circuli ABCD,
 AOC, NOK, æquales sint, quod eorum diame-
 tri sint & sphaeræ majoris diametri, erunt quoque
 quadrantes CD, OC, OK, æquales. Si igitur
 arcus DL, in tot partes æquales distribuatur, in
 quot divisus fuit arcus CL; & quadrantes OC,
 OK, in arcus numero & magnitudine æquales
 arcubus quadrantis CD; Erunt rectæ his omni-
 bus arcubus æqualibus subtensæ, nimirum CK,
 KL, LM, MD, CP, PQ, QR, RO, KS,
 ST, TV, VO, æquales. Conjunctis autem rectis
 PS, QT, RV, demittantur ex P, & S, ad pla-
 num circuli ABCD, perpendiculares PX, SY,
 quæ

schol. 27.
 tertio.

schol. 27.

34 EUCLIDIS GEOMETRIÆ.

738. *und.* que in communes sectiones AC, NK, cadent; & 6. *und.* heruntque inter se parallelæ.

Quoniam igitur triangulorum PCX, SKY, anguli PXC, SYK, recti sunt, ex defin. 3. lib. 127. *versu.* 11. & anguli PCX, SKY, æquales, quod & æquales sint peripheriæ AOP, NOS, quibus insunt; (Nam si ex semicirculis AOC, NOK, æqualibus demantur arcus æquales CP, KS, reliqui arcus AOP, NOS, æquales quoque erunt.) Erunt duo anguli PCX, PXC, trianguli PCX, æquales duobus angulis SKY, SYK, trianguli SKY. Sunt autem & latera PC, SK, rectis angulis opposita æqualia; Igitur reliqua latera PX, XC, reliquis lateribus SY, YK, æqualia erunt. Quare cum rectæ PX, SY, æquales sint & parallelæ; si connectatur recta XY, æquales quoque erunt & parallelæ PS, XY, inter sese. At quia & rectæ CK, KY, parallelæ sunt, quod latera IC, IK, proportionaliter secta sint. (Si enim ex semidiametris IC, IK, æqualibus demantur æquales rectæ CX, KY, relinquuntur & IX, IY, æquales; Ac proinde erit, ut IX, ad XC, ita IY, ad YK.) Erunt parallelæ quoque PS, CK, inter se, cum utraque parallela sit ipsi XY, ideoque eas conjungentes rectæ CP, KS; in eodem cum ipsis plano existent. Totum igitur quadrilaterum CKSP, in uno erit plano. Quod si ex Q, & T, demantantur ad planum circuli ABCD, perpendiculares, & connectantur rectæ QC, TK, ostendemus similiter CK, QT, esse parallelas; atque adeo ipsas PS, QT, inter se parallelas esse, cum eidem CK, sint parallelæ, totumque quadrilaterum PSTQ, in uno esse plano. Eadem ratione in uno erit plano quadrilaterum QTVR. Est autem & triangulum RVO, in uno plano. Si igitur eadem constructio exhibeatur super reliqua latera KL, LM, MD, ductis scilicet quadrantibus OL, MO, OD, necnon in reliquis tribus quartis, ac reliquo hemisphærio, ut rota sphaera major repletur quadrilateris, & triangulis, quæ similia sunt prædictis inter quæ

quadrantes OC, OK, super latus CK, constructis, inscriptum erit in sphaera majori solidum polyedrum circumscriptum dictis quadrilateris atque triangulis. Hoc ergo dico non tangere sphaeram minorem EFGH.

Ducatur enim ex I, ad planum CKSP, perpendicularis IZ, connectanturque rectae ZC, ZK. Cadere autem perpendicularem IZ, intra quadrilaterum CKSP, in scholio sequenti ostendemus. Quoniam igitur ex defin. 3. lib. 11. anguli IZC, IZK, recti sunt; erit quadratum rectae IC; quadratis rectarum IZ, ZC, & quadratum rectae IK, quadratis rectarum IZ, ZK, aequale. Cum ergo quadrata rectarum aequalium IC, IK, aequalia sint, erunt & quadrata rectarum IZ, ZC, quadratis rectarum IZ, ZK, aequalia. Ac proinde dempto communi quadrato IZ, reliqua quadrata rectarum ZC, ZK, aequalia erunt, ideoque & ipsae rectae ZC, ZK, aequales. Similiter ostendemus rectas, quae ex Z, ad PS, ducentur, aequales esse & inter se & rectis ZC, ZK. Quare circulus ex Z, ad intervallum ZC, descriptus per quatuor puncta C, K, S, P, transibit. Eademque ratione circa reliqua quadrilatera PSTQ, QTVR, & triangulum RVO, circulos describi posse, demonstrabimus. Quoniam vero, ut postea ostendemus, angulus CZK, obtusus est; erit quadratum rectae CK, majus quadratis rectarum ZC, ZK; ideoque cum haec quadrata aequalia sint, majus erit quadratum rectae CK, duplo quadrati rectae ZC.

Ducatur ex K, ad rectam AC, perpendicularis Ka. Cum igitur AC, dupla sit ipsius AI, & Aa, major sit, quam AI, erit AC, minor duplo ipsius Aa. Quam ob rem cum sit, sicut AC, u. 1. scilicet ad Aa, ita rectangulum sub AC, aC, ad rectangulum sub Aa, aC, quod bases horum rectangulorum sint AC, Aa, & eadem altitudo aC; erit quoque rectangulum sub AC, aC, minus duplo rectanguli sub Aa, aC. Est autem rectangulum sub AC, aC, aequale quadrato rectae

B b
CK,

CK, & rectangulum sub Aa, aC, æquale quadrato rectæ Ka; quod recta CK, inter AC, aC, sit media proportionalis; & recta Ka, inter Aa, aC, ex coroll. propos. 8. lib. 6. (si enim con-
ma-primi ~~necteretur~~ recta AK, fieret triangulum rectangulum ACK.) Igitur & quadratum rectæ CK, minus erit duplo quadrati rectæ Ka. Ac propterea cum quadratum rectæ CK, ostensum sit majus esse duplo quadrati rectæ ZC, erit quadratum rectæ Ka, majus quadrato rectæ ZC. Quoniam vero quadratum rectæ IC, æquale est quadratis rectarum IZ, ZC, & quadratum rectæ IK, quadratis rectarum Ia, aK; Suntque æqualia quadrata rectarum æqualium IC, IK, erunt & quadrata rectarum IZ, ZC, æqualia quadratis rectarum Ia, aK. Si ergo ex his dematur quadratum majus, nempe rectæ aK; & ex illis minus, videlicet rectæ ZC, erit reliquum quadratum rectæ IZ, majus quadrato reliquo rectæ Ia; ideoque recta IZ, major quam recta Ia. Quapropter cum punctum a, non tangat spheram minorem EFGH, quod per coroll. propos. precedentis recta Ka, tota sit extra dictam spheram; multo minus punctum Z, longius distans eandem spheram contingeret. Ac proinde cum omnia alia puncta plani CKSP, longius absint à sphaera EFGH, quam punctum Z, ut mox ostendemus, non tanget planum CKSP, spheram EFGH.

Sed & expeditius ex ipsa fere constructione figuræ ostendemus, planum CKSP, non tangere spheram minorem EFGH, si prius ducatur recta Ig, hoc modo. Quoniam ex constructione ostensum fuit, rectam CK, minorem esse recta Gg: *est autem* CK, major quam ZC, quod angulus CZK, obtusus sit, ut mox demonstrabitur; multo major erit Gg, quam ZC; Ac propterea quadratum rectæ Gg, majus quadrato rectæ ZC. *a 47. primi* Quia vero quadratum rectæ Ig, æquale est quadratis rectarum IG, Gg; & quadratum rectæ IC, quadratis rectarum IZ, ZC; sunt autem quadrata rectarum Ig, IC, æqualium æqualia; erunt

erunt & quadrata rectorum IG , Gg , quadratis rectorum IZ , ZC , æqualia: Dempto ergo illinc quadrato rectorum Gg , & hinc quadrato rectorum ZC ; relinquetur quadratum rectorum IG , minus quadrato rectorum IZ ; Ac propterea rectorum IG , minor, quam IZ . Quam ob rem, cum IG , sit sphaerae minoris $EFGH$, semidiameter, existet punctum Z , extra eandem sphaeram; Et proinde, ut prius, planum $CKSP$, sphaeram $EFGH$, nequaquam continget.

Ducatur rursus ex I , ad planum $PSTQ$, perpendicularis Ib , eritque b , centrum circuli circa $PSTQ$, descripti, ut demonstratum est; Connexis autem rectorum bP , IP , cum angulus IbP , rectorum sit, ex 3. defin. lib. 11. erit quadratum rectorum IP , æquale quadratis rectorum Ib , bP . Quia vero & quadratum rectorum IC , (quod æquale est quadrato rectorum IP , ob æqualitatem rectorum IC , IP ,) æquale est quadratis rectorum IZ , ZC ; erunt quadrata rectorum Ib , bP , quadratis rectorum IZ , ZC ; æqualia; Est autem quadratum rectorum ZC , majus quadrato rectorum bP , quod & linea ZC , major sit, quam linea bP , ut postea ostendemus. Reliquum igitur quadratum rectorum Ib , reliquo quadrato rectorum IZ , majus erit; ideoque & linea Ib , major quam linea IZ : Ac proinde multo magis punctum b , extra sphaeram, $EFGH$, existet, quam punctum Z : proptereaque multo minus planum $PSTQ$, quam $CKSP$, tanget sphaeram minorem $EFGH$. Eodem modo demonstrabimus, quod neque reliqua plana sphaeram dictam contingere possint. Quocirca, duabus sphaeris circa idem centrum existentibus, in majori sphaera solidum polyedrum inscripsimus, quod non tangat minoris sphaerae superficiem. Quod erat faciendum.

COROLLARIUM.

Ex his, quae demonstrata sunt, manifestum est, si in quavis alia sphaera describatur solidum polyedrum simile

prædicto solido polyedro, proportionem polyedri in una sphaera ad polyedrum in altera sphaera esse triplicatam ejus, quam habent sphaerarum diametri. Nam si ex centrīs sphaerarum ad omnes angulos basium, dictorum polyedrorum rectæ lineæ ducantur, distribuentur polyedra in pyramides numero æquales, & similes, quarum homologa latera sunt semidiametri sphaerarum; ut constat, si intelligatur harum sphaerarum minor intra majorem circa idem centrum descripta. Congruent enim sibi mutuo lineæ rectæ ductæ à centrīs ad basium angulos; ob similitudinem basium: Ac propterea pyramides efficientur similes. Quare cum singulæ pyramides in una sphaera ad singulas pyramides illis similes in altera sphaera habeant proportionem triplicatam laterum homologorum, hoc est, semidiametrorum sphaerarum, ut constat ex coroll. propof. 8. hujus lib. Sint autem, ut una pyramis ad unam pyramidem, ita omnes pyramides, hoc est, solidum polyedrum ex ipsis compositum, ad omnes pyramides, id est, ad solidum polyedrum ex ipsis constitutum: Habebit quoque polyedrum unius sphaeræ ad polyedrum alterius sphaeræ proportionem triplicatam semidiametrorum, atque *15. quint.* adæo diametrorum sphaerarum, cum semidiametri atque diametri eandem habeant proportionem.

S C H O L I U M.

Quoniam vero ne nimis longa demonstratio fieret, nonnulla in ea assumpta fuerunt, ut vera; qua tamen nondum sunt demonstrata; idcirco ea nunc breviter à nobis erunt demonstranda.

*TAB. Primum itaque ostendendum est, punctum Z, cedere intra quadrilaterum CKSP, & angulum CZK, XXXVI. in quadrilatero CKSP, esse obtusum. Quod ut commodius fiat, describatur circa dictum quadrilaterum ex centro Z, circulus. Quoniam igitur in figura prima est ut IK, ad KC, ita IT, ad TX, (quod per coroll. propof. 4. lib. 6. triangula ICK, IXT, similia sunt.) Est autem IK, major, quam *14. quint.* IT; derit & KC, major quam TX. Cum igitur TX, æqualis sit ostensa ipsi SP; erit quoque KC, major quam SP. Ac propterea in hac secunda figura, arcus CK, major erit arcu SP, ex scholio propof. 28. lib.*

3. eQuare cum arcus CP, KS, arcus CK, sint ^{ca8.terti} ~~ca8.terti~~
 aequales, quod & linea CP, KS, ipsi KC, linea
 sint aequales demonstrata; (subtendantur enim arcu-
 bus circularum equalibus, ut ex constructione figura
 prima constat) erunt quoque arcus CP, KS,
 arcu PS, majores; Atque idcirco quilibet arcus
 CK, CP, KS, quadranssem circuli CKSP, excedet;
 atque à semicirculo superabitur; ac proinde mul-
 to magis segmentum SP, minus erit semicirculo. Ex
 quo fit, centrum Z, non esse in illis segmentis, sed
 extra, nimirum intra quadrilaterum CKSP. Ea-
 dem ratione ostendemus, perpendiculares ex I, ad
 plana aliorum quadrilaterorum demissas, qualis est
 Ib, cadere intra quadrilatera; nec non & perpendi-
 cularem ex I, ad triangulum ORV, ductam, cadere
 intra ipsam. Quia igitur arcus CK, quadransse ma-
 jor est; angulus CZK, obtusus erit, nempe recto
 major, cum angulo recto in centro subtendatur qua-
 drans circuli, ut perspicuum est ex scolio propof. 27.
 lib. 3.

Secundo demonstrandum est, omnia alia puncta
 quadrilateri CKSP, longius à centro I, abesse, quam
 punctum Z. Sumatur enim quodcumque aliud pun-
 ctum b, in quadrilatero CKSP, & adjungantur
 rectæ Ib, Zb. Quoniam ergo angulus IZb, rectus
 est, ex defiu. 3. lib. 11. & Erit latus illi oppositum
 Ib, majus latere IZ, quod minori angulo IbZ, ni-
 mirum acuto, opponitur; Ac propterea punctum b,
 longius à centro I, distat, quam punctum Z. Simi-
 li argumento concludemus, omnia alia puncta longius
 distare.

Tertio, ac ultimo probandum est, rectam ZC,
 majorem esse recta bP. Quod ut aptius fiat, demon-
 strandum prius erit, rectam PS, majorem esse recta
 QT. Describatur igitur pars prima figura, ea
 videlicet, qua continetur semidiametris IC, IK,
 IO, & quadrantibus OC, OK, &c. Demittantur
 deinde ex Q, & T, ad planum circuli ABCD, in
 quo est triangulum ICK, perpendiculares QI, TI,
 quæ in communes sectiones IC, IK, cadent,
 & eruntque inter sese parallele, ut de rectis PX,
 SY,

TAB. XXXVI. fig. 3.

19. p. 10

TAB. XXXVII. fig. 4.

38. m. 1
6. m. 1

ST, dictum est. Quod si adjungatur recta *lm*; erunt *QT*, *ml*, parallelae & æquales, quemadmodum ostendimus fuit parallelas esse & æquales *PS*, *XT*. Quia vero *ml*, ipsi *CK*, parallela est; quod latera *IC*, *IK*, proportionaliter sunt secta in *l*, & *m*. veluti diximus de recta *XT*; kerant quoque *ml*, *XT*. parallela. Quare erit ex coroll. propos. 4. lib. 6. ut *IT*, ad *IX*, ita *Im*, ad *ml*, est autem *IT* major quam *Im*. Igitur & *IX*, major erit quam *ml*; Ac proinde & *PS*, quæ æqualis est ipsi *XT*, major erit quam *QT*, quæ æqualis est ipsi *ml*.

TAB XXXVI. Hoc ergo demonstrato. describantur ex centrīs *Z*, *b*, circa quadrilatera *CKSP*, *PSIQ*, circuli, egredianturque è centrīs recta *ZC*, *ZR*, *ZS*, *ZP*, *bP*, *bS*, *bT*, *bQ*. Si igitur *ZC*, non credatur major, quam *bP*, erit vel æqualis, vel minor. Sit primum æqualis. Quia ergo latera *ZK*, *ZC*, æqualia ponuntur lateribus *bS*, *bT*, & bases *KC*, *major est base PS*; merito angulus *KZC*, major angulo *SbP*: Eadem ratione major erit angulus *SZP*, angulo *TbQ*. At quoniam bases *KS*, *CP*, *basisibus ST*, *PQ*, sunt æquales necerant anguli *KZS*, *CZP*, angulis *SbT*, *PbQ*, æquales. Igitur quatuor anguli ad *Z*, majores erunt quatuor angulis ad *b*: Sunt autem & æquales, cum tum *bi*, quam illi quatuor rectis sint æquales, ex coroll. 2. propos. 15. lib. 1. quod est absurdum. Non igitur æqualis est recta *ZC*, recta *bP*.

Sit deinde *ZC*, minor, quam *bP*. Et abscindantur *bu*, *bq*, *br*, *bt*, ipsis *ZC*, *ZK*, *ZS*, *ZP*, æquales, connectanturque recta *nq*, *qr*, *rs*, *tn*, o quæ parallela erunt rectis *PS*, *ST*, *TQ*, *QP*, eo quod recta ex centrīs secta sunt proportionaliter; ac proinde, ex coroll. propos. 4. lib. 6. erit ut *bS*, ad *SP*, ita *bq*, ad *qn*. Cum ergo *bS*, major sit quam *bq*, perit & *SP*, major quam *qn*. Eademque ratione majores erunt *ST*, *TQ*, *QP*, rectis *qr*, *rt*, *tn*; Ac propterea cum *PS*, minor sit, quam *CK*, & *ST*, *PQ*, æquales rectis *KS*, *CP*; & *TQ*, minor quam *PS*, erunt recta *qn*, *qr*, *rt*, *tn*, minores rectis *CK*, *KS*, *SP*, *PC*. Quare cum recte *bn*

LIBER DUODECIMUS. 391

*bn, bq, br, bt, rectis ZC, ZK, ZS, ZP, sint
 æquales; qerunt anguli ad Z, majores angulis ad
 b: Sunt autem & æquales, quod tam illi, quam hi
 sunt quatuor rectis æquales, ex coroll. 2. propos. 19.
 lib. 1. Quod est absurdum. Non igitur minor est
 recta ZC, quam bP: Sed neque æqualis est ostensa;
 Major igitur est. Quod erat ostendendum.*

THEOR. 16. PROPOS. 18. xv.

Sphæræ inter se sunt in triplicata ra-
 tione suarum diametrorum.

Sint duæ sphæræ ABC, DEF, quarum diametri
 AC, DF. Dico sphæram ABC, ad sphæram
 DEF, habere proportionem triplicatam diametri
 AC, ad diametrum DF. Si enim hoc non con-
 cedatur, habebit sphæra ABC, ad aliam sphæram
 GHI, minorem, vel KLM, majorem, quam
 DEF, triplicatam proportionem diametri AC, ad
 diametrum DF. Habeat primum sphæra ABC,
 ad sphæram GHI, minorem sphæra DEF, pro-
 portionem triplicatam diametri AC, ad diametrum
 DF; intelligaturque sphæra GHI, concentrica
 sphæræ DEF. *TAB. XXXVII. fig. 6.*
 Inscribatur in sphæra majori
 DEF, polyedrum DNEOFPQR, non tangens
 minorem sphæram GHI; Atque huic simile po-
 lyedrum ASBTCVXY, inscribatur in sphæra
 ABC. Quoniam igitur ponitur proportio sphæræ
 ABC, ad sphæram GHI, triplicata proportionis
 diametri AC, ad diametrum DF: Est autem per
 coroll. præcedentis propos. & proportio polyedri
 ASBTCVXY, ad polyedrum DNEOFPQR, tri-
 plicata proportionis diametri AC, ad diametrum
 DF: Erit ut sphæra ABC, ad sphæram GHI,
 ita polyedrum ASBTCVXY, ad polyedrum
 DNEOFPQR. Quare cum sphæra ABC, major
 sit polyedro ASBTCVXY, erit & sphæra GHI,
 major polyedro DNEOFPQR, pars toto. Quod
 est absurdum. Non igitur habebit sphæra ABC,
 ad sphæram GHI, minorem sphæra DEF, propor-
 tionem triplicatam diametri AC, ad diametrum DF.

Habeat secundo sphæra ABC, ad sphæram
 KLM,

B^b 4

392. *EUCLIDIS GEOMETRIÆ.*

KLM, majorem sphaera DEF, proportionem triplicatam diametri AC, ad diametrum DF. Cum igitur ex coroll. præcedentis propos. & polyedrum ASBTCVXY, ad polyedrum DNEOFFQR, habeat proportionem triplicatam diametri AC, ad diametrum DF; Erit ut sphaera ABC, ad sphaeram KLM, ita polyedrum ASBTCVXY, ad polyedrum DNEOFFQR: Et convertendo, ut sphaera KLM, ad sphaeram ABC, ita polyedrum DNEOFFQR, ad polyedrum ASBTCVXY: Est autem ex dicto coroll. præcedentis propositionis polyedrum DNEOFFQR, ad polyedrum ASBTCVXY, in triplicata proportione diametri DF, ad diametrum AC. Igitur & sphaera KLM, ad sphaeram ABC, erit in triplicata proportione diametri DF, ad diametrum AC. Ponatur ut sphaera KLM, ad sphaeram ABC, ita sphaera DEF, ad aliam sphaeram Zab. Habebit igitur & sphaera DEF, ad sphaeram Zab, proportionem triplicatam diametri DF, ad diametrum AC. Et quia sphaera KLM, major ponitur, quam sphaera DEF, erit quoque sphaera ABC, major quam sphaera Zab. Quapropter sphaera DEF, ad sphaeram Zab, minorem sphaera ABC, proportionem habet triplicatam diametri DF, ad diametrum AC. Quod est absurdum. Ostensum enim est, non posse sphaeram ad sphaeram alia sphaera minorem, proportionem habere triplicatam diametrorum. Non ergo habebit sphaera ABC, ad sphaeram KLM, majorem sphaera DEF, proportionem triplicatam diametri AC, ad diametrum DF: Sed neque ad minorem habet, ut demonstratum est: Igitur habebit ad sphaeram DEF, proportionem triplicatam diametri AC, ad diametrum DF. Sphaerae itaque inter se sunt in triplicata ratione suarum diametrorum. Quod erat ostendendum.

C O R O L L A R I U M.

Hinc fit, ita esse sphaeram ad sphaeram, ut polyedrum in illa descriptum ad polyedrum simile in hac descriptum. Quia tam sphaera ad sphaeram, quam polyedrum ad polyedrum habet triplicatam diametrorum proportionem, ut demonstratum est

F I N I S.







Fig. 5.




Fig. 6.

